

中医执业（含助理）医师资格考试 100 考题

1. 下列表述中属于证的是

A. 水痘 

B. 麻疹

C. 风寒表证

D. 头痛

E. 恶寒

答案：C

2. “阴在内，阳之守也”主要说明的阴阳关系是

A. 阴阳交感关系

B. 阴阳互根关系

C. 阴阳对立关系

D. 阴阳消长关系

E. 阴阳转化关系

答案：B

3. 饮食五味失宜，引起“脉凝泣而变色”的是

A. 多食咸

B. 多食酸

C. 多食苦

D. 多食甘

E. 多食辛

答案：A

4. 脏腑关系中，“燥湿相济”指的是哪种关系

A. 心与小肠

B. 肝与胆

C. 脾与胃

D. 肺与大肠

E. 肾与膀胱

答案：C

5. 肺病及心的五行传变是

A. 相乘传变

B. 相侮传变

C. 母病及子

D. 子病犯母

E. 相克传变

答案：B

(6~7 题共用备选答案)

A. 热者寒之

B. 寒者热之

C. 热因热用

D. 塞因塞用

E. 通因通用

6. 用消导积滞的方法治疗食积腹泻属

7. 用温热药治疗寒证的方法属

答案：EB

8. 下列哪项不属于苦味药的作用

A. 降泄

B. 通泄

C. 燥湿

D. 收敛

E. 清泄

答案：D

9. 治疗风湿痹痛，兼有肝肾不足，宜选用的药物是

A. 羌活

B. 独活

C. 桑寄生

D. 威灵仙

E. 秦艽

答案：C

10. 巴豆内服的用量是

A. 0.1~0.3 g

B. 0.5~1 g

C. 1.5~3 g

D. 3~5 g

E. 5~10 g

答案：A

11. 既能利水通淋，又能利湿退黄的药物是

A. 车前子

B. 泽泻

C. 金钱草

D. 木通

E. 茯苓

答案：C

12. 患者，女，28岁。见面色萎黄、经期后愆、行经腹痛、痛处固定、遇温痛减，治疗宜首选的药物是

A. 当归

B. 熟地黄

C. 何首乌

D. 白芍

E. 阿胶

答案：A

13. 具备沉、实、大、弦、长形象特点的脉是

A. 牢脉

B. 紧脉

C. 芤脉

D. 伏脉

E. 革脉

答案：A

14. 患者，男，70岁。慢性咳喘20年，近来病情加重，胸闷，咳喘，痰多色白，痰浊易咯，大便不畅，舌暗体胖，苔白厚腻，脉滑。宜首选的药物是

A. 白前、前胡

B. 杏仁、瓜蒌仁

C. 苏子、莱菔子

D. 陈皮、半夏

E. 紫菀、款冬花

答案：C

15. 能够滋补肝肾，明目的药物是

A. 石斛

B. 玉竹

C. 黄精

D. 百合

E. 枸杞子

答案：E

16. 口甜而黏腻者，常提示

A. 脾虚湿阻

B. 痰饮内停

C. 饮食停滞

D. 肝胆湿热

E. 脾胃湿热

答案：E

17. 舌青紫湿润而短缩的主病为

A. 痰浊内阻

B. 寒凝筋脉

C. 肝风内动

D. 热盛伤津动风

E. 风气挟痰

答案：B

18. 以下所列项目不属于白色主病范围者为

A. 夺气

B. 脱血

C. 虚证

D. 寒证

E. 水饮

答案：E

19. 痰白而清稀，或有灰黑点者，属

A. 湿痰

B. 寒痰

C. 热痰

D. 燥痰

E. 风痰

答案：B

20. 某男，38岁。身热，面红，口渴，但饮水不多，下利清谷，舌淡苔白，脉浮大无力。临床诊断最可能是

A. 实热证

B. 真热假寒证

C. 亡阳证

D. 真寒假热证

E. 虚热证

答案：D

21. 阳热有余，蒸腾胃中腐浊邪气上升可形成

A. 白腻苔

B. 积粉苔

C. 黄腻苔

D. 腐苔

E. 黏腻苔

答案：D

22. 由四逆汤化裁为通脉四逆汤属于

A. 药味加减的变化

B. 药量增减的变化

C. 剂型更换的变化

D. 药味加减与药量增减变化的联合运用

E. 药味加减与剂型更换变化的联合运用

答案：B

23. 固涩剂可用于

A. 阳明肠热的下利

B. 热甚迫津的汗多

C. 湿热下注的带下

D. 阴虚血热的崩漏

E. 火扰精室的遗精

答案：D

24. 一贯煎中的君药是

A. 枸杞子

B. 地黄

C. 麦冬

D. 沙参

E. 川楝子

答案：B

25. 暖肝煎的功用是



- A. 温补肝肾，行气止痛
- B. 行气疏肝，散寒止痛
- C. 行气止痛，软坚散结
- D. 温补脾肾，散寒止痛
- E. 滋肾润燥，疏肝行气

答案：A

26. 地黄饮子的功用不涉及

- A. 化痰开窍
- B. 镇肝息风
- C. 滋阴温阳
- D. 补肾
- E. 交通心肾

答案：B

27. 完带汤的功用是

- A. 健脾养血，收涩止带
- B. 补脾疏肝，化湿止带
- C. 健脾补肾，收涩止带
- D. 健脾燥湿，清热止带
- E. 温养冲任，固经止带

答案：B

28. 风邪初中经络，舌强不能语言，手足不能运动者，治宜选用

- A. 大秦朮汤
- B. 牵正散
- C. 天麻钩藤饮
- D. 地黄饮子
- E. 小活络丹

答案：A

29. 肺癆的病理性質基本以下列哪項為主



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

A. 阴虚

B. 气阴两虚

C. 肺肾两虚

D. 阴阳两虚

E. 阴虚肺燥

答案：A

30. 痞满的基本病机是

A. 食滞肠胃，痞塞不通

B. 中焦气机不利，脾胃升降失职

C. 外邪内陷，阻塞气机

D. 湿盛脾虚，气机阻滞

E. 肝气郁滞，横逆犯脾

答案：B

31. 治疗脑瘤痰瘀阻窍证的代表方剂是

A. 通窍活血汤

B. 膈下逐瘀汤

C. 大定风珠

D. 血府逐瘀汤

E. 天麻钩藤饮合黄连解毒汤

答案：A

32. 下列胁痛的病机哪一项是错误的

A. 肝气郁结

B. 肝气上逆

C. 瘀血停滞

D. 肝胆湿热

E. 肝阴不足

答案：B

33. 下列哪一项对积与聚无鉴别意义

- A. 积属血，聚属气®
- B. 积属脏病，聚属腑病
- C. 积的病程长，聚的病程短
- D. 积为固定不移，聚为聚散无常
- E. 积的病位在大腹，聚的病位在小腹

答案：E

34. 痹证所以有风寒湿痹与热痹，大多数医家认为取决于

- A. 感邪性质的不同
- B. 病变部位的不同
- C. 感邪季节的不同
- D. 地理、气候、环境的不同
- E. 人体素质的阳气盛衰不同

答案：E

35. 中风、昏迷、痫证、厥证共有的主要症状为

- A. 语言不利
- B. 口眼歪斜
- C. 突然昏仆
- D. 四肢抽搐
- E. 昏不知人

答案：E

36. 往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦，治宜选用

- A. 小柴胡汤
- B. 大柴胡汤
- C. 小承气汤
- D. 蒿芩清胆汤
- E. 四逆散

答案：A

37. 汗出恶风，面色白，舌淡苔薄白，脉浮虚软者，治宜选用

- A. 当归六黄汤
- B. 牡蛎散
- C. 桂枝汤
- D. 玉屏风散
- E. 黄芪防己汤

答案：D

38. 患者，男性，55岁。胸痛反复发作2个月，现胸部刺痛，夜间尤甚，持续10分钟左右，痛处固定，多因生气及受寒后加重，时有心悸，舌质紫暗，脉象沉涩，首选方为

- A. 瓜蒌薤白半夏汤
- B. 参附汤合右归饮
- C. 血府逐瘀汤
- D. 乌头赤石脂丸
- E. 瓜蒌薤白白酒汤

答案：C

39. 吴某，女，51岁。平素头晕头痛，耳鸣目眩，少寐多梦，突然发生口眼歪斜，舌强语謇，半身不遂，舌质红脉弦细数。治疗方剂宜选

- A. 大秦艽汤
- B. 镇肝息风汤
- C. 安宫牛黄丸
- D. 至宝丹
- E. 涤痰汤

答案：B

40. 刘某，男，70岁。5日前因饮食不慎而呕吐，随之食欲减退，小便淋沥，曾以抗生素对症治疗，小便不通，食不知味，全身乏力，气短易汗，面色晄白，唇淡无华，舌淡体胖，苔白微厚，脉细无力。下列处方最佳选用

- A. 八正散

B. 清肺饮

C. 沉香散

D. 代抵当汤

E. 补中益气汤

答案：E

41. 肺肾阴虚，咳痰带血，咽喉燥痛，手足心热，骨蒸盗汗，舌红少苔，脉细数者，治宜选用

A. 咳血方

B. 清燥救肺汤

C. 百合固金汤

D. 养阴清肺汤

E. 六味地黄汤

答案：C

42. 产后血虚受寒，恶露不尽，少腹冷痛，治宜选用

A. 少腹逐瘀汤

B. 失笑散

C. 生化汤

D. 当归补血汤

E. 温经汤

答案：C

43. 孕妇 3 个月，胎动出血，食少神疲，面色无华，气短乏力，舌淡苔白，脉细弱。治宜选用

A. 温经汤

B. 胶艾汤

C. 泰山磐石散

D. 桂枝茯苓丸

E. 肾气丸

答案：C

44. 内陷之证，症见口干少津而不喜饮，胃纳不香或伴口糜，舌光红，脉细数者，宜选用

A. 异功散

B. 二陈汤

C. 六味地黄汤

D. 益胃汤

E. 四君子汤

答案：D

45. 根据骨度分寸法，印堂到大椎穴是几寸

A. 16 寸

B. 18 寸

C. 20 寸

D. 12 寸

E. 15 寸

答案：B

46. 不属于小儿基本脉象的是

A. 浮脉

B. 沉脉

C. 迟脉

D. 数脉

E. 弦脉

46. 答案：E

47. 下列哪组穴是俞募配穴

A. 肺俞—大杼

B. 胃俞—中脘

C. 大肠俞—关元俞

D. 脾俞—大横

E. 肾俞—命门

答案：B

48. 从任脉开始，在胸部由内向外的经脉排列顺序和距离是

- A. 胃经、脾经、肾经 0.5 寸、2 寸、4 寸
- B. 胃经、肾经、脾经 0.5 寸、2 寸、4 寸
- C. 肾经、胃经、脾经 0.5 寸、2 寸、4 寸
- D. 肾经、胃经、脾经 2 寸、4 寸、6 寸
- E. 脾经、肾经、胃经 2 寸、4 寸、6 寸

答案：D

49. 女童，8 岁。双目裸视均为 4.6，父母均为高度近视。欲求针灸纠正。除眼周近部取穴、背俞穴外，还可配合

- A. 太冲
- B. 光明
- C. 合谷
- D. 足三里
- E. 以上都可

答案：E

50. 疾徐补泻手法中的泻法是

- A. 疾速刺入，多捻转，徐徐出针
- B. 疾速刺入，多捻转，快出针
- C. 疾速刺入，少捻转，快出针
- D. 徐徐刺入，多捻转，徐徐出针
- E. 疾速刺入，少捻转，徐徐出针

答案：A

(51 ~ 52 题共用备选答案)

- A. 三棱针腧穴点刺
- B. 三棱针刺络
- C. 三棱针挑刺
- D. 皮肤针局部叩刺
- E. 皮内针埋针

51. 用三棱针治中暑时多选用

答案：B

52. 治疗顽癣时多选用

答案：D

(53 ~ 54 题共用备选答案)

A. 十二经脉

B. 十五络脉

C. 十二经别

D. 十二经筋

E. 十二皮部

53. 经络系统中，具有保持人体正常运动功能的是

53. 答案：D

54. 经络系统中，从十二正经离、入、出、合的别行部分是

54. 答案：C

55. 温某，女，50岁。半年来面目、下肢时有浮肿。气色晦滞，小便清利，大便溏泄，喜暖畏寒，脉沉细，舌淡苔白。针灸取穴为

A. 水分、三焦俞、气海、肺俞、合谷

B. 水分、三焦俞、气海、脾俞、阴陵泉

C. 脾俞、胃俞、足三里、太白

D. 肺俞、脾俞、合谷、足三里

E. 以上都不是

答案：B

56. 王某，女，18岁。每次行经血量多，色紫红，味臭秽，夹有瘀块。常伴有便秘，口干。舌红苔黄，脉弦数有力。针灸取穴为

A. 三阴交、隐白、内关、太溪

B. 三阴交、隐白、血海、水泉

C. 三阴交、隐白、脾俞、足三里

D. 三阴交、隐白、百会、气海

E. 三阴交、隐白、内庭、关元

答案：B

57. 王某，男。因恼怒后两胁胀痛，胸闷不舒，呕恶不欲食，口苦，舌红，脉弦滑。

针灸取穴为

A. 期门、阳陵泉、太冲、足三里

B. 支沟、阳陵泉、期门、丘墟

C. 期门、阳陵泉、膈俞、三阴交

D. 肝俞、肾俞、期门、三阴交

E. 大包、阳陵泉、三阴交、足三里

答案：B

58. 深Ⅱ度烧伤的临床表现是

A. 局部红肿，有疼痛和烧灼感，皮肤温度增高

B. 水疱较饱满，有剧痛和感觉过敏，皮温增高

C. 水疱饱满，感觉迟钝，皮温低

D. 水疱较小或偏扁薄，感觉较迟钝，皮温稍低

E. 创面无水疱，感觉消失，皮温低

答案：D

59. 以下哪一项不属于外科致病因素

A. 六淫邪毒

B. 外来伤害

C. 感受特殊之毒

D. 气血凝滞

E. 房室损伤

答案：D

60. 痰肿的临床特点是

A. 肿势高突，根盘紧收

B. 坚硬如石，皮色不变

C. 肿势软如棉，或硬如馒

- D. 皮紧内软，喜怒有变
- E. 皮肤漫肿，其色青紫

答案：C

61. 乳腺检查的正确顺序是

- A. 内上、外上、外下、内下、中央、腋窝及锁骨区
- B. 外上、外下、内上、内下、中央、腋窝及锁骨区
- C. 中央、内下、内上、外上、外下、腋窝及锁骨区
- D. 外上、内上、外下、外上、中央、腋窝及锁骨区
- E. 中央、腋窝及锁骨区、外上、内上、外下、外上

答案：A

62. 牛皮癣（中医）的典型皮疹为

- A. 皮疹色鲜红
- B. 扁平多角形丘疹，融合成片呈苔藓样
- C. 严重时汁水淋漓
- D. 皮疹为红色丘疹、丘疱疹、脓疱
- E. 皮损经搔抓脱屑后基底可见点状出血

答案：B

63. 肿疡毒势方盛，正气已虚，不能托毒外出者，内治方药宜选用

- A. 透脓散
- B. 仙方活命饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 托里消毒散
- E. 清肝解郁汤

答案：D

64. 疗疮走黄的主要病理是

- A. 正虚
- B. 邪实
- C. 阴伤

D. 腑实

E. 表虚

答案：B

65. “子处”又称

A. 血海

B. 血室

C. 胞络

D. 胞脉

E. 天癸

答案：B

66. 经来先期，量少或多，色红质稠，手足心热，舌红少苔，脉细数。首选方为

A. 两地汤

B. 清经散

C. 丹栀逍遥散

D. 保阴煎

E. 加减一阴煎

答案：A

67. 不属于清热解毒法治疗的疾病是

A. 温热病

B. 湿热病

C. 丹毒

D. 疮痈

E. 五迟五软

答案：E

68. “产后三病”是指

A. 痉、昏迷、心悸

B. 痉、泄泻、盗汗

C. 痉、郁冒、大便难

- D. 发热、抽搐、大便难
- E. 发热、郁冒、泄泻

答案：C

69. 异位妊娠，未破损期治疗方法为

- A. 活血化瘀，消癥杀胚
- B. 活血化瘀，消癥散结
- C. 益气摄血，佐以止痛
- D. 行气活血，化瘀止痛
- E. 凉血养血，佐以止痛

答案：A

70. 妊娠恶阻的主要发病机制是

- A. 脾胃虚弱，化源不足
- B. 肝郁气滞，失于条达
- C. 痰湿内停，中焦受阻
- D. 重伤津液，胃阴不足
- E. 冲气上逆，胃失和降

答案：E

71. 毓麟珠用于治疗哪种不孕症

- A. 肝肾不足不孕
- B. 痰湿不孕
- C. 肝郁不孕
- D. 血瘀不孕
- E. 肾虚不孕

答案：E

72. 证见经后小腹隐痛，小腹空坠喜按，月经量少色淡，神疲乏力，面色不华，舌淡，脉细弱。首选方剂是

- A. 圣愈汤
- B. 四物汤

C. 人参养荣汤

D. 滋血汤

E. 当归补血汤

答案：A

73. 下列哪一症状不属于惊风八候

A. 颤

B. 掣

C. 窜

D. 抖

E. 视

答案：D

74. 母乳喂养，增加辅食和断奶最适宜的时间

A. 4~6 个月加辅食，8~12 个月断奶

B. 2~3 个月加辅食，12~16 个月断奶

C. 4~5 个月加辅食，12~18 个月断奶

D. 4~5 个月加辅食，16~20 个月断奶

E. 半岁后加辅食，1 岁左右断奶

答案：A

75. 五软的病位多在

A. 肝、肾

B. 脾、胃

C. 心、脾

D. 肺、脾

E. 心、肝

答案：A

76. 预防脐风最重要的措施是

A. 孕妇勿感风邪

B. 产妇勿感风邪

C. 小儿生后避风

D. 清洁断脐护脐

E. 脐疮防其走黄

答案：D

77. 治疗虚火上浮型鹅口疮的首选方剂是

A. 沙参麦冬汤

B. 知柏地黄丸

C. 一贯煎

D. 六味地黄汤加肉桂

E. 泻白散

答案：B

78. 治疗小儿乳食内积型积滞的首选方剂是

A. 保和丸

B. 木香大安丸

C. 枳实导滞丸

D. 枳术丸

E. 肥儿丸

答案：A

79. 幼儿期的年龄是

A. 1 岁

B. 1~2 岁

C. 1~3 岁

D. 2~4 岁

E. 以上都不是

答案：C

80. 肺心病心力衰竭哪种情况下使用强心剂

A. 心率大于 120 次/分

B. 两肺底湿啰音

- C. 气急发绀明显
- D. 肺动脉高压
- E. 感染控制，利尿剂无效

答案：E

81. 判定支气管哮喘疗效最有意义的指标是

- A. 肺活量
- B. 嗜酸性粒细胞数
- C. 症状和体征
- D. 血气分析
- E. X 线肺野透亮度的变化

答案：C

82. 对慢性呼吸衰竭，失代偿性呼吸性酸中毒的处理原则，最重要的是

- A. 增加通气量
- B. 持续低流量给氧
- C. 积极控制感染
- D. 补充碳酸氢钠纠正酸中毒
- E. 治疗原发病

答案：A

83. 患者，男性，72 岁。夜间睡眠中突感心前区疼痛，含硝酸甘油不缓解，继之出现呼吸困难，不能平卧。心电图检查示：V1～V5 S-T 段弓背向上抬高，且有宽而深的 Q 波。其是哪个部位的心肌梗死

- A. 急性非 Q 波心肌梗死
- B. 急性心内膜下心肌梗死
- C. 急性前壁心肌梗死
- D. 急性广泛前壁心肌梗死
- E. 急性前间壁心肌梗死

答案：D

84. 哪种疾病时尿中常见大量红细胞管型

- A. 肾结核
- B. 肾结石
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 急性肾小球肾炎

答案：E

85. 患者，男，60岁。咳嗽，吐痰，反复发作5年，近1周症状加重。检查：体温正常，两肺散在干、湿啰音，血白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.8。应首先考虑的是

- A. 急性支气管炎
- B. 慢性支气管炎急性发作
- C. 肺结核
- D. 支气管哮喘
- E. 肺癌

答案：B

86. 何时做头部CT检查诊断脑梗死阳性率较高

- A. 发病6小时以后
- B. 发病12小时以后
- C. 发病48小时以后
- D. 发病18小时以后
- E. 发病1周以后

答案：C

87. 患者，女，52岁。反复上腹痛伴消瘦，X线钡餐检查发现胃窦呈持续性向心性狭窄伴充盈缺损。进一步处理首选

- A. 手术探查
- B. B超
- C. 治疗后复查
- D. 胃液分析
- E. 胃镜及活检

答案：E

88. 患者,男,58岁。肝硬化腹腔积液,24小时尿钠 110 mmol (正常值 130~261 mmol), 24小时尿钾 117 mmol (正常值 51~102 mmol)。选用何种利尿剂较好

A. 氢氯噻嗪 (双氢克尿噻)

B. 利尿酸钠

C. 螺内酯 (安体舒通)

D. 氯噻酮

E. 呋塞米 (速尿)

答案：C

89. 引起肺心病最常见的病因是

A. 重症肺结核

B. 先天性肺囊肿

C. 支气管扩张

D. 慢支并发阻塞性肺气肿

E. 支气管哮喘

答案：D

90. 肺心病肺动脉高压形成的主要机制是

A. 长期缺氧

B. 肺血管玻璃样改变

C. 血容量增加

D. 右心室肥大

E. 左心衰竭

答案：A

91. 有机磷中毒毒蕈碱样症状的主要表现是

A. 腺体分泌减退,平滑肌松弛

B. 腺体分泌亢进,平滑肌痉挛

C. 腺体分泌减退,平滑肌痉挛

D. 腺体分泌亢进,运动神经兴奋

E. 运动神经兴奋，平滑肌痉挛

答案：B

92. 伤寒杆菌的主要致病因素是

A. 外毒素

B. 肠毒素

C. 内毒素

D. H 抗原

E. O 抗原

答案：C

93. 患者，女。产后 26 天，恶露不止，量较多，色深红，质黏稠有臭味，两胁胀痛，心烦。舌苔黄，脉弦数。治疗宜选

A. 五味消毒饮

B. 保阴煎

C. 丹栀逍遥散

D. 两地汤

E. 清营汤

答案：C

94. 稽留热常见于哪种疾病

A. 肺结核

B. 疟疾

C. 伤寒

D. 百日咳

E. 支气管扩张

答案：C

95. 流行性出血热发热期出现的“三痛”是指

A. 头痛、胸痛、腹痛

B. 头痛、腹痛、关节痛

C. 头痛、胸痛、腰痛

D. 头痛、腰痛、眼眶痛

E. 头痛、腰痛、背痛

答案：D

96. 我国《传染病防治法》规定管理的甲类传染病是指

A. 鼠疫、艾滋病

B. 鼠疫、霍乱

C. 鼠疫、霍乱、艾滋病

D. 鼠疫、霍乱、伤寒、副伤寒

E. 鼠疫、霍乱、艾滋病、伤寒或副伤寒

答案：B

97. 不可以杀灭芽孢的消毒法是

A. 高压蒸汽法

B. 巴氏消毒法

C. 预真空型压力蒸汽灭菌

D. 火烧消毒

E. 高效消毒剂

答案：B

98. 传染性非典型肺炎最主要的传播途径是

A. 飞沫传播

B. 接触传播

C. 果子狸等野生动物传播

D. 消化道排泄物传播

E. 损伤皮肤受染

答案：A

99. 流脑常见的皮疹是

A. 玫瑰色斑丘疹

B. 单纯疱疹

C. 瘀点、瘀斑

D. 脓疱疹

E. 坏疽

答案：C

100. 在突发公共卫生事件方面，卫生行政主管部门对医疗卫生机构的一些行为进行责令改正、通报批评、给予警告；情节严重的，吊销《医疗机构执业许可证》，不属于规定行为的是

A. 未依照规定履行报告职责，隐瞒、缓报或者谎报的

B. 未依照规定及时采取控制措施的

C. 未依照规定履行突发事件监测职责的

D. 拒不服从突发事件应急处理指挥部调度的

E. 未依照规定向上级人民政府报告并及时调查的

答案：E