

全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)

护理学

模拟试卷

金英杰国家医学考试研究中心 编



答题须知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。

2. 在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。

3. 在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。

4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。

5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。

6. 答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。

7. 考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。

8. 考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。

9. 监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。

10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

模拟试卷

基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 关于巨幼细胞贫血的实验室检查结果,不妥的是

- A. 属大细胞性贫血
- B. 白细胞、血小板增生显著
- C. 骨髓检查见红系增生活跃,可见各阶段巨幼红细胞

- D. 血清维生素 B 低于正常
- E. 血清叶酸低于正常值

2. 欲衡量小儿营养状况, 首先应做下列哪项检查

- A. 头围
- B. 测体重
- C. 身长的测量
- D. 上、下部量
- E. 坐高

3. 我国流行性乙脑的流行季节主要是

- A. 春季
- B. 春夏季
- C. 夏秋季
- D. 秋冬季
- E. 冬季

4. 用农历计算预产期, 应如何推算

- A. 月份减 3 或加 9, 日期加 7
- B. 月份减 3 或加 9, 日期加 8
- C. 月份减 3 或加 9, 日期加 10
- D. 月份减 3 或加 9, 日期加 13
- E. 月份减 3 或加 9, 日期加 15

5. 初乳具有下列特点, 但除外

- A. 是产后 5~7 天分泌的乳汁
- B. 量足

C. 含蛋白质多, 脂肪少

D. 富含免疫物质

E. 有生长发育调节因子

6. 支气管自哪级开始参与气体交换

- A. 支气管
- B. 终末细支气管
- C. 呼吸性细支气管
- D. 肺泡管
- E. 肺泡囊

7. 中央型肺癌一般是指发生在

- A. 主支气管
- B. 叶支气管
- C. 段支气管
- D. 段支气管以下主支气管
- E. 段支气管以上主支气管

8. 高钾血症的原因不包括

- A. 静脉补钾过快
- B. 急性肾功能衰竭
- C. 输入大量库存血
- D. 持续胃肠减压
- E. 代谢性酸中毒

9. 下列不属于冠心病危险因素的是

- A. 高血压
- B. 血脂异常
- C. 女性绝经期前
- D. 40 岁以上
- E. 吸烟

10. 对胰腺癌有定性诊断意义的是

- A. 超声波
- B. CT

- C.癌胚抗原测定
D.细胞学检查
E.X线造影
- 11.慢性胃炎的确诊依据是
A.胃液分析
B.X线钡餐
C.胃镜检查
D.腹部B超
E.腹部CT
- 12.新生儿出生后,开始喂哺母乳时间是
A.15~30分钟
B.3~4小时
C.6~8小时
D.12小时
E.24小时
- 13.下列属于临产标志的是
A.见红,规律宫缩,胎头下降
B.规律宫缩,破膜,胎头下降
C.见红,破膜,宫口扩张
D.见红,破膜,规律宫缩
E.规律宫缩,胎头下降,宫口扩张
- 14.新生儿胎粪的特点是
A.褐色、干厚
B.金黄色、糊状
C.陶土色、软膏状
D.淡黄色水样便
E.墨绿色、黏稠状
- 15.结肠癌最常见的组织学类型是
A.黏液癌
B.腺癌
C.未分化癌
D.黏液腺癌
E.类癌
- 16.引起再生障碍性贫血最多见的药物是
A.阿司匹林
B.柔红霉素
C.氯霉素
D.保泰松
E.环磷酰胺
- 17.麻疹的主要传播途径是
A.血液传播
B.呼吸道传播
C.消化道传播
D.皮肤接触传播
E.间接传播
- 18.好发于儿童的卵巢肿瘤是
A.无性细胞瘤
B.内胚窦瘤
C.畸胎瘤
D.颗粒细胞瘤
E.勃勒纳瘤
- 19.乳腺淋巴结转移的常见部位是
A.锁骨上淋巴结
B.锁骨下淋巴结
C.患侧腋下淋巴结
D.健侧腋下淋巴结
E.胸骨旁淋巴结
- 20.大便潜血持续阳性多提示
A.浅表性胃炎
B.萎缩性胃炎
C.胃溃疡
D.十二指肠壶腹部溃疡
E.胃癌
- 21.属于特异性感染的是
A.金黄色葡萄球菌感染
B.大肠埃希菌感染
C.铜绿假单胞菌感染
D.乙型溶血性链球菌感染
E.破伤风芽胞梭菌感染
- 22.女性生命中可发育成熟的卵泡数目是
A.200个或以下
B.200~300个
C.300~400个
D.400~500个
E.500个以上
- 23.心肺复苏后,最常见的继发性病理改

变是

- A. 心肌缺氧性损伤
- B. 肺透明膜形成
- C. 脑缺氧性损伤
- D. 急性胃黏膜糜烂
- E. 肾小管上皮细胞大量坏死

24. 诊断外伤性血气胸最简便可靠的依据是

- A. 病人出现呼吸困难及低血容量症状
- B. 胸腔穿刺抽出血液和气体
- C. X线检查患侧大片密度增高阴影
- D. 叩诊患侧为浊音,呼吸音减弱
- E. 胸部超声探查见有液平面

25. 颅内压的正常范围是

- A. 0.4~0.6 kPa (40~60 mmH₂O)
- B. 0.7~2.0 kPa (70~200 mmH₂O)
- C. 2.1~2.8 kPa (210~280 mmH₂O)
- D. 2.8~3.6 kPa (280~360 mmH₂O)
- E. 3.7~4.6 kPa (370~460 mmH₂O)

26. 属于高渗性脱水病理生理特点的是

- A. 失钠>失水
- B. 失水>失钠
- C. 失水=失钾
- D. 失钾<失水
- E. 失钠>失钾

27. 肠梗阻时,肠腔积液主要来自

- A. 经口饮入尚未被吸收的水
- B. 梗阻近端的胃肠分泌液
- C. 肠腔渗出液
- D. 肠壁血管漏出液
- E. 肠壁炎症渗出液

28. 肝癌特异性的血清标志物是

- A. 谷氨酰转肽酶
- B. 甲胎蛋白
- C. 谷丙转氨酶
- D. 乳酸脱氢酶同工酶
- E. α-抗胰蛋白酶

29. 有家族史的卵巢癌患者为

- A. 8%~12%

B. 15%~20%

C. 20%~25%

D. 25%~30%

E. 35%以上

30. 卵巢良性肿瘤中临床最常见的是

- A. 脂肪瘤
- B. 黏液性囊腺瘤
- C. 纤维瘤
- D. 浆液性囊腺瘤
- E. 成熟畸胎瘤

31. 与胆道蛔虫病发病无关的是

- A. 胃肠道功能紊乱
- B. 恶心、呕吐
- C. 体温升高
- D. 运动
- E. 驱虫不当

32. 主动脉瓣狭窄引起心功能代偿最主要的是

- A. 心脏节律改变
- B. 左心室肥厚
- C. 回心血容量增加
- D. 左心室腔扩大
- E. 右心房扩张

33. 引起左心室后负荷增加的主要因素是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 静脉回流增加
- C. 相对性主动脉瓣狭窄
- D. 外周血管阻力增加
- E. 动脉血容量增加

34. 急性胃炎按病因及病理变化的不同,分为不同类型,其中最常见的是

- A. 溃疡型
- B. 糜烂型
- C. 单纯型
- D. 出血型
- E. 感染型

35. 慢性支气管炎病情加剧的重要因素是

- A.大气污染
B.粉尘刺激
C.吸烟
D.反复感染
E.过敏
- 36.临床诊断新生儿低血糖标准为:血糖<
- A.1.2 mmol/L
B.1.67 mmol/L
C.2.2 mmol/L
D.3.2 mmol/L
E.3.67 mmol/L
- 37.引起上呼吸道感染的最常见病原体是
- A.革兰阳性细菌
B.病毒
C.肺炎支原体
D.肺炎衣原体
E.真菌
- 38.常见引起胃泌素升高的疾病是
- A.十二指肠球部溃疡
B.单纯型胃炎
C.胃溃疡
D.糜烂型胃炎
E.慢性萎缩性胃体胃炎
- 39.典型心绞痛的诱因中,应该除外
- A.情绪激动
B.贫血
C.体力劳动
D.睡眠
E.甲亢
- 40.患者被诊断为子痫前期轻度,其24小时尿蛋白定量超过
- A.0.15 g
B.0.3 g
C.0.4 g
D.0.5 g
E.0.7 g
- 41.先天性巨结肠的发病机制主要由于
- A.结肠的平滑肌发育不良
B.结肠交感神经丛发育不良
C.扩张结肠部分的平滑肌和弹力纤维发育不良
D.结肠肠壁的肌间神经节细胞缺失
E.病变发生在结肠近端
- 42.对判断新生儿缺血缺氧性脑病的预后有一定参考价值的检查是
- A.神经元特异性烯醇化酶
B.脑电图
C.头颅B超
D.CT扫描
E.核磁共振
- 43.妊娠期B超监护不能显示的项目是
- A.胎肺成熟度
B.胎方位
C.有无胎心搏动
D.胎头双顶径
E.胎盘位置
- 44.可提示功血的发生是由于黄体功能不足的检查为
- A.基础体温呈单相型
B.基础体温呈双相型,但上升缓慢,高温相10天
C.经前宫颈黏液结晶检查出现羊齿植物叶状结晶
D.经前血清孕酮值处在卵泡期水平
E.经前阴道脱落细胞涂片表现为中高度雌激素作用
- 45.关于复方短效口服避孕药避孕机制的说法,错误的是
- A.抑制排卵
B.通过异物的局部效应发挥作用
C.改变子宫内膜形态与功能,不适于受精卵着床
D.改变宫颈黏液性状使黏液量变少、黏度增高,不利精子穿透
E.受持续的雌、孕激素作用,输卵管的正常分泌和蠕动频率发生改变,从而改变受

精卵正常的运行速度

46.患者,女性,47岁。因子宫内膜癌行全子宫、双附件切除术及盆腔淋巴清扫术,术后48小时拔除尿管后自行排尿,第3天起阴道有尿液流出,同时仍可自行排尿,临床诊断为尿瘘,为明确瘘孔,不需做的辅助检查是

- A.宫腔镜检查
- B.靛胭脂试验
- C.输尿管镜检查
- D.排泄性尿路造影
- E.肾显像

47.吸气性呼吸困难严重者可出现三凹征,三凹征是指

A.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

B.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在呼气时明显下陷

C.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在吸气时明显下陷

D.胸骨下窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

E.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在呼气时明显下陷

48.形成慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是

- A.慢性支气管炎
- B.支气管哮喘
- C.支气管扩张
- D.肺结核
- E.肺间质纤维化

49.抗结核化学药物治疗的治疗原则是

- A.早期、联合、足量、规律、全程
- B.早期、联合、足量、规律、长期
- C.早期、联合、适量、规律、全程
- D.早期、联合、适量、规律
- E.早期、联合、适量、全程

50.诊断呼吸衰竭的正确依据是

- A.发绀,呼吸困难

B.肺通气功能明显减退

C.呼吸的节律、频率和幅度发生改变

D.结膜充血、水肿和精神、神经症状

E. $\text{PaCO}_2 > 6.6 \text{ kPa}$ (50 mmHg)、 $\text{PaO}_2 <$

8.0 kPa(60 mmHg)

51.干性支气管扩张的唯一症状是

- A.慢性咳嗽
- B.大量脓痰
- C.咯血
- D.咳痰与体位变化有关
- E.呼吸困难

52.可以导致心脏压力负荷加重的疾病是

- A.主动脉瓣关闭不全
- B.室间隔缺损
- C.甲状腺功能亢进
- D.肺动脉高压
- E.慢性贫血

53.室性期前收缩的心电图特征不包括

- A.提前出现的QRS波群
- B.QRS波群时限超过0.12秒
- C.QRS波宽大畸形
- D.QRS前有P波
- E.代偿间歇完全

54.急性心肌梗死最基本的病因是

- A.体力活动
- B.情绪激动
- C.血压剧升
- D.冠状动脉张力增高
- E.冠状动脉粥样硬化

55.目前最佳的系统性红斑狼疮筛选试验是

- A.狼疮细胞检查
- B.皮肤狼疮带试验
- C.抗核抗体检查
- D.血清补体测定
- E.毛细血管镜检查

56.有机磷农药中毒后,血液中胆碱酯酶活性

- A.不变
B.升至正常人的 70%以上
C.降至正常人的 70%以下
D.升至正常人的 90%以上
E.降至正常人的 90%以下
- 57.患者,男性,被汽车撞伤右胸部,呼吸 20 次/分,胸部 X 线检查示:右侧气胸,肺受压 20%,处理原则是
A.胸穿排气
B.观察病情
C.胸腔闭式引流
D.牵引固定
E.手术治疗
- 58.诊断膀胱肿瘤最重要、不可或缺的方法是
A.膀胱镜检查
B.膀胱造影
C.双合诊检查
D.尿脱落细胞检查
E.尿道超声检查
- 59.骨巨细胞瘤属于
A.骨瘤样病损
B.良性肿瘤
C.继发性肿瘤
D.恶性肿瘤
E.潜在恶性肿瘤
- 60.擦伤的特点是
A.皮下淤血、肿胀
B.皮肤水肿
C.表皮破损
D.皮肤呈多数小裂口及浆液渗出
E.创缘较平整,出血可渗可涌
- 61.供移植器官的保存原则是
A.常温保存
B.低温原则
C.延长热缺血时间
D.变冷缺血为热缺血
E.中断血流后不应立即降温
- 62.乳腺癌最常见的病理类型是
A.非浸润性癌
B.早期浸润性癌
C.浸润性特殊癌
D.浸润性非特殊癌
E.其他罕见癌
- 63.腺病毒肺炎的发病年龄多见于
A.新生儿
B.2~6 个月婴儿
C.6~12 个月婴儿
D.6~24 个月婴儿
E.任何年龄
- 64.猩红热治疗首选抗生素是
A.红霉素
B.青霉素
C.新霉素
D.庆大霉素
E.四环素
- 65.符合正常卵巢临床特征的是
A.成年女性卵巢约 4 cm×3 cm×1 cm 大小
B.卵巢由骨盆漏斗韧带与子宫相连
C.卵巢髓质内有数以万计的原始卵泡
D.位于阔韧带内
E.卵巢白膜是一层立方上皮
- 66.胎儿纵轴与母体纵轴的关系称为
A.胎姿势
B.胎儿位置
C.胎产式
D.胎先露
E.胎方位
- 67.软产道裂伤多见于
A.阴道手术操作不当
B.胎盘植入
C.凝血功能障碍
D.软产道充分扩张
E.产程延长
- 68.可以早期鉴别葡萄胎和侵蚀性葡萄胎的检查是
A.胸部 X 线摄片

- B.刮宫葡萄胎标本
C.B超及彩色多普勒
D.子宫输卵管造影术或宫腔镜
E.血清 β -hCG检测
- 69.引起支气管扩张的最常见病因是
A.支气管先天性发育缺陷
B.支气管外部纤维的牵拉
C.支气管-肺组织感染和阻塞
D.遗传因素
E.机体免疫功能失调
- 70.不属于非特异性感染病原体的是
A.大肠杆菌
B.结核杆菌
C.金黄色葡萄球菌
D.乙型溶血性链球菌
E.铜绿假单胞菌
- 71.患者,男性,77岁。高血压数年,近月来睡眠不佳,排尿困难,体重下降,且有腹部不适感,左侧腹股沟区出现肿块并逐渐增大,可进入阴囊,考虑该患者可能是腹股沟疝,与发病有关的因素是
A.高血压数年
B.睡眠不佳
C.排尿困难
D.腹部不适
E.体重下降
- 72.肾病综合征最根本的病理生理特点是
A.水肿
B.蛋白尿
C.低蛋白血症
D.血清胆固醇增高
E.低密度脂蛋白增高
- 73.膀胱炎的特征性表现不包括
A.尿频
B.尿急
C.尿痛
D.排尿困难
E.晨尿有氨臭味
- 74.患者,女性,55岁。行ECG检查示:P波消失,代之是400次/分左右的f波,QRS波形态正常,QRS波群间绝对不规则,心室率通常在每分钟110次,从心电图可诊断
A.房扑
B.室扑
C.房颤
D.室上速
E.室速
- 75.患者,男性,56岁。半年前因原发性肝癌行右半肝切除术,手术后建议其门诊定期随访。最能早期预测癌肿复发的检查是
A.ALT
B.GGT
C.B型超声检查
D.选择性肝动脉造影
E.动态监测AFP的变化
- 76.我国引起慢性肾衰竭的最常见病是
A.慢性肾盂肾炎
B.慢性肾小球肾炎
C.狼疮性肾炎
D.高血压肾病
E.糖尿病肾病
- 77.诊断贫血时血红蛋白含量正确的是
A.男性 <160 g/L,女性 <150 g/L
B.男性 <150 g/L,女性 <140 g/L
C.男性 <140 g/L,女性 <130 g/L
D.男性 <130 g/L,女性 <120 g/L
E.男性 <120 g/L,女性 <110 g/L
- 78.确诊CO中毒最主要的依据是
A.CO接触史
B.口唇颜色
C.血液中碳氧血红蛋白含量
D.昏迷的深度
E.缺氧的程度
- 79.对休克的认识正确的是
A.休克就是动脉血压下降的情况
B.休克就是心排出量减少的情况

C.休克就是各种原因引起的组织灌注不足和细胞缺氧的结果

D.休克就是心力衰竭

E.休克是遭受打击后意识丧失

80.应用复苏药物的目的不包括

A.防治感染

B.防治心律失常

C.纠正急性酸中毒

D.补充血容量和电解质

E.防治脑水肿

81.判断甲状腺功能亢进患者病情程度的主要指标是

A.食欲亢进程度

B.脉率增快和脉压增大的程度

C.突眼程度

D.甲状腺肿大程度

E.体重减轻程度

82.腹膜刺激征是指

A.压痛、反跳痛、肌紧张

B.肠鸣音亢进、压痛、反跳痛

C.肠鸣音消失、腹痛、腹泻

D.板状腹、压痛、腹泻

E.反射性呕吐、恶心、腹泻

83.X线检查可见气液平面及胀气肠袢的时间在肠梗阻发生后

A.1~2小时

B.2~4小时

C.4~6小时

D.6~8小时

E.8~10小时

84.不符合肺炎克雷伯杆菌肺炎临床特点的是

A.白红细胞正常或增加

B.咳嗽,咳红棕色胶冻状痰

C.青壮年多见,预后良好

D.起病急、胸痛、畏寒

E.对庆大霉素及第三代头孢菌素敏感

85.患者,男性,54岁。于晚餐后突发上腹持续性剧痛。考虑急性胰腺炎,其血清淀粉酶升高的规律是

A.发病后2小时开始升高,12小时达高峰

B.发病后1~2小时开始升高,24小时达高峰

C.发病后24小时开始升高,48小时达高峰

D.发病后12小时开始升高,72小时达高峰

E.发病后48小时开始升高,72小时达高峰

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(86~87题共用备选答案)

A.脐部

B.呼吸道

C.消化道

D.皮肤

E.胎盘

86.新生儿感染性肺炎出生前的常见感染途径是

87.新生儿感染性肺炎出生后的常见感染途径是

(88~90题共用备选答案)

A.游离移植

B.带蒂移植

C.吻合移植

D.输注移植

E.联合移植

88.游离皮片移植属于

89.肾移植属于

90.骨髓移植属于

(91~92题共用备选答案)

- A.尿培养
B.痰培养
C.血培养
D.粪便培养
E.骨髓培养
- 91.确诊伤寒最常用的方法是
92.细菌性痢疾的确诊依据是
(93~95 题共用备选答案)
- A.窦前
B.窦后
C.窦内
D.肝前
E.肝后
- 93.肝炎后肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
94.血吸虫肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
95.肝静脉阻塞综合征所致门静脉高压

症的主要阻塞部位在

(96~97 题共用备选答案)

- A.血红蛋白 30~60 g/L
B.血红蛋白<120 g/L
C.血红蛋白<110 g/L
D.血红蛋白 90~120 g/L
E.血红蛋白 145 g/L

96.6 个月至 6 岁小儿贫血的诊断标准是

97.6~14 岁小儿贫血的诊断标准是

(98~100 题共用备选答案)

- A.圆韧带
B.主韧带
C.阔韧带
D.宫骶韧带
E.骨盆漏斗韧带

98.固定子宫颈于正常位置的韧带是

99.间接保持子宫呈前倾位置的韧带是

100.维持子宫在盆腔正中央的韧带是



相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这这母所属的方框涂黑。

1. 不属于艾滋病传播途径的是
 - A. 同性性接触
 - B. 异性性接触
 - C. 同桌进餐
 - D. 输血
 - E. 分娩
2. 移位菌群失调的原因不包括
 - A. 使用抗菌药物不恰当
 - B. 外科手术
 - C. 插管或介入治疗
 - D. 免疫功能降低
 - E. 细菌结构变化
3. 治疗鹅口疮错误的是
 - A. 2%碳酸氢钠液擦洗口腔
 - B. 积极治疗原发病
 - C. 局部涂甲紫
 - D. 加大抗生素剂量
 - E. 局部应用抗真菌药物
4. 无菌物品的保存方法不当的是
 - A. 储物架及运送车要保持干净
 - B. 无菌物品应有合格标志,并标明灭菌日期
 - C. 快速压力蒸汽灭菌物品不论是否潮湿,均可保存 7~14 天
 - D. 储藏房间要保持湿式清扫,避免扬尘
 - E. 无菌物品应与未无菌物品分开存放
5. 下列沟通障碍的原因中不属于发送者障碍的有
 - A. 目的不明,导致信息内容的不确定性
 - B. 表达模糊,导致信息传递错误
 - C. 选择失误,导致信息误解的可能性增大
 - D. 言行不当,导致信息理解错误
 - E. 过度加工,导致信息的模糊或失真
6. 传染病区设置隔离室的主要目的是
 - A. 为病人提供良好的休息环境
 - B. 便于对病人进行监护
 - C. 将感染源与传播的途径分开
 - D. 将感染源与易感宿主从空间上分开
 - E. 方便家属探视
7. 医院感染暴发中流行病学处理的基本步骤,前三步是
 - A. 证实流行或暴发→查找感染源→查找引起感染的因素
 - B. 证实流行或暴发→组织落实有效的控制措施→写出调查报告
 - C. 查找感染源→证实流行或暴发→查找引起感染的因素
 - D. 查找引起感染的因素→证实流行或暴发→查找感染源
 - E. 查找感染源→查找引起感染的因素→证实流行或暴发
8. 口腔科的牙钻属于
 - A. 高度危险性物品
 - B. 中度危险性物品
 - C. 低度危险性物品
 - D. 高度水平消毒物品
 - E. 中度水平消毒物品
9. 当为某冠心病病人进行健康教育时,病人向你表达了他认为吸烟对他的健康不会产生影响,所以即使在患病期间,他仍然不想戒烟,病人的这种行为受到了哪类因素的影响
 - A. 倾向因素
 - B. 促成因素
 - C. 强化因素
 - D. 环境因素
 - E. 学习因素
10. 资源评估属于
 - A. 管理与政策诊断

- B.组织诊断
C.环境诊断
D.社会诊断
E.行为诊断
- 11.下列化学消毒剂中,可用于空气消毒的是
- A.2%戊二醛
B.75%乙醇
C.2%过氧乙酸
D.3%过氧化氢
E.0.5%氯己定
- 12.不耐热、不耐湿的物品消毒宜选用
- A.环氧乙烷气体熏蒸
B.紫外线照射法
C.高压蒸汽法
D.消毒液浸泡法
E.电离辐射法
- 13.关于控制的叙述,错误的是
- A.监视各项活动以保证它们按计划进行并纠正各种重要偏差的过程
B.控制的重要性包括在执行组织计划中的保障作用和和管理职能中的关键作用
C.控制的类型包括前馈控制、同期控制和反馈控制
D.控制的基本过程包括建立标准、衡量绩效和纠正偏差
E.控制的基本方法包括预算控制、质量控制、进度控制和数据控制
- 14.对病人最后的护理结果的质量评价属于
- A.基础质量管理
B.绩效管理
C.环节质量管理
D.过程质量管理
E.终末质量管理
- 15.近中期效果评价是指
- A.形成评价
B.过程评价
C.效应评价
D.结局评价
E.总结评价
- 16.注射后处理针头的方法错误的是
- A.用过的针头采用双手“复帽”
B.不将针尖指向身体任何部位
C.使用后不用手去除针头
D.将针头放入防水耐刺穿的容器内
E.用过的针头不再重复使用
- 17.属于原位菌群二度失调的是
- A.正常菌群在原有部位发生了数量的暂时性变化
B.正常菌群在原有部位发生了种类结构的暂时性变化
C.正常菌群在原有部位比例发生了病理性波动
D.正常菌群转移到另一部位定植或定居
E.可逆性失调
- 18.连续使用的氧气湿化瓶应
- A.每周消毒2次,用后终末消毒,干燥保存
B.每日清洁,用后消毒,干燥保存
C.每日消毒,用后终末消毒,干燥保存
D.每周1次消毒,用后终末消毒,干燥保存
E.专人专用,用后进行终末消毒
- 19.护理管理的实践性下列哪句不妥
- A.护理工作时间性强,要按时完成护理服务
B.护理工作面广量大,护士常处于劳累状态
C.护理工作要保证24小时连续不间断
D.护理工作责任性强,护士常处于紧张状态
E.护士为护理对象提供健康服务就是管理过程
- 20.微生物从外界环境落到人体,并在一定部位不断生长、繁殖后代,这种现象称为
- A.植入
B.转移
C.定植

- D.定居
E.易位
- 21.根据标准预防的概念,下列不被看作具有传染性的物质是
- A.粪便和尿液
B.体液
C.分泌物
D.血液
E.汗液
- 22.科学管理理论的基本出发点为
- A.提高劳动生产率
B.实行科学化管理
C.调动人的积极性
D.体现公平的分配制度
E.建立健全的管理系统
- 23.护理部根据护理专业的发展变化及时调整工作模式,遵循的动态管理原则是
- A.系统原则
B.效益原则
C.弹性原则
D.人本原则
E.价值原则
- 24.感染病人使用后的器械,正确的处理程序是
- A.消毒、去污、清洗、灭菌
B.去污、清洗、消毒、灭菌
C.清洗、去污、消毒、灭菌
D.去污、消毒、清洗、灭菌
E.清洗、灭菌、消毒、去污
- 25.在确定健康教育的计划目标时错误的是
- A.总体目标必须最终得以实现
B.具体目标是由三个“W”和两个“H”组成
C.总体目标是宏观的,较为笼统的
D.总体目标可分解为多个具体目标
E.具体目标是一些具体的量化的指标
- 26.危害健康的行为不包括
- A.高脂高糖低纤维素饮食
B.A型行为
C.不良生活习惯
D.戒烟
E.C型行为
- 27.除下列哪项外,均是采用观察法收集的资料
- A.测量患者的体温
B.听右下肺有无湿啰音
C.触摸皮肤温度、湿度
D.阅读患者的查体记录
E.查看患者尿液的颜色
- 28.可达到高水平消毒法的是
- A.聚维酮碘
B.苯扎溴铵
C.过氧化氢
D.氯己定
E.乙醇
- 29.喹诺酮类抗菌药的主要作用机制是
- A.干扰细菌细胞壁合成
B.损伤细胞膜
C.影响细菌蛋白质的合成
D.抑制细菌核酸的形成
E.抑制固醇类药物的合成
- 30.真菌引起的医院感染中,最常见的致病菌是
- A.毛霉菌
B.隐球菌
C.光滑念珠菌
D.白色念珠菌
E.李斯特菌
- 31.社交距离通常是指
- A.1.2~4 m
B.4 m 以外
C.50~120 cm
D.50 cm 以内
E.100 cm 以内
- 32.基础护理合格率的评价属于
- A.基础质量评价
B.服务质量评价
C.环节质量评价
D.过程质量评价

- E. 终末质量评价
33. 下列属于高度危险物品的是
- A. 胃镜
 - B. 体温表
 - C. 便盆
 - D. 导尿管
 - E. 压舌板
34. 经粪-口途径传播的肝炎病毒有
- A. 甲型、丙型肝炎病毒
 - B. 甲型、戊型肝炎病毒
 - C. 乙型、丙型肝炎病毒
 - D. 丙型、戊型肝炎病毒
 - E. 甲型、乙型肝炎病毒
35. 下列区域物体表面消毒不合格的是
- A. 普通手术室, 细菌总数 ≤ 5 cfu/cm², 未检出致病菌
 - B. 急诊抢救室, 细菌总数 ≤ 10 cfu/cm², 未检出致病菌
 - C. 肝炎病房, 细菌总数 ≤ 15 cfu/cm², 未检出致病菌
 - D. 注射室, 细菌总数 ≤ 15 cfu/cm², 未检出致病菌
 - E. 新生儿室的工作人员, 细菌总数 ≤ 5 cfu/cm², 未检出致病菌
36. 手术前需预防性使用抗生素的是
- A. 经阴道子宫切除术
 - B. 甲状腺手术
 - C. 疝修补术
 - D. 子宫肌瘤切除术
 - E. 扁桃体摘除术
37. 我国护理管理标准规定一级医院医师与护理人员之比为
- A. 1 : 2
 - B. 1 : 3
 - C. 1 : 4
 - D. 1 : 1
 - E. 2 : 3
38. 被公认为“科学管理之父”的管理学家是
- A. 卢因
 - B. 泰勒
 - C. 韦伯
 - D. 亚当斯
 - E. 梅奥
39. 医疗用品污染后的危害程度可分为几类
- A. 1 类
 - B. 3 类
 - C. 5 类
 - D. 7 类
 - E. 9 类
40. “爱探究、好攻击、易激惹、喜欢自我表现”属于哪一行为发展阶段的主要表现
- A. 被动发展阶段
 - B. 主动发展阶段
 - C. 自主发展阶段
 - D. 巩固发展阶段
 - E. 自我发展阶段
41. 不属于目标管理局限性的是
- A. 目标制定有难度
 - B. 限制管理者能力发挥
 - C. 缺乏灵活性
 - D. 常忽视成本估计
 - E. 缺乏连续性
42. 随着计算机技术的日益成熟和广泛应用, 管理幅度管理層级的理论也发生着革命性的变化, 不符合目前变化的是
- A. 中层管理功能正逐渐由计算机完成
 - B. 组织管理幅度变宽
 - C. 组织管理層级变少
 - D. 组织日益由扁平化走向高耸型
 - E. 信息传递加快
43. 组织图不能提供的信息是
- A. 指挥关系
 - B. 人、财、物的流向
 - C. 管理幅度
 - D. 集中与分散
 - E. 组织规模
44. 护理人才结构的群体结构不包括
- A. 专业结构

- B.能级结构
C.年龄结构
D.知识结构
E.智能结构
- 45.“条条大路通罗马”描述的有效沟通的策略是
A.避免一味说教
B.使用恰当的沟通方式
C.考虑接受者的观点和立场
D.以行动强化语言
E.充分利用反馈机制
- 46.不属于协调基本要求的是
A.及时协调与连续协调相结合
B.从根本上解决问题
C.调动当事者的积极性
D.以大多数人的利益为主
E.相互尊重
- 47.病房护士长最有效的监督方法是
A.听取所有护士的汇报
B.直接观察
C.指派专人监督
D.护士之间相互尊重
E.护士之间相互监督
- 48.质量观的演变过程中,提出“全面顾客满意”概念的阶段是
A.“符合性质量”阶段
B.“适用性质量”阶段
C.“满意性质量”阶段
D.“卓越性质量”阶段
E.“全面质量满意”阶段
- 49.在护理质量管理中树立“第一次把事情做对”观念的护理质量管理基本原则是
A.以患者为中心原则
B.预防为主原则
C.工作标准“零缺陷”原则
D.全员参与原则
E.基于事实的决策方法原则
- 50.按教育目的或内容进行分类,不属于健康教育研究领域范畴的是
A.学校健康教育
B.防治疾病健康教育
C.营养健康教育
D.环境保护健康教育
E.生殖健康教育
- 51.对信息和讯息的界定不正确的是
A.讯息是一种信息
B.信息泛指人类社会传播的一切内容
C.讯息传播产生传、受双方有意义的交换
D.讯息传播产生传、受双方之间的互动
E.讯息是由信息符号构成的抽象信息
- 52.小组讨论时,一般适宜的小组人数为
A.2~5人
B.3~6人
C.6~10人
D.10~15人以上
E.15~20人
- 53.患者在门诊诊疗过程中接受的健康教育称为
A.住院教育
B.病房教育
C.随访教育
D.门诊教育
E.入院教育
- 54.在实施患者健康教育时,首先要进行的是
A.确定患者教育目标
B.分析患者的需求
C.制订患者教育计划
D.考虑患者教育的形式
E.评价教育需求
- 55.属于医院获得性感染的是
A.新生儿呕吐
B.新生儿水痘
C.新生儿红斑
D.新生儿黄疸
E.新生儿脐红
- 56.影响人体微生态平衡的因素不包括
A.免疫系统疾病
B.腰穿

- C.长期服用抗生素
D.慢性咽炎
E.长期静脉输液
- 57.紫外线灯照射强度监测至少应
- A.每月一次
B.每季度一次
C.每半年一次
D.每年一次
E.每一年半一次
- 58.医务人员应立即洗手的条件是
- A.接触患者的分泌物前
B.接触患者的血液前
C.脱去污染手套后
D.接触同一个患者身体的同一部位时
E.接触污染器械前
- 59.甲型肝炎传播途径不包括
- A.粪-口途径
B.密切接触
C.垂直传播
D.粪便污染食物
E.粪便污染水源
- 60.乙型肝炎的传播途径是
- A.通过共同就餐传播
B.通过拥抱传播
C.通过共用牙刷和剃刀
D.通过空气传播
E.通过握手传播
- 61.系统的特性不包括
- A.整体性
B.目的性
C.相关性
D.内部适应性
E.层次性
- 62.护理仪器设备的维护计划是
- A.战略性计划
B.战术性计划
C.综合性计划
D.长期计划
E.短期计划
- 63.目标管理的基本精神是

- A.以自我管理为中心
B.员工参与管理
C.重视成果
D.强调自我评价
E.以共同制定的目标为依据
- 64.沟通障碍中属于接受者障碍的是
- A.目的不明
B.表达模糊
C.选择失误
D.过度加工
E.言行不当
- 65.有效沟通策略中不正确的是
- A.使用正式沟通的方式
B.考虑接受者的观点和立场
C.充分利用反馈机制
D.以行动强化语言
E.避免一味说教
- 66.正确的谈话技巧是
- A.善于掌控下属发言内容
B.善于启发下属聆听,控制情绪
C.善于启发下属讲真情实话
D.善于抓住所有问题
E.善于规避敏感话题
- 67.医疗护理所用材料及药品购买控制,其控制的对象类型是
- A.作业
B.人员
C.信息
D.财务
E.组织绩效
- 68.不属于护理管理控制关键点的是
- A.高危时间
B.高危患者
C.高危护士
D.关键制度
E.所有科室
- 69.获取患者满意程度的最佳方式是
- A.问卷调查
B.电话随访
C.患者投诉

- D.与患者直接沟通
E.第三方调查
- 70.健康促进的三个基本策略是
A.提倡、协调、控制
B.提倡、赋权、协助
C.控制、赋权、协调
D.控制、赋权、倡导
E.倡导、赋权、协调
- 71.不属于健康促进活动领域的是
A.制定促进健康的公共政策
B.描述人群的健康状况
C.发展个人技能
D.加强社区行动
E.调整卫生服务方向
- 72.人的行为的基本构成要素有行为主体、行为客体、行为环境、行为手段和
A.行为动机
B.行为目的
C.行为计划
D.行为过程
E.行为结果
- 73.人类的行为因遗传、环境以及学习经历的不同而千差万别,丰富多彩,表现出较大的
A.目的性
B.可塑性
C.一致性
D.差异性
- E.规律性
- 74.危害健康行为的主要特点是危害性、明显和稳定性以及
A.连续性
B.单一性
C.危险性
D.多样性
E.习得性
- 75.健康信息应具有的特点中,针对性是指
A.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播者的需求和特点
B.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播媒介的特点
C.健康信息的选择、制作、传递必须针对受者的需求和特点
D.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播环境的特点
E.健康信息的选择、制作、传递必须针对主管部门的需求和特点
- 76.健康传播中受者在接触信息时普遍存在的心理特点不包括
A.求异
B.求真
C.求短
D.求新
E.求近

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- (77~78 题共用备选答案)
- A.胃炎
B.痰中培养大肠埃希杆菌
C.阑尾炎
D.新生儿腹泻
E.产后乳腺炎
- 77.通过消毒、灭菌、隔离、无菌技术等措施可有效地预防和控制的是
- 78.通过合理使用抗菌药物和免疫抑制类药物降低感染风险的是
- (79~81 题共用备选答案)
- A.高压蒸汽灭菌
B.干热灭菌
C.滤过除菌
D.紫外线
E.煮沸消毒
- 79.空气的消毒宜采用
- 80.动物免疫血清的除菌宜采用

- 81.手术用金属器械宜采用
(82~83 题共用备选答案)
- A.戴清洁手套
B.戴一次性手套
C.戴医用口罩
D.戴口罩
E.穿隔离衣
- 82.医务人员接触血液及污染物品时应
- 83.进行手术等无菌操作时应
(84~86 题共用备选答案)
- A.信息源
B.编码
C.传递信息
D.解码
E.反馈
- 84.信息被译成能理解的一系列符号的过程属于沟通步骤中
- 85.包括接受、译码和理解三个环节的沟通步骤是
- 86.信息沟通属于沟通步骤中的
(87~89 题共用备选答案)
- A.目标控制
B.进度控制
C.预算控制
D.质量控制
E.技术控制
- 87.将实际情况与预算计划对比检查,及时发现问题、纠正偏差的控制方法是
- 88.对生产和工作的进程在时间上进行控制的方法是
- 89.把执行结果与预期目标及标准进行对照检查,以发现问题,采取纠偏措施的控制
(90~91 题共用备选答案)
- A.呼吸机相关性肺炎
B.呼吸衰竭
C.肺癌
D.新生儿腹泻
E.结肠癌
- 90.属于医院感染的是
- 91.不属于医院感染的是
(92~94 题共用备选答案)
- A.碘伏消毒液原液局部擦拭 2 遍
B.碘伏消毒液原液局部擦拭
C.20 000 mg/mL 葡萄糖酸氯己定擦拭
D.有效含量>1 g/L 氯己定乙醇溶液局部擦拭 2~3 遍
E.3%过氧化氢冲洗
- 92.适用于穿刺部位的皮肤消毒的方法为
- 93.适用于手术切口部位的皮肤清洁方法为
- 94.适用于伤口创面消毒的冲洗方法为
(95~97 题共用备选答案)
- A.管理的科学性
B.管理的自然属性
C.管理的广泛性
D.人和时间
E.能源和信息
- 95.管理的基本特征
- 96.护理管理的特点
- 97.管理二重性的体现
(98~100 题共用备选答案)
- A.倒放
B.竖放
C.平放
D.斜放
E.侧放
- 98.手术器械包、硬式容器应
- 99.盆、盘、碗类物品应
- 100.纸袋、纸塑包装应

专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这这母所属的方框涂黑。

1. 治疗休克首要和最基本的措施是
 - A. 积极处理原发病
 - B. 纠正酸碱平衡失调
 - C. 应用血管活性药物
 - D. 纠正微循环障碍
 - E. 尽快恢复有效血容量
2. 破伤风治疗的中心环节是
 - A. 彻底清创
 - B. 使用抗生素
 - C. 控制痉挛
 - D. 纠正水、电解质紊乱
 - E. 使用 TAT
3. 烧伤局部有水疱,基底潮红并有剧痛,其烧伤程度为
 - A. I 度
 - B. 浅 II 度
 - C. 深 II 度
 - D. III 度
 - E. I 度至 II 度
4. 左半结肠癌的主要表现应除外
 - A. 腹泻、便秘
 - B. 腹胀
 - C. 腹痛
 - D. 肠梗阻
 - E. 腹部肿块
5. 牵引复位的适应证是
 - A. 跟骨压缩骨折
 - B. 桡骨裂缝骨折
 - C. 胫骨青枝骨折
 - D. 股骨干斜形骨折
 - E. 骨盆骨折
6. 成年人全关节结核并有窦道形成,最佳的治疗措施是
 - A. 全身抗结核治疗
 - B. 石膏固定,开窗换药
 - C. 加强支持,开窗换药
 - D. 病灶清除,关节融合
 - E. 病灶清除,关节滑膜切除
7. 急性乳腺炎的基本预防措施是
 - A. 经常按摩乳房
 - B. 小量多次哺乳
 - C. 排空剩余乳汁
 - D. 乳头出现破损应及时回乳
 - E. 每次哺乳后清洁乳房
8. 女性,检查为念珠菌阴道炎。护士指导其选用阴道清洗液为
 - A. 呋喃西林
 - B. 1% 乳酸
 - C. 氯己定
 - D. 1 : 5 000 高锰酸钾
 - E. 2%~4% 碳酸氢钠
9. 初产妇,28 岁。宫口已开全 2.5 小时后,胎儿还未娩出。该产妇发生了
 - A. 第二产程延长
 - B. 潜伏期延长
 - C. 胎盘滞留
 - D. 胎盘嵌顿
 - E. 活跃期停滞
10. 青春期生长发育特点不包括
 - A. 生殖系统迅速发育
 - B. 进入第二个生长发育高峰
 - C. 男女第二性征出现
 - D. 神经内分泌调节功能稳定
 - E. 女孩出现月经,男孩有排精
11. 乙肝疫苗第 1 次接种时间是
 - A. 出生后 1~2 天
 - B. 出生 1 个月以上
 - C. 出生 4 个月以上

- D. 出生 8 个月以上
E. 1 岁以上
12. 正式临产的标志是
A. 见红
B. 胎膜早破
C. 下腹隐痛
D. 有规律的子宫收缩
E. 先露入盆
13. 新生儿 Apgar 评分指标不包括
A. 心率
B. 体温
C. 呼吸
D. 皮肤颜色
E. 喉反射
14. 区分轻型与重型腹泻的依据是
A. 呕吐、腹泻的次数
B. 有无水、电解质紊乱
C. 大便镜检可见脂肪球
D. 酸中毒程度
E. 患者精神状态
15. 现将 2 份生理盐水配上 1 份 1.4% 碳酸氢钠液体, 护士计算其张力为
A. 等张
B. 2/3 张
C. 1/2 张
D. 1/4 张
E. 2/5 张
16. 法洛三联症患儿, 男, 2 岁。今晨突然晕厥、抽搐, 最可能的原因是
A. 合并脑血栓
B. 合并脑肿瘤
C. 合并脑膜炎
D. 高热
E. 肺动脉漏斗部肌肉痉挛
17. 缓解急性心肌梗死胸部疼痛宜用
A. 吗啡
B. 休息和吸氧
C. 索米痛片(去痛片)
D. 硝酸甘油
E. 非甾体类抗炎药
18. 预防缺铁性贫血, 早产儿补充铁剂的时间是
A. 1 月龄
B. 3 月龄
C. 6 月龄
D. 2 月龄
E. 8 月龄
19. 导致婴儿期心力衰竭的最常见病因是
A. 心肌炎
B. 心内膜弹性纤维增生症
C. 肺透明膜病变
D. 先天性心脏病
E. 肾病综合征
20. 对于淋病的描述正确的是
A. 潜伏期长达 3~5 周
B. 病理分急性和慢性两种
C. 下肢水肿
D. 慢性淋病时, 淋菌存在于生殖器分泌物中
E. 镜下血尿为早期症状
21. 肝癌引起肝区疼痛的特点是
A. 持续性钝痛或胀痛
B. 间歇性隐隐作痛
C. 饭后痛
D. 空腹或夜间疼痛为主
E. 剧烈的绞痛
22. 在初次使用胰岛素治疗时, 一般选用
A. 速效胰岛素制剂从小剂量开始
B. 长效胰岛素制剂从大剂量开始
C. 速效胰岛素制剂从大剂量开始
D. 速效胰岛素与长效胰岛素制剂联合应用
E. 长效胰岛素制剂从小剂量开始
23. 高渗性脱水的典型临床表现是
A. 皮肤弹性差
B. 尿比重增高
C. 谵妄

- D.口渴
E.神志不清
- 24.患者,男性,46岁。车祸导致骨折并有大量出血,病人有休克表现,应采取的体位是
- A.头高足低位
B.右侧卧位
C.去枕平卧位
D.头和躯干抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 下肢抬高 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$
E.半坐位
- 25.下列腹腔脏器损伤后,检查时腹膜刺激征不明显的是
- A.胆囊破裂
B.脾破裂
C.胰腺损伤
D.结肠穿孔
E.胃穿孔
- 26.若病人大便带血,便时、便后剧痛,考虑出现
- A.外痔
B.肛裂
C.肛痿
D.混合痔
E.肛管周围脓肿
- 27.符合小脑幕切迹疝的临床表现是
- A.剧烈头痛、频繁呕吐
B.颈项强直、强迫头位
C.意识障碍、呼吸抑制
D.意识障碍、瞳孔忽大忽小
E.意识障碍、一侧瞳孔散大、对侧偏瘫
- 28.肘上桡神经损伤的典型表现是
- A.手腕下垂
B.不能主动伸指间关节
C.环指、小指爪形手畸形
D.手指掌背侧感觉消失
E.拇指对掌功能障碍
- 29.以下时期中小儿生长发育速度最快的是

- A.学龄前期
B.幼儿期
C.学龄期
D.婴儿期
E.新生儿期
- 30.以下加强子宫收缩的方法中需专人监护的是
- A.灌肠
B.人工破膜
C.食疗
D.缩宫素静脉滴注
E.导尿
- 31.女性内生殖器官正确的说法除外
- A.成年人子宫重约 50 g
B.阴道壁由黏膜层、肌层和纤维层构成
C.子宫壁分为三层
D.输卵管长 8~14 cm
E.阴道黏膜表面由柱状上皮覆盖
- 32.以下疫苗应在新生儿期接种的是
- A.脊髓灰质炎糖丸
B.破伤风抗毒素
C.乙脑疫苗
D.流感疫苗
E.卡介苗、乙肝疫苗
- 33.下面说法不正确的是
- A.胎头是成熟胎儿身体最大部分
B.小囟门由 4 块骨骼组成
C.胎头有矢状缝、冠状缝、人字缝
D.枕下前因径是胎头最小径线
E.枕颈径是胎头最大径线
- 34.早产儿因肺发育不全多引发
- A.新生儿窒息
B.肺大疱破裂
C.坠积性肺炎
D.肺不张
E.肺透明膜病
- 35.维生素 D 的佝偻病预防剂量为每日
- A.200~300 U
B.300~400 U

- C.400~800 U
D.1 000~1 200 U
E.1 500~1 800 U
- 36.稳定型心绞痛,其心绞痛发作的特征是
- A.性质在1~3个月无改变
B.程度在2~3个月无改变
C.心电图无改变
D.性质在2~3个月无改变
E.程度在1~3个月无改变
- 37.动脉导管未闭患儿典型临床表现为
- A.肺动脉段突出
B.缺氧发作
C.周围血管征、脉压增宽
D.肺动脉第2音固定分裂
E.面色青紫
- 38.放射性碘治疗不适宜下列哪种情况
- A.年龄30岁以上的弥漫性甲亢病人
B.抗甲状腺药物治疗无效或复发病病人
C.有心肾疾病不适宜手术病人
D.孕妇及哺乳期甲亢病人
E.高功能性甲状腺腺瘤病人
- 39.服用格列本脲的糖尿病病人爬山后感饥饿、心慌、手抖,伴大汗,可能是由于
- A.合并胃溃疡
B.糖尿病加重
C.合并高血压
D.出现低血糖
E.合并甲亢
- 40.由肾实质性因素导致的急性肾衰中,最常见的类型是
- A.急性肾炎
B.急进性肾炎
C.急性肾小管坏死
D.急性间质性肾炎
E.多发性小血管炎
- 41.乳腺癌根治术后有利于伤口愈合的护理是
- A.早期下床活动
B.鼓励患者咳嗽
C.半卧位
D.活动患肢
E.保持皮瓣负压吸引通畅
- 42.针刺意外感染艾滋病毒者用AZT预防性治疗的疗程为
- A.1~2周
B.4~6周
C.8~10周
D.12~14周
E.16~18周
- 43.下列关于肿瘤化疗的护理叙述不正确的是
- A.药液必须新鲜配制
B.药液不可溢出静脉外
C.若出现药液外渗,应立即热敷
D.每周检查白细胞和血小板计数
E.用后的注射器和空药瓶应单独处理
- 44.乳房自我检查最好在月经后
- A.1~3天
B.3~4天
C.4~7天
D.7~10天
E.10~12天
- 45.不符合猩红热特点的是
- A.皮疹间皮肤正常
B.口周苍白圈
C.杨梅舌
D.帕氏线
E.脱皮后无色素沉着
- 46.下列哪项不是慢性粒细胞性白血病进入加速期的表现
- A.不明原因发热
B.骨、关节疼痛
C.乏力、消瘦盗汗
D.贫血、出血突出加重
E.脾脏迅速肿大
- 47.化脓性脑膜炎脑脊液的特点不正确的是

- A.压力升高
B.外观浑浊
C.蛋白质升高
D.糖含量下降
E.白细胞数目下降
- 48.慢性呼吸衰竭患者必须给予氧疗的指征为动脑血氧分压低于
- A.45 mmHg
B.50 mmHg
C.55 mmHg
D.60 mmHg
E.65 mmHg
- 49.不符合脑震荡表现的是
- A.意识障碍多在30分钟以上
B.有逆行性遗忘
C.清醒后可出现头痛、恶心症状
D.神经系统查体无阳性体征
E.CT检查颅内无异常发现
- 50.颈部手术病人术后坐起的时间
- A.术后24小时
B.术后48小时
C.术后3日
D.术后1周
E.术后2周
- 51.滥用药物是引起再生障碍性贫血的重要原因,以下药物中对再生障碍性贫血的发生没有明显影响的是
- A.氯霉素
B.阿司匹林
C.保泰松
D.碳胺
E.青霉素
- 52.支气管哮喘发作伴窦性心动过速,哪项治疗是错误的
- A.鼻导管吸氧
B.普萘洛尔口服
C.沙丁胺醇吸入
D.异丙托溴铵吸入
E.地塞米松静脉注射
- 53.预防尿道狭窄最好的方法是
- A.多喝水
B.理疗
C.定期尿道扩张
D.多用肾上腺皮质激素
E.长期应用抗菌药
- 54.对于不全流产孕妇,一经确诊,护士需
- A.嘱孕妇休息
B.及时做好清除宫内残留组织的准备
C.减少刺激
D.加强心理护理,增强保胎信心
E.继续监测胚胎发育情况
- 55.二尖瓣狭窄病人反复出现劳累性气促、咳嗽,随病程发展,以上症状略有减轻,较可能是
- A.内科治疗已控制病情发展
B.二尖瓣狭窄程度减轻
C.病变进入右心衰竭期
D.合并主动脉瓣病变
E.合并二尖瓣关闭不全
- 56.早产儿补充铁剂的适宜时间是
- A.14天
B.2月龄
C.4月龄
D.6月龄
E.8月龄
- 57.颅内高压患儿发生脑疝时,首选的脱水药是
- A.静脉注射20%甘露醇
B.静脉注射50%葡萄糖
C.肌内注射呋塞米
D.口服50%甘油
E.肌内注射泼尼松
- 58.消化性溃疡患者最常见的并发症是
- A.上消化道大出血
B.急性穿孔
C.肝性脑病
D.幽门梗阻

- E.癌变
- 59.根治原发性肝癌最佳的措施是
- 化学抗肿瘤药物治疗
 - 手术治疗
 - 中医治疗
 - 生物和免疫治疗
 - 放射治疗
- 60.关于上消化道出血的描述,不恰当的是
- 一次出血量在 400 mL 以下时,一般不引起全身症状
 - 出血 50~70 mL 可出现黑粪
 - 250 mL 可出现呕血
 - 出血量为 400 mL 即出现全身症状
 - 出血量超过 400~500 mL,可出现头晕、心悸、乏力等症
- 61.服毒后最佳的洗胃时间是
- 12 小时
 - 24 小时
 - 8 小时
 - 6 小时
 - 16 小时
- 62.患者,女性,62 岁。以“大腿内侧有胀痛感,站立时有半球形肿块突出,可回纳”,医生诊断为股疝,首选的治疗措施为
- 手术治疗
 - 不做任何处理
 - 回纳后使用绷带压紧固定
 - 非手术治疗
 - 观察有无呕吐、发热、腹胀
- 63.患者,女性,62 岁。肺源性心脏病病史 8 年。近几天因咳嗽、脓痰增多而就诊。查体:肺部干啰音,双下肢水肿,肝颈静脉回流征阳性(-),最佳的护理措施是
- 强心利尿
 - 控制心律失常
 - 血管扩张药
 - 控制感染
 - 止咳祛痰
- 64.孕妇,25 岁。妊娠 39+2 周,产检:胎头在腹部右侧,胎臀在腹部左侧,胎心在脐周听到。护士判断该孕妇属于
- 面先露
 - 肩先露
 - 骶先露
 - 枕先露
 - 臀先露
- 65.患者,男性,41 岁。石油化工工人,长期与苯接触,近 1 年来全身乏力,血红蛋白 6 g/dl,血小板 50 000/dl,网织红细胞低于正常,肝脾不大,骨髓增生低下。采取最佳的治疗方法是
- 铁剂
 - 雄激素
 - 补充叶酸
 - 肾上腺皮质激素
 - 雌激素
- 66.患者,男性,58 岁。急诊以急性广泛前壁心肌梗死入院。经急诊介入治疗后,疼痛明显缓解,收入 CCU 病房继续监测,次日晨发现患者血压 78/52 mmHg,并伴面色苍白、皮肤湿冷、大汗、烦躁不安等症状,脉搏 132 次/分,尿量明显减少,目前考虑该患者发生了
- 低血压
 - 心力衰竭
 - 心律失常
 - 心源性休克
 - 心脏破裂
- 67.患者,女性,27 岁。身体健康,已育,有一个 10 月龄的孩子,最适合该妇女的避孕方法是
- 口服避孕药
 - 安全期避孕
 - 使用阴茎套
 - 放置节育器
 - 阴道隔膜
- 68.患者,女性,48 岁。已婚,妇科普查:

宫颈中度糜烂,子宫正常大小,两侧附件软。宫颈刮片细胞学检查为巴氏Ⅲ级。随后做阴道镜下宫颈定位活检,病理报告为“慢性宫颈炎”。再次重复宫颈刮片细胞学检查仍为巴氏Ⅲ级。其进一步的处理应选择

- A. 定期随访宫颈刮片细胞学检查
- B. 宫颈激光治疗
- C. 宫颈锥切术
- D. 子宫全切术
- E. 分段诊断性刮宫术

69.患者,男性,60岁。近1个月劳累时感心前区疼痛,诊为冠心病、心绞痛。目前患者一般体力活动明显受限,步行一段路或登楼梯一层即可发生心绞痛。根据加拿大心血管学会分级,该患者心绞痛严重度分级属于

- A. I级
- B. II级
- C. III级
- D. IV级
- E. V级

70.患者,男性,6个月。阵发性痉咳3周,伴有鸡鸣样回声,日轻夜重,痰液黏稠,咳剧时伴有呕吐,白细胞升高,护理该患儿不正确的措施是

- A. 为减少痉咳禁止拍背
- B. 可雾化吸入
- C. 夜间剧咳时可用镇咳剂
- D. 密切观察病情
- E. 给予易消化的饮食

71.患者,男性,32岁。被车撞伤左胸,造成第4~7肋骨骨折,左胸中量积液,行胸腔闭式引流,引流出血性液体540 mL,其血胸属于

- A. 少量血胸
- B. 中等量血胸
- C. 大量血胸
- D. 感染性血胸
- E. 纤维性血胸

72.患者,女,13岁。右胫前有一鸡蛋大小隆起,质硬,边界欠清,局部剧痛,夜间痛尤甚,皮温高,X线片有骨膜反应。考虑患者最可能出现

- A. 骨巨细胞瘤
- B. 软骨肉瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 尤文肉瘤
- E. 骨肉瘤

73.患者,男性,35岁。发热10天,心悸2天,心电图示:室性心动过速,心室率170次/分。静脉推注利多卡因无效,测血压70/42 mmHg,应准备立即给予

- A. 非同步电复律
- B. 同步电复律
- C. 继续静脉注射利多卡因
- D. 静脉注射胺碘酮
- E. 静脉注射普鲁卡因胺

74.患者,女性,35岁。因口服敌敌畏而急诊入院,经急救治疗后症状缓解,突然病情反复,再度陷入昏迷,此时,最大的原因可能是

- A. 阿托品的用量不足
- B. 洗胃不彻底
- C. 解磷定用量过大
- D. 颅内感染
- E. 用药不当

75.患者,女性,32岁。停经6周。现厌食,恶心,呕吐频繁,饮水也吐,尿量少,无发热,精神萎靡,皮肤干燥。妇科检查:宫体如孕6周大小。宫体软,附件(-)。实验室检查:妊娠试验(+),尿酮体(+++),最可能的情况是

- A. 早期妊娠合并传染性肝炎
- B. 妊娠剧吐
- C. 葡萄胎
- D. 妊娠合并胃肠道感染
- E. 妊娠合并肾炎

(76~78题共用题干)

患者,女性,25岁。3小时前因车祸致左胸和腹部撞伤,主诉头晕、心慌。体检:面色苍白,四肢厥冷,左上腹可见皮肤瘀斑。左上腹及中下腹部均有压痛,轻反跳痛,无肌紧张,血压6.0/0 kPa(50/0 mmHg),心率140次/分。

76.此时应立即采取的紧急治疗措施是

- A.急送手术室开腹探查
- B.迅速补液
- C.立即应用糖皮质激素
- D.立即应用升压药
- E.立即输入新鲜血

77.估计此病人出血量大致为总量的

- A.10%
- B.18%
- C.25%
- D.35%
- E.40%以上

78.为此病人补液应首选

- A.5%葡萄糖
- B.10%葡萄糖盐溶液
- C.3%氯化钠
- D.平衡盐溶液
- E.11.2%乳酸钠

(79~80题共用题干)

患者,女性,37岁。已婚。2年来感下腹隐痛不适。12小时前突起转移性右下腹痛。伴恶心、呕吐、发热。查体:右下腹压痛明显,有反跳痛、肌紧张。实验室检查:WBC $17 \times 10^9/L$,中性粒细胞88%;尿常规无异常。

79.最可能的诊断是

- A.急性盆腔炎
- B.急性附件炎
- C.泌尿系统感染
- D.胃十二指肠穿孔并发腹膜炎
- E.急性阑尾炎并发腹膜炎

80.为该患者行急诊手术。术后4天,患者诉下腹坠胀不适,便次增多,里急后重,排尿困难。应考虑

- A.泌尿系统感染

- B.盆腔脓肿
- C.肠袢间脓肿
- D.盆腔炎
- E.直肠癌

(81~83题共用题干)

患者,女性,50岁。患急性化脓性胆管炎,面色苍白,肢体湿冷,脉搏114次/分,血压11/9.33 kPa(86/70 mmHg),经大量快速输液后血压和脉搏无改善,测中心静脉压2.06 kPa(21 cmH₂O)。pH 7.30。

81.病人存在的情况是

- A.血容量仍不足
- B.血容量相对过多
- C.心功能不全
- D.容量血管过度收缩
- E.容量血管扩张

82.应采取的有效措施是

- A.继续快速补液
- B.用血管收缩剂
- C.给强心药
- D.纠正酸中毒
- E.加大抗生素用量

83.首先选用的药物是

- A.地塞米松
- B.毛花苷C
- C.间羟胺
- D.肝素
- E.碳酸氢钠

(84~86题共用题干)

患者,男性,48岁。有胃病病史10余年,近1年症状加剧,食欲不振来就诊。胃镜检查见胃角溃疡,幽门螺杆菌(+).

84.在询问病史时最有诊断价值的是

- A.上腹部痛阵发性加剧
- B.饥饿痛为主,进食后缓解
- C.疼痛往往于餐后0.5~1小时出现
- D.上腹部痛无规律性
- E.午夜痛为主

85.胃良性溃疡与恶性溃疡主要鉴别方

法是

- A.根据临床表现
- B.根据全身情况
- C.根据大便隐血持续阳性
- D.根据胃镜与活组织检查
- E.根据疼痛程度

86.本病的健康教育不包括

A.进行相关知识的宣传教育,避免病情加重的诱发因素

B.严格在医生的指导下应用非甾体抗炎药

C.指导患者建立合理的饮食结构和习惯

D.坚持服用抗结核药

E.定期复查

(87~88 题共用题干)

患者,女性,30岁。停经2个月,阴道出血并有水泡状物排出,诊断为葡萄胎。

87.病史中最具诊断价值的是

- A.停经史
- B.阴道水泡状物排出
- C.尿妊娠试验阳性
- D.有无流产史
- E.阴道出血时间

88.该患者的处理原则是

A.住院观察

B.立即清宫

C.止血

D.手术治疗

E.化疗

(89~90 题共用题干)

患者,男性,35岁。不慎跌倒,左肩部着地,感局部疼痛,不能活动,即送骨科急诊。检查发现:左肩畸形呈方肩,左手不能搭于对侧肩部。

89.考虑该患者最可能的情况是

A.肩关节脱位

B.肱骨颈骨折

C.肩锁关节脱位

D.锁骨骨折

E.肩关节韧带损伤

90.如经检查诊断为不伴有骨折的肩关节前脱位,处理措施是

A.三角巾固定3周

B.贴胸石膏固定4周

C.手法复位,三角巾固定3周

D.可在局麻下施行手法复位,三角巾固定2周

E.可在臂丛麻醉下施行手法复位,贴胸石膏固定3周

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(91~93 题共用备选答案)

- A.皮肤黏膜发绀
- B.皮肤黏膜樱桃红色
- C.皮肤黏膜苍白
- D.皮下出血点
- E.皮肤干燥

91.亚硝酸盐中毒最具有特征性的皮肤表现是

92.一氧化碳中毒最具有特征性的皮肤表现是

93.重症中暑伴循环衰竭时最具有特征性的皮肤表现是

(94~95 题共用备选答案)

- A.食管癌
- B.贲门失迟缓症
- C.食管腐蚀性灼伤
- D.食管憩室
- E.食管平滑肌瘤

94.吞咽不畅时轻时重,钡餐示光滑的鸟嘴状狭窄,诊断为

95.有食管灼伤史,钡餐示不规则细线状狭窄,诊断为

(96~97 题共用备选答案)

- A.中枢性高热
- B.尿崩症
- C.胃出血
- D.癫痫发作
- E.顽固性呃逆

96.由于下丘脑、脑干及上颈髓病变或损害引起

97.主要发生于鞍上手术之后

(98~100 题共用备选答案)

A.动脉导管未闭

B.室间隔缺损

C.房间隔缺损

D.主动脉瓣狭窄

E.二尖瓣狭窄

98.胸骨左缘第2~4肋间闻及Ⅲ~Ⅳ级全收缩期杂音,肺动脉瓣第二心音亢进

99.胸骨左缘第2肋间闻及粗糙的连续性机器样杂音,并向颈、背部传导

100.胸骨左缘第2~3肋间闻及Ⅱ~Ⅲ级吹风样收缩期杂音,肺动脉瓣第二心音亢进、分裂



专业实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 护士告知患者带铜宫内节育器一般无症状时可放置的时间是
- 5 年
 - 8 年
 - 12 年
 - 15 年
 - 20 年
2. 滋养细胞肿瘤患者出院指导时, 护士告知其最佳避孕措施为
- 运用绝育术
 - 使用安全套
 - 放置带孕酮的宫内节育器
 - 安全期避孕
 - 口服药物避孕
3. 手术中, 器械护士的手套污染后应
- 用生理盐水冲洗
 - 更换无菌手套
 - 加戴一只无菌手套
 - 用 0.5% 的聚维酮碘消毒
 - 重新消毒手后再戴无菌手套
4. 排卵前宫颈黏液会
- 分泌量减少
 - 氯化钠含量低
 - 延展性差, 拉丝易断裂
 - 呈稀薄、透明似蛋清状
 - 黏液涂片检查可见卵圆体
5. 临床最可靠的临产先兆是
- 见红
 - 破水
 - 排便感
 - 不规则宫缩
 - 胎儿下降感
6. 胎盘剥离的征象除外
- 外露的脐带不再回缩
 - 阴道出血
 - 子宫底下降
 - 子宫体变硬呈球形
 - 脐带自动下降
7. 全麻术后病人完全清醒的指征是
- 能准确答问
 - 呼吸平稳
 - 手指活动
 - 对光反射恢复
 - 呻吟
8. 正确判断滴虫阴道炎治愈的标准是
- 治疗后, 每次月经期前复查, 连续 2 次均为阴性
 - 治疗后, 每次月经期后复查, 连续 2 次均为阴性
 - 治疗后, 每次月经期前复查, 连续 3 次均为阴性
 - 治疗后, 每次月经期后复查, 连续 3 次均为阴性
 - 治疗 1 个月后, 连续 2 次复查均为阴性
9. II 度子宫脱垂患者最主要的临床症状是
- 排尿困难
 - 总有排便感
 - 阴道有肿物脱出
 - 阴道分泌物增多
 - 阴道口异物增生
10. 若胸腔闭式引流导管自胸部伤口脱出首先应
- 捏紧导管
 - 更换引流导管
 - 将引流导管重新放入伤口
 - 立即缝合引流口

- E. 双手捏紧放置引流导管处皮肤
11. 腹部手术 5 天后, 病人体温升高至 39 °C, 伤口疼痛, 首先要考虑
- A. 泌尿系感染
 - B. 切口裂开
 - C. 盆腔脓肿
 - D. 切口感染
 - E. 粘连性肠梗阻
12. 护士指导单纯性肥胖症患儿的饮食结构应
- A. 以糖类为主
 - B. 以蛋白质为主
 - C. 以粗粮为主
 - D. 以纤维素为主
 - E. 以维生素和矿物质为主
13. 对肺炎球菌肺炎病人的护理措施中哪一项是不妥当的
- A. 气急、发绀可给予鼻导管吸氧
 - B. 指导病人按医嘱服药, 定期回访
 - C. 进行保健指导, 以防今后再次发病
 - D. 高热者首选使用解热药
 - E. 加强营养, 增强抵抗力
14. 以下腹泻患儿的处理措施不正确的是
- A. 详细记录出入量
 - B. 早期使用止泻药
 - C. 频吐者暂禁食并静脉补液
 - D. 注意观察有无脱水症状
 - E. 注意肛周皮肤护理
15. 急性肾炎伴肾衰竭的护理措施最重要的是
- A. 量出为入, 减少钠和蛋白质的摄入
 - B. 保持室内空气新鲜
 - C. 保持心情舒畅
 - D. 预防感染
 - E. 定期复查肾功能
16. 直流电复律装置不应该包括下列哪项
- A. 电源

- B. 心电示波
 - C. 脉冲发生器
 - D. 电极
 - E. 同步触发装置
17. 护理新生儿寒冷损伤综合征患儿最关键的是
- A. 合理喂养
 - B. 监测生命体征
 - C. 预防感染
 - D. 观察有无脱水症状
 - E. 逐步复温
18. 原发性肝癌的预防, 最重要的措施是
- A. 保持心情舒畅
 - B. 不吃腌制食品
 - C. 防治病毒性肝炎、肝硬化
 - D. 戒烟、忌酒
 - E. 控制饮食, 加强运动
19. 中毒性肺炎休克患者最适宜体位是
- A. 俯卧位
 - B. 半卧位
 - C. 侧卧位
 - D. 膝胸卧位
 - E. 去枕平卧位或头略高、足高的特殊位
20. 对于婴幼儿患者, 护士采取最佳的心理沟通方式是
- A. 转移注意力
 - B. 多做游戏
 - C. 搂抱与抚摸
 - D. 适时鼓励
 - E. 榜样教学
21. 枕先露分娩机制的正常顺序是
- A. 衔接、下降、内旋转、俯屈、仰伸、外旋转、复位
 - B. 衔接、俯屈、下降、仰伸、复位、内旋转、外旋转
 - C. 衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转
 - D. 下降、衔接、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转

E.下降、衔接、内旋转、俯屈、仰伸、复位、外旋转

22.关于 T 形管引流的护理说法正确的是

- A.每周更换无菌引流袋 1~2 次
- B.避免扭曲、折叠
- C.胆总管下段阻塞时引流量增多
- D.术后 1 周可拔管
- E.T 形管造影显示通畅即可拔管

23.需要术前做阴道冲洗并在宫颈及穹隆部涂甲紫的手术是

- A.输卵管吻合术
- B.经阴道盆腔脓肿引流
- C.全子宫切除术
- D.子宫部分切除术
- E.子宫肌瘤剔除术

24.闭合性骨折石膏固定后,关节功能锻炼无法进行,易造成的并发症是

- A.急性骨萎缩
- B.损伤性骨化
- C.关节僵硬
- D.缺血性骨坏死
- E.缺血性肌挛缩

25.骨科牵引的主要目的是

- A.减少血管损伤
- B.减轻疼痛
- C.防止肌肉痉挛
- D.整复和维持复位
- E.促进损伤神经恢复

26.苯丙酮尿症患儿护理的关键是

- A.防止惊厥发作
- B.预防意外发生
- C.预防感染
- D.给予低苯丙氨酸饮食
- E.加强肢体训练

27.高浓度吸氧措施不可用于肺性脑病病人的主要原因是

- A.肺通气过量
- B.可引起氧中毒

C.解除了主动脉体和颈动脉体的兴奋性

- D.可引起心肌收缩力减弱,心率减慢
- E.诱发代谢性酸中毒

28.结核性脑膜炎患儿,护士评估其优先护理诊断是

- A.有窒息的危险
- B.失用综合征的危险
- C.潜在并发症颅内压增高
- D.有皮肤完整性受损的危险
- E.有感染的危险

29.一位十二指肠球部溃疡的患者,其疼痛的规律是

- A.疼痛→进食→疼痛
- B.进食→疼痛→缓解
- C.无一定规律
- D.疼痛→进食→缓解
- E.以上都不对

30.麻疹恢复期最有意义的临床表现是

- A.体温正常
- B.结合膜充血,流泪
- C.手心、脚心有斑丘疹
- D.麻疹黏膜斑
- E.皮肤呈麦麸样脱屑,棕褐色色素沉着

31.当病人出现下列哪种情况时,可判断其心功能为Ⅲ级

- A.体力活动不受限,日常活动不引起乏力、心悸、呼吸困难或心绞痛等症状
- B.一般体力活动稍受限制,休息时充自觉症状

C.不能从事任何体力活动,休息时宜有症状,体力活动后加重

- D.应绝对卧床休息
- E.体力活动明显受限,休息时无症状,轻微的活动即可引起乏力、心悸、呼吸困难或心绞痛等症状

32.最易发生死胎、流产、先天畸形的胎龄是

- A.2~12 周

- B.16~20周
C.22~26周
D.28~32周
E.32~36周
- 33.急性胰腺炎最基本的治疗方法是
A.胰岛素
B.使用抗生素
C.生长激素
D.禁食及胃肠减压
E.使用糖皮质激素
- 34.引起上消化道大出血且不易控制的最常见病因是
A.十二指肠球后溃疡出血
B.急性胃炎出血
C.食管胃底静脉曲张破裂出血
D.肝癌出血
E.胃癌出血
- 35.西咪替丁和雷尼替丁两种药物同属于
A.碱性抑酸药
B.胃泌素受体拮抗药
C.组胺 H₁ 受体拮抗药
D.组胺 H₂ 受体拮抗药
E.质子泵抑制药
- 36.对哮喘持续状态病人进行护理时,下列应除外的是
A.守护在床边,加强心理护理
B.应定时变换病人体位
C.给予低流量鼻导管吸氧
D.保持呼吸道通畅
E.痰多且黏稠者可做药物雾化吸入
- 37.手术室内已铺置未用的无菌台保留时限为
A.1小时
B.4小时
C.6小时
D.10小时
E.12小时
- 38.下列肠梗阻类型中最易引起绞窄的是
A.胆石性肠梗阻
B.寄生虫性肠梗阻
C.肠扭转
D.痉挛性肠梗阻
E.肠套叠
- 39.肝门静脉高压症最常见也是最凶险的并发症是
A.肝性脑病
B.脾功能亢进
C.肝肾综合征
D.食管胃底静脉曲张破裂
E.胃肠道出血
- 40.阑尾切除手术采取的体位是
A.去枕平卧式
B.半坐卧式
C.健侧卧式
D.头高脚底式
E.膀胱截石卧式
- 41.小儿初次感染结核杆菌至产生变态反应的时间是
A.24小时以内
B.3天以内
C.2周
D.4~8周
E.3个月
- 42.血液病患儿不能使用的药物是
A.青霉素类
B.地塞米松
C.阿司匹林
D.抗病毒口服液
E.丙种球蛋白
- 43.关于美曲磷酯(敌百虫)中毒患者的急救措施不妥的是
A.对受污染的皮肤和头发用大量清水擦洗
B.口服中毒者用清水反复洗胃
C.喷洒农药时中毒患者应马上脱去污染衣物

- D.眼部污染者用 2%碳酸氢钠连续冲洗
E.早期足量反复给予阿托品解毒
- 44.关于 21-三体综合症的实验室检查,下列哪项是错误的
- A.粒细胞分叶过少并呈鼓槌状
B.红细胞过氧化物歧化酶活性增高
C.中性粒细胞内碱性磷酸酶活性较高
D.血清胆固醇增高
E.染色体检查大部分为典型 21-三体型
- 45.传染病的下列特征中最主要的是
- A.有免疫性
B.有季节性
C.有病原体
D.有传染性
E.有地方性
- 46.新生儿最早出现的先天性甲状腺功能减低症的表现是
- A.腹胀
B.嗜睡
C.喂养困难
D.生长发育迟缓
E.生理性黄疸时间延长
- 47.何项属于漏斗骨盆(髂前上棘间径、髂嵴间径、骶耻外径、坐骨结节间径)
- A.25 cm、28 cm、19 cm、9 cm
B.25 cm、27 cm、19 cm、7.5 cm
C.24 cm、26 cm、18.5 cm、8.5 cm
D.25 cm、28 cm、17 cm、9 cm
E.25 cm、28 cm、18 cm、8.5 cm
- 48.反流性食管炎反流物中损害食管黏膜的主要成分是
- A.胆汁
B.胰液
C.结合胆盐
D.胰蛋白酶
E.胃酸与胃蛋白酶
- 49.护理频繁呕吐伴晨起加重的病人,突然意识不清,脉搏呼吸减慢,双侧瞳孔不等大,应考虑的诊断是
- A.分离(转换)性障碍
B.脑病形成
C.高血压危象
D.脑血栓形成
E.蛛网膜下隙出血
- 50.肾结核最主要症状为
- A.全程血尿
B.慢性进行性膀胱刺激症状
C.脓尿
D.全身结核中毒症状
E.肾绞痛
- 51.PICC 的适应证不包括
- A.早产儿
B.长期静脉输液的患儿
C.胃肠外营养
D.刺激外周静脉的药物
E.血小板减少,有凝血障碍
- 52.腰椎间盘突出最主要的体征是
- A.棘突压痛
B.棘突间压痛
C.棘突旁压痛
D.直腿抬高试验阳性
E.直腿抬高试验和加强试验阳性
- 53.尿毒症病人皮肤瘙痒的护理措施应除外
- A.保持皮肤清洁
B.勤用温水洗皮肤
C.常用肥皂、乙醇擦身
D.勤换衣裤、床单
E.被褥应平整、柔软
- 54.体重 12 kg, 身高 90 cm, 胸围 49 cm, 头围 47 cm。该小儿的年龄是
- A.8 个月
B.10 个月
C.1 岁
D.2 岁
E.2 岁半
- 55.初产妇, 25 岁。妊娠 36+2 周, 因胎膜早破 1 小时收入院。现无宫缩, 枕先露,

头浮,体温正常。最佳的处理方案是

- A. 遵医嘱静滴缩宫素
- B. 卧床休息
- C. 立即静脉滴注抗生素
- D. 每日测血压4次
- E. 破膜时间>12小时未临产可应用抗生素

56. 恶性肿瘤患者,女,52岁。行放射治疗后出现腹痛、腹泻、黏液便、里急后重感,护士采取的护理措施不正确的是

- A. 应暂停治疗
- B. 嘱患者多食蔬菜、水果
- C. 遵医嘱给予次碳酸铋口服
- D. 少量多餐
- E. 遵医嘱给予颠茄合剂

57. 患者,女性,21岁。车祸伤4小时入院,检查发现骨盆骨折,右股骨干开放性骨折。查体:烦躁、气促,血压70/50 mmHg,首先采取的治疗措施是

- A. 抗休克
- B. 骨折复位、内固定
- C. 石膏外固定
- D. 骨盆牵引
- E. 应用升压药

58. 患者,男性,30岁。出租车司机,因黑色稀便3天入院,3天来,每日排黑色稀便2次,每次约200g,病前有多数上腹部隐痛史,常有夜间痛、饥饿痛,进食可缓解。查体:贫血貌,皮肤无黄染,肝脾肋下未触及最可能的诊断是

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. 急性胃炎
- D. 慢性糜烂性胃炎
- E. 胃癌

59. 患者,女性,55岁。因外阴瘙痒就诊,组织病理学诊断为外阴白色病变。下列治疗措施中不正确的是

- A. 药物治疗为主

B. 病变部位出现重度非典型增生者应手术治疗

- C. 病变局部出现溃疡结节时手术治疗
- D. 为防恶变,及早手术治疗
- E. 全身加局部药物治疗

60. 患者,女性,54岁。因车祸致右腰部外伤,1小时后入院。神志清,血压16.65/10.66 kPa (125/80 mmHg),CT示左肾粉碎伤。拟予手术切除左肾,此时应着重注意观察

- A. 血尿变化
- B. 尿量变化
- C. 血压变化
- D. 对侧肾功能
- E. 神志变化

61. 患者,女性,42岁。因在高热环境下持续工作而产生头痛、头晕、全身乏力、多汗等症状,不久体温迅速升高到41℃,并出现颜面潮红、昏迷、休克。下列哪项降温措施最宜采用

- A. 乙醇擦拭
- B. 应用赖氨酸阿司匹林(来比林)静推
- C. 冬眠合剂
- D. 物理降温+药物降温
- E. 冰盐水灌肠

62. 患者,女性,36岁。喷洒农药2小时发生头晕、恶心、腹痛、呼吸有蒜味,神志清楚。病人喷洒时反穿短袖衫、短裤。请问在清除患者污染皮肤时忌用温开水的原因是

- A. 防止局部肌肉痉挛
- B. 无法清除毒物
- C. 防止皮肤血管扩张,促进毒物吸收
- D. 防止毒物对热发生反应
- E. 抑制呼吸中枢

63. 患者,男性,34岁。因风湿性心脏病行二尖瓣瓣膜置换术。术后服用华法林,护士指导其用药过程中最重要的是

- A. 定期检查凝血功能
- B. 卧床休息、适当活动
- C. 每日摄入足量蛋白质

- D. 预防感冒
E. 按时服药

64. 患者, 女性, 35 岁。停经 3 个月, 突然剧烈下腹痛 1 小时, 休克入院, 急诊剖腹探查, 见子宫左角破口有水泡状物, 出血活跃。镜下见子宫肌壁深层及浆膜下有增生活跃的滋养层细胞, 可见绒毛结构。该患者最可能发生了

- A. 宫角妊娠
B. 葡萄胎
C. 子宫肌瘤红色样变
D. 绒毛膜癌
E. 卵巢囊肿破裂

65. 初产妇, 24 岁。足月临产 10 小时, 胎位正常, 胎心 142 次/分, 宫口开大 4 cm, 2 小时后再次肛检宫口扩张无进展。护士判断该产妇发生了

- A. 潜伏期延长
B. 活跃期延缓
C. 活跃期停滞
D. 第一产程延长
E. 第二产程延长

66. 患者, 女性, 58 岁。急性右上腹阵发性绞痛, 伴寒战高热、黄疸, 急诊行胆囊切除、胆总管探查、T 管引流术, 术后观察病人排便情况的最主要目的是

- A. 判断病人胆总管通畅情况
B. 判断病人肠道功能恢复情况
C. 及时发现病人有无胃肠道出血
D. 判断病人术后饮食恢复是否合适
E. 判断病人对脂肪消化和吸收的能力

67. 患者, 女性, 45 岁。阵发性腹痛逐渐加重伴恶心、呕吐 3 天。查体: 轻度腹胀, 时显肠型, 全腹轻压痛。左侧大隐静脉入股静脉处突起一直径 5 cm 大的半球形包块, 压痛显著, 不活动。表面尚光滑, X 线片: 腹部可见多个液气平面, 最大可能是

- A. 寒性脓肿继发感染
B. 急性淋巴结对炎

- C. 嵌顿性直疝
D. 嵌顿性股疝
E. 淋巴肉瘤并内出血

68. 患者, 女性, 23 岁。初产妇, 身高 160 cm, 孕 40 周, 规律宫缩 12 小时。阴道检查: 宫口开大 5 cm, 先露 0, 大凶在 3 点, 小凶在 9 点, 矢状缝向后靠近骶岬, 盆腔后部空虚。诊断为

- A. 左枕横位, 后不均倾
B. 右枕横位, 后不均倾
C. 右枕横位, 前不均倾
D. 左枕横位, 前不均倾
E. 右枕横位, 均倾入盆

69. 患者, 女性, 28 岁。已婚, 经常饮酒、吸烟, 近半年来频发不明原因低热, 近端指间关节肿痛, 经医院检查疑是 SLE, 该患者患此病的原因是

- A. 与吸烟有关
B. 与饮食有关
C. 与女性激素有关
D. 与饮酒有关
E. 与婚姻有关

70. 患者, 女性, 26 岁。停红 55 天后出现少量阴道流血。妇科检查: 宫口未开, 阴道内有少量红色血液。超声检查提示子宫符合 8 周孕大小, 可见胎心搏动。患者曾于 2 年前自然流产 1 次。正常的诊断是

- A. 先兆流产
B. 难免流产
C. 不全流产
D. 稽留流产
E. 习惯性流产

(71~72 题共用题干)

孕妇, 37 岁。孕 2 产 1, 妊娠 32+3 周, 今晨突然全身抽搐 1 次, 急诊入院。查体: 神志尚清, 血压 160/110 mmHg (21.3/14.6 kPa), 枕先露, 胎心 144 次/分, 水肿(++), 尿蛋白(+++).

71. 对于该患者, 以下处理方案首选
A. 急诊剖宫产

- B. 缩宫素静脉滴注引产
- C. 静脉滴注硫酸镁, 继续观察
- D. 控制抽搐后 6~12 小时可终止妊娠
- E. 期待疗法

72. 其抽搐的主要病理原因是

- A. 血钙降低
- B. 代谢性酸中毒
- C. 胎盘老化
- D. 颅内小动脉痉挛
- E. 高热

(73~75 题共用题干)

男性, 55 岁。头痛 6 个月, 多见于清晨, 癫痫发作 5 次, 经检查诊断为颅内占位性病变、颅内压增高, 行开颅手术。

73. 颅内压增高的典型表现为

- A. 头痛、恶心、抽搐
- B. 头痛、呕吐、运动障碍
- C. 头痛、抽搐、视盘水肿
- D. 头痛、呕吐、视盘水肿
- E. 头痛、抽搐、血压增高

74. 术前病人出现便秘时, 处理措施错误的是

- A. 鼓励病人多饮水
- B. 腹部热敷
- C. 使用液状石蜡
- D. 用肥皂水灌肠
- E. 鼓励病人多食蔬菜水果

75. 此病人开颅术后 24 小时内最危急的并发症是

- A. 出血
- B. 失用综合征
- C. 中枢性高热
- D. 癫痫
- E. 压疮

76. 若病人出现脑脊液鼻漏, 护理方法恰当的是

- A. 头低
- B. 用无菌干棉球阻塞鼻孔
- C. 经鼻腔吸痰

D. 避免用力咳嗽、打喷嚏

E. 生理盐水冲洗鼻腔

(77~79 题共用题干)

孕妇合并心脏病, 24 岁。妊娠 37+5 周, 心功能 II 级, 头位, 胎心率正常, 血压 16/10.7 kPa (120/80 mmHg), 已临产。

77. 对该患者最适宜的处理方法是

- A. 急诊剖宫产
- B. 静滴缩宫素, 加速产程
- C. 严密监测产程进展, 缩短第二产程, 给予阴道助产

D. 缩宫素静脉滴注加强宫缩, 缩短第一产程

E. 宫口开全后, 指导产妇积极用力屏气, 以尽快结束分娩, 减轻心脏负担

78. 第三产程中, 护士不正确的处理是

- A. 胎儿娩出后, 腹部置沙袋
- B. 宫缩欠佳时, 可遵医嘱注射缩宫素
- C. 宫缩欠佳时, 可注射麦角新碱
- D. 皮下注射吗啡 10 mg
- E. 胎盘娩出后, 应按摩子宫, 促进子宫收缩

79. 护士对于产褥期的处理措施不正确的是

- A. 鼓励母乳喂养
 - B. 产后 72 小时预防心力衰竭
 - C. 严密监测生命体征
 - D. 应用 3 天抗生素
 - E. 病情稳定, 产后 10 天出院
- (80~82 题共用题干)

患者, 女性, 25 岁。自诉尿频、尿痛 3 天, 近 2 天白带增多, 黄色脓样伴外阴痛就诊。检查: 外阴肿, 阴道黏膜充血, 以手指压尿道旁腺时脓性分泌物流出, 触痛明显。

80. 该患者最可能的情况是

- A. 细菌性阴道炎
- B. 念珠菌阴道炎
- C. 淋菌阴道炎
- D. 尖锐湿疣

E.前庭大腺脓肿

81.确诊首选

- A.分泌物悬滴法检查
- B.宫颈刮片细胞学检查
- C.宫颈分泌物涂片革兰染色
- D.尿培养
- E.血常规

82.若找到病原菌“革兰阴性双球菌”最佳的治疗方法是

- A.甲硝唑局部用药
- B.高锰酸钾溶液坐浴,2次/天
- C.庆大霉素 8 万 U 肌内注射,每 8 小时 1 次
- D.阿米卡星 0.2 g 肌内注射,每日 2 次
- E.青霉素 480 万 U 一次注射,两侧臀部

分别为 240 万 U

(83~87 题共用题干)

患者,男性,56 岁。有乙肝病史 20 年。3 天前上呼吸道感染发热后出现淡漠少言,言语不清且较缓慢,1 天前加重,并出现嗜睡、意识不清。入院查体:T 38.5℃,P 110 次/分,R 22 次/分,BP 100/60 mmHg,神志不清,呼吸急促,面色晦暗,巩膜无黄染,瞳孔反应迟钝,面部及颈部检查可见蜘蛛痣 3 枚,颈软,无颈静脉怒张,两肺未闻及啰音,心率 110 次/分,律齐,未闻及杂音,腹软隆起,移动性浊音阳性。

83.该患者目前的初步诊断可能是

- A.肝性脑病前驱期
- B.肝性脑病昏迷前期
- C.肝性脑病昏睡期

D.肝性脑病昏迷期

E.肝性脑病终末期

84.下列哪项治疗措施对该病人不妥

- A.积极控制感染
- B.避免使用含氮药物、镇静剂及麻醉剂
- C.使用降血氨药物
- D.盐水灌肠
- E.给予高蛋白流食鼻饲,辅以葡萄糖供给能量

85.对于该患者责任护士给予的护理措施中,不妥的是

- A.头偏向一侧,保持呼吸道通畅,必要时给予吸氧
- B.密切观察病情,尤其是意识状态
- C.严格记录 24 小时出入量
- D.快速静脉点滴精氨酸,并观察降血糖药的疗效及不良反应
- E.静脉补充葡萄糖供给能量

86.患者出现蜘蛛痣是由于

- A.雄激素水平过高
- B.雌激素水平过高
- C.生长激素水平过高
- D.肾上腺皮质激素水平过高
- E.血管升压素水平过高

87.如此时为患者做脑电图检查,最可能的发现是

- A.无异常
- B.波形正常,节律变快
- C.出现 S 波,4~7 次/移
- D.出现三相波
- E.出现高波幅的 5 波,少于 4 次/秒

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(88~89 题共用备选答案)

- A.生长缓慢,肿瘤包膜完整,与表皮不粘连
- B.生长缓慢、质软,位于皮下组织内,呈

圆形分叶状

- C.多见于大阴唇,肿瘤表面可有溃疡和坏死
- D.单个肿块,多发生于小阴唇

E.肿物有蒂或突出于皮肤表面、质硬、光滑

88.外阴纤维瘤表现为

89.外阴脂肪瘤表现为

(90~92 题共用备选答案)

A.24 小时

B.2~3 天

C.5 天

D.5~7 天

E.2 周

90.胸腔闭式引流拔管时间一般为术后

91.T 形管引流拔管时间一般为术后

92.骶部引流拔管时间一般为术后

(93~95 题共用备选答案)

A.高压氧疗

B.高浓度吸氧

C.鼻导管给氧

D.持续低流量吸氧

E.常压给氧

93.急性肺水肿病人适宜的给氧方式是

94.CO 中毒昏迷病人适宜的给氧方式是

95.慢性阻塞性肺部疾病病人适宜的给

氧方式是

(96~97 题共用备选答案)

A.宫颈糜烂

B.宫颈肥大

C.宫颈息肉

D.宫颈腺囊肿

E.宫颈水肿

96.宫颈外口处的宫颈阴道部外观呈颗粒状的红色区为

97.炎症长期刺激使宫颈管黏膜增生形成

(98~100 题共用备选答案)

A.浓缩红细胞

B.免疫球蛋白

C.凝血因子浓缩剂

D.凝血酶原复合物

E.血小板

98.血友病患儿止血治疗时首选输注

99.严重贫血的患儿可多次少量输注

100.血小板减少性紫癜出血严重时可输注



参考答案

基础知识

1. 答案: B

2. 答案: B

3. 答案: C

4. 答案: E

5. 答案: B

6. 答案: C

7. 答案: E

8. 答案: D

9. 答案: C

10. 答案: A

11. 答案: C

12. 答案: A

13. 答案: E

14. 答案: E

15. 答案: B

16. 答案: C

17. 答案: B

18. 答案: B

19. 答案: C

20. 答案: E

21. 答案: E

解析: 破伤风属于特异性感染。

22. 答案: D

解析: 在新生儿卵巢内约有 200 万个卵泡,但在女性一生中仅有 400~500 个卵泡发育成熟。

23. 答案: C

解析: 复苏后最容易出现脑水肿。

24. 答案: B

解析: 胸腔穿刺有气体说明有气胸,有血液说明有损伤引起的出血。

25. 答案: B

26. 答案: B

27. 答案: B

解析: 梗阻以后消化道分泌液体不能被吸收,积存在肠道。

28. 答案: B

解析: 凡是肝功能受损的疾病,其他 4 项检验项目均可升高,只有甲胎蛋白对肝癌具有较强的特异性。

29. 答案: C

解析: 部分卵巢恶性肿瘤如上皮性卵巢癌、无性细胞瘤、含睾丸细胞瘤中的 1/4 病人有家族史;约 20% 的卵巢癌病人有家族史,其中主要是上皮性卵巢癌。

30. 答案: D

解析: 浆液性囊腺瘤约占卵巢良性肿瘤的 25%。

31. 答案: D

32. 答案: B

解析: 动脉狭窄属心脏后负荷增高,当心脏后负荷增高时,常以心肌肥厚作为主要的代偿机制。

33. 答案: D

解析: 高血压可引起心脏后负荷增加,即外周血管阻力增加。

34. 答案: C

解析: 急性胃炎是急性胃黏膜的炎症,包括急性单纯性胃炎、糜烂性胃炎、腐蚀性胃炎,以急性单纯型胃炎最为多见。

35. 答案: D

解析: 病毒、细菌和支原体感染是慢性支气管炎发生及加重的重要因素之一。

36. 答案: C

37.答案:B

解析:上呼吸道感染的病原体 90%以上是病毒。

38.答案:E

解析:慢性胃体胃炎病人血清促胃液素水平常明显升高,可有抗壁细胞抗体和抗内因子抗体。

39.答案:D

解析:劳累、情绪激动、饱食、受寒、急性循环衰竭是心绞痛发生的诱因。

40.答案:B

解析:子痫前期轻度诊断标准:血压 > 140/90 mmHg (18.7/12 kPa), 尿蛋白 > 0.3 g/24 h 或随机尿蛋白(+);伴上腹不适、轻度水肿、头痛、视力模糊等。

41.答案:D

解析:主要考查先天性巨结肠的发病机制,备选答案是对发病机制的描述,根据我们已掌握的知识,先天性巨结肠可能是在胚胎发育过程中,受到病毒、感染、药物、遗传等因素的作用,使形成肠壁神经丛的神经节细胞发育停滞,致局部肠壁间神经丛和黏膜下神经丛缺乏神经节细胞。

42.答案:D

43.答案:A

44.答案:B

解析:黄体功能不足为排卵性功血,月经周期中有卵泡发育及排卵,但黄体期孕激素分泌不足或黄体过早衰退。因此,表现为基础体温呈双相型,但上升缓慢,高温相短。

45.答案:B

46.答案:A

47.答案:A

48.答案:A

49.答案:C

50.答案:E

51.答案:C

52.答案:D

53.答案:D

54.答案:E

55.答案:C

56.答案:C

57.答案:B

58.答案:A

59.答案:E

60.答案:C

61.答案:B

62.答案:D

63.答案:D

64.答案:B

65.答案:A

66.答案:C

67.答案:A

68.答案:C

69.答案:C

70.答案:B

71.答案:C

72.答案:B

73.答案:E

74.答案:C

75.答案:D

76.答案:B

77.答案:E

78.答案:C

79.答案:C

80.答案:A

81.答案:B

82.答案:A

解析:腹膜刺激征(压痛、肌紧张、反跳痛)是腹膜炎的标志性体征。

83.答案:C

84.答案:C

85.答案:B

86.答案:E

87.答案:B

88.答案:A

89.答案:C

90.答案:D

解析:游离移植:移植物从供体取下时,完全断绝与供体的各种联系,移植至受体后重新建立血液循环,如游离皮片移植。带蒂移植:是自体移植的一种方法,移植物从供体取下后,并没有完全脱离,尚有一部分相连,主要包括血管和神经,使移植物的存活率提高。等移植物在受体上完全建立血液循环时,再将蒂切断。如带蒂皮瓣、带蒂肌瓣、带蒂大网膜移植等。吻合移植:利用血管吻合技术,将移植物中的血管与受体的血管吻合,使移植器官即刻得到血液供应,如断肢再植、肾移植和肝移植等。输注移植:将具有活力的细胞输注到受体的血管、体腔或组织器官内的方法,如输血、骨髓移植、干细胞移植、胰岛移植等。

91.答案:C

92.答案:D

93.答案:B

94.答案:A

95.答案:E

96.答案:E

97.答案:C

98.答案:B

99.答案:D

100.答案:C

解析:子宫借助于4对韧带以及骨盆底肌肉和筋膜的支托作用来维持正常的位置。圆韧带具有维持子宫前倾位的作用;阔韧带使子宫在腔的正中位置;主韧带又称宫颈横韧带,是固定宫颈正常位置的重要组织;宫骶韧带间接保持子宫于前倾位置。

相关专业知识

1.答案:C

2.答案:E

解析:在医院中严重的是移位菌群失调,即正常菌群由原籍生境转移到外籍生境或本来无菌的部位定植或定居,如大肠中的大肠埃希菌、铜绿假单胞菌转移到呼吸道或泌尿道定居。其原因多为不适当地使用抗生素,即该部位的正常菌群被抗生素抑制或消灭,从而为外来菌或过路菌提供了生存的空间和定植的条件。

3.答案:D

4.答案:C

解析:快速压力蒸汽灭菌物品在干燥的情况下可保存7~14天。如果潮湿则认为被污染,应重新灭菌。

5.答案:E

6.答案:C

解析:设置隔离室最主要的目的是切断感染链中的传播途径,保护易感者。将感染源与传播的途径分开是防止感染性疾病传

播的重要措施。

7.答案:A

8.答案:A

解析:高度危险性物品是穿过皮肤或黏膜而进入无菌的组织或器官内部的器材,或与破损的组织、皮肤黏膜密切接触的器材和用品,如手术器械和用品、穿刺针、输血器材、输液器材、注射的药物和液体、透析器、血液和血液制品、导尿管、膀胱镜、腹腔镜、脏器移植物和活体组织检查钳等。

9.答案:A

10.答案:A

解析:管理与政策诊断的核心内容是组织评估和资源评估。

11.答案:C

12.答案:A

解析:对不耐热、不耐湿物品进行消毒时可选用环氧乙烷气体灭菌。

13.答案:E

14.答案:E

解析:终末质量评价是评价护理活动的最终效果,指每个病人最后的护理结果或成批病人的护理结果质量评价。

15.答案:C

16.答案:A

解析:为防止使用后的污染利器(针、刀、其他利器)刺伤,小心处理用过的尖锐物品(针及手术刀等),如使用后针头不覆帽且不复用,不用手去除针头,若要人为去除针头时,应使用其他技术和可用器械设备除去针头。用后的针头及尖锐物品应弃于耐刺硬壳防水容器内。

17.答案:C

18.答案:C

解析:连续使用的氧气湿化瓶、雾化器、早产儿暖箱应每日消毒,用后终末消毒,干燥保存。湿化液应用灭菌水。

19.答案:E

20.答案:C

解析:各种微生物(细菌)经常从不同环境落到人体,并能一定部位定居和不断生长、繁殖后代,送种现象通常称为“细菌定植”。

21.答案:E

22.答案:A

解析:科学管理理论的基本出发点是提高劳动生产效率,其主要内容是:①使工作方法、劳动工具、工作环境标准化;②确定合理的工作量;③挑选和培训工人,使其掌握标准工作方法;④实行差别工资制;⑤实行职能工长制。

23.答案:C

24.答案:A

解析:用过的医疗器材和物品,应先除污物、清洗,再消毒或灭菌;其中感染病人用过的医疗器械和物品,应先消毒、清洗,再消毒或灭菌。

25.答案:A

26.答案:D

解析:危害健康行为的类型:①日常危害健康行为;②致病性行为模式;③不良疾病行为;④违规行为。

27.答案:D

28.答案:C

解析:高水平消毒剂是过氧化氢;中水平消毒剂是聚维酮碘、乙醇;低水平消毒剂是苯扎溴铵、氯己定。

29.答案:D

30.答案:D

解析:近年来,真菌引起的院内感染呈现进一步增长的趋势,常见的真菌感染是白色念珠菌、热带念珠菌和曲霉菌。念珠菌感染多发生在长期应用广谱抗生素或免疫力低下病人身上,常导致深部感染。

31.答案:A

32.答案:C

解析:环节质量评价常用的评价指标:①护理技术操作合格率;②基础护理合格率;③特护、一级护理合格率;④各种护理表格书写合格率;⑤一人一针一管执行率;⑥常规器械消毒灭菌合格率。

33.答案:D

34.答案:D

解析:经粪-口途径传播的肝炎病毒为甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒。乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、丁型肝炎病毒均主要经血液传播(输血、使用血制品、静脉吸毒、通过诊疗器械等),亦可经日常生活中的密切接触传播。

35.答案:D

36.答案:A

解析:术前预防性应用抗生素的指征:①污染手术,如复杂外伤、战伤、开放性关节伤、严重烧伤、伴溃疡坏疽的截肢术、感染性病灶(如脑脓肿)等手术和各种咬伤等;连通口咽部的颈部手术;回肠远端及结肠手术;腹部空腔脏器破裂或穿通伤;高危胆道手术;经阴道子宫切除术。②发生感染将引

起严重后果者,如心脏瓣膜病或已置入人造心脏瓣膜者因病需行其他手术者、脑脊液鼻漏者以及器官移植术等。③各种人造物修补、置换或留置手术,如人工心脏瓣膜置换手术、人造关节置换术、人造血管移植术、脑室心房分流管放置术等。④手术范围大、时间长的清洁手术。

37.答案:D

解析:一级医院的医护比为1:1,二级和三级医院的医护比为1:2。

38.答案:B

解析:科学管理理论的创始人是泰勒,他首次提出了科学管理的概念,1911年出版《科学管理原理》一书,被公认为“科学管理之父”。

39.答案:B

解析:医用物品对人体的危险性是指物品污染后造成危害的程度,根据其危害程度将其分为3类。

40.答案:B

解析:主动发展阶段在3~12岁,此阶段的行为有明显的主动性,其主要表现为爱探究、易激惹、喜欢自我表现等。

41.答案:E

42.答案:D

解析:随着计算机技术的日益成熟和广泛应用,有关组织结构管理幅度与管理层级的理论也发生着革命性的变化,最突出的体现就是组织中的中层功能正逐渐由计算机来处理完成,使得管理幅度变宽和管理层级变少,组织也日益由高耸型走向扁平化。组织扁平化是未来管理向领导者、从事人力资源管理工作者提出的挑战。

43.答案:C

解析:从组织图可以了解纵向的各部门或各职位之间的指导、指挥、管辖等关系;也可以了解横向的各部门或各职位的分工和任务,人、财、物的流向;还可以了解组织的规模、集中与分散状况及管理的功能与

范围。

44.答案:D

45.答案:B

解析:“条条大路通罗马”是指达成目标有多种途径。面对不同的沟通对象,面对不同的情形,应该采取不同的沟通方式以达到事半功倍的效果。因此,其对应的是“使用恰当的沟通方式”的策略。

46.答案:D

解析:协调的基本要求包括及时协调与连续协调相结合、从根本上解决问题、调动当事人的积极性、公平合理和相互尊重。

47.答案:E

48.答案:C

49.答案:B

50.答案:A

解析:健康教育的研究领域非常广泛,主要分为两大类。按目标人群或场所分为学校健康教育、职业人群健康教育、医院健康教育、社区健康教育。按教育目的或内容分为防治疾病健康教育、营养健康教育、环境保护健康教育、生殖健康教育等。

51.答案:E

52.答案:C

53.答案:D

54.答案:B

55.答案:E

56.答案:D

57.答案:C

解析:紫外线灯照射强度监测应每半年一次。

58.答案:C

解析:可能接触患者的血液、体液、分泌物、排泄物、污染的器械后应立即洗手。脱去手套后也应及时洗手。在两个患者之间,当手可能传播微生物污染环境时;同一患者,接触身体的不同部位时应洗手。

59.答案:C

60.答案:C

解析:乙型肝炎主要传播途径为血液传播,血液中HBV含量很高,共用牙刷和剃刀可使微量污染血液进入人体造成感染。

61.答案:D

62.答案:B

解析:护理仪器设备的维护是针对组织内部具体工作问题,在较小范围内和较短时间内实施的计划,是战术性计划。

63.答案:A

解析:目标管理的基本精神是以自我管理为中心。目标的实施,由目标责任者自我进行,通过自身监督与衡量,不断修正自己的行为,以达到目标的实现。

64.答案:D

解析:沟通障碍中接受者的障碍包括:过度加工,导致信息的模糊或失真;知觉偏差,导致对信息理解的偏差(心理障碍,导致信息的阻隔或中断;思想观念上的差异,导致对信息的误解)。

65.答案:A

解析:有效沟通的策略包括:使用恰当的沟通方式;考虑接受者的观点和立场;充分利用反馈机制;以行动强化语言;避免一味说教。

66.答案:C

解析:谈话的技巧包括:做好谈话计划;善于激发下级的谈话愿望;善于启发下属讲真情实话;掌握发问技巧,善于抓住重要问题;善于运用倾听的技巧。

67.答案:A

解析:所谓作业,是指从劳动力、原材料等物质资源到最终产品和服务等转化过程,护理工作中常用的作业控制有:护理技术控制、护理质量控制、医疗护理所用材料及药品购买控制、库存控制等。

68.答案:E

解析:护理管理控制的关键点有:关键制度、高危护士、高危患者、高危设备和药品、高危科室、高危时间和高危环节。

69.答案:D

70.答案:E

71.答案:B

解析:健康促进的领域包括制定促进健康的公共政策、创造支持环境、发展个人技能、加强社区行动和调整卫生服务方向。

72.答案:E

73.答案:D

74.答案:E

75.答案:C

76.答案:A

77.答案:D

78.答案:B

79.答案:B

80.答案:D

81.答案:A

82.答案:A

83.答案:B

解析:当医务人员接触血液、体液、排泄物、分泌物及污染物品时,应戴清洁手套;进行手术等无菌操作,接触患者皮肤黏膜时应戴手套。

84.答案:B

85.答案:D

86.答案:E

87.答案:C

88.答案:B

89.答案:A

90.答案:A

91.答案:D

92.答案:A

93.答案:C

94.答案:E

95.答案:A

96.答案:C

97.答案:B

98.答案:C

99.答案:D

100.答案:E

解析:手术器械包、硬式容器应平放;盆、盘、碗类物品应斜放,包内容器开口朝向一致;玻璃瓶等底部无孔的器皿类物品应倒立或侧放;纸袋、纸塑包装应侧放;利于蒸汽进入和冷空气排出。

专业知识

1.答案:E

解析:扩容是治疗休克首要而基本的措施。

2.答案:C

3.答案:B

解析:浅Ⅱ度和深Ⅱ度烧伤都有水泡,但浅Ⅱ度烧伤的创面颜色鲜红,深Ⅱ度创面发白。

4.答案:E

解析:腹部肿块是右半结肠癌的表现。

5.答案:E

解析:D、B、C属于稳定性骨折,不需要牵引复位;跟骨压缩骨折一般石膏固定;骨盆骨折采用外固定架固定。

6.答案:D

7.答案:C

8.答案:E

解析:念珠菌在酸性环境适于其生长,因此阴道灌洗应用2%~4%碳酸氢钠灌洗或坐浴,消灭其生长环境。

9.答案:A

解析:第二产程初产妇超过2小时,经产妇超过1小时尚未分娩,为第二产程延长。

10.答案:D

解析:该期以成熟的认知能力,自我认同感的建立为显著特征,这一阶段环境影响较大,常引起心理、行为、精神方面的不稳定。

11.答案:A

解析:乙肝疫苗接种第1次为出生后24小时内,第2次为第1个月时,第3次为第6个月时。

12.答案:D

解析:正式临产诊断是有规律且逐渐增强的子宫收缩,同时伴有进行性子宫颈管消失、宫口扩张和胎先露部下降。

13.答案:B

解析:Apgar评分包括心率、呼吸、肌张力、喉反射、皮肤颜色。

14.答案:B

解析:重型与轻型腹泻的区别不仅参考腹泻次数及量,最主要的是有无水电和酸碱平衡紊乱。

15.答案:A

16.答案:E

17.答案:A

解析:解除疼痛用哌替啶50~100mg肌内注射或吗啡5~10mg皮下注射,或罂粟碱30~90mg肌内注射。

18.答案:D

解析:早产儿补充铁剂从2个月开始,足月儿从4个月开始,及时添加含铁丰富的辅食。

19.答案:D

解析:婴儿期心力衰竭的最常见心血管疾病,以先天性心脏病引起者最多见。

20.答案:B

解析:临床表现:潜伏期3~7天,60%~70%病人无症状。病理分为急性和慢性两种。急性淋病最早症状为尿痛、尿频、排尿困难。慢性淋病淋菌可长期潜伏在尿道旁腺、前庭大腺深处并反复发作。

21.答案:A

解析:肝区疼痛常于右上腹部,呈持续性胀痛或钝痛,肝痛原因与肿瘤增长迅速使

肝包膜被牵拉有关。

22.答案:A

解析:胰岛素个人剂量差异很大,需严格个体化。一般初始先用速效制剂,小量开始,逐渐增量。

23.答案:D

24.答案:D

25.答案:B

26.答案:B

27.答案:E

28.答案:A

29.答案:D

解析:婴儿期是小儿生长发育最快的时期。

30.答案:D

解析:缩宫素小剂量可加强子宫收缩,剂量过大可导致强直性子宫收缩,故需专人监护剂量与宫缩的关系。

31.答案:E

解析:阴道黏膜表面由复层鳞状上皮覆盖。

32.答案:E

33.答案:B

解析:大凶门由4块骨骼组成。

34.答案:E

解析:早产儿因肺表面活性物质缺乏,故易发生肺透明膜病。

35.答案:C

解析:维生素D的预防剂量是每日400~800U。

36.答案:A

解析:稳定型心绞痛指劳累型心绞痛在1~3个月发作的诱因、发作次数、程度、持续时间、缓解方式等大致相同。

37.答案:C

解析:周围血管征、脉压增宽应是动脉导管未闭的特征性体征。

38.答案:D

39.答案:D

40.答案:C

41.答案:E

42.答案:B

43.答案:C

44.答案:C

45.答案:A

46.答案:C

47.答案:E

48.答案:C

49.答案:A

50.答案:D

51.答案:E

52.答案:B

53.答案:A

54.答案:B

55.答案:C

56.答案:B

57.答案:A

解析:20%甘露醇是颅高压脑疝时首选的脱水药。

58.答案:A

解析:出血是消化性溃疡最常见的并发症。

59.答案:B

解析:手术治疗是目前根治本病的最好方法,适合手术者应及早手术切除。

60.答案:D

解析:一次出血量在400mL以下时,一般不引起全身症状,如出血量超过400~500mL,可出现头晕、心悸、乏力等症状。

61.答案:D

解析:洗胃应尽早进行,一般在服毒后6小时内洗胃有效。超过6小时,由于部分毒物仍可滞留在胃内,因此仍有洗胃的必要。

62.答案:A

63.答案:D

解析:肺源性心脏病的治疗原则:以治肺为本、治心为辅。

64.答案:B

解析:胎头在腹部右侧,胎臀在腹部左侧,胎心在脐周听到,该胎儿纵轴与母体纵轴垂直,为横产式,故先露为肩先露。

65.答案:B

解析:治疗慢性再生障碍性贫血首选药物为雄激素。

66.答案:D

67.答案:C

68.答案:E

69.答案:C

70.答案:A

71.答案:B

解析:500~1 000 mL的出血属于中量血胸。

72.答案:E

解析:根据病人发病年龄和临床表现,可以判断出病人患有骨肉瘤。

73.答案:B

解析:阵发性室性心动过速发作时治疗首选利多卡因静脉注射,其他药物有普鲁卡因胺、苯妥英钠、胺碘酮等。如上述药物无效,或病人已出现低血压、休克、心绞痛、充血性心力衰竭、脑血流灌注不足时,可用同步直流电复律。

74.答案:B

解析:急性中毒者有时经急救好转后,突然出现病情反复,病人可再度陷入昏迷,或出现肺水肿而死亡。反复原因可能与洗胃及皮肤去除毒物不彻底或过早停药有关。

75.答案:B

解析:妊娠剧吐、不能进食等可出现酮尿。又因病人妊娠试验阳性,因此可判断为妊娠剧吐。

76.答案:A

解析:病人可能发生脾破裂。

77.答案:E

解析:病人发生重度休克,估计失血量在40%以上。

78.答案:D

79.答案:D

80.答案:B

81.答案:C

82.答案:C

83.答案:B

84.答案:C

85.答案:D

86.答案:D

87.答案:B

88.答案:B

89.答案:A

解析:方肩畸形见于肩关节脱位。

90.答案:A

91.答案:A

解析:亚硝酸盐中毒能产生高铁血红蛋白血症而出现发绀。

92.答案:B

解析:一氧化碳中毒口唇呈樱桃红色。

93.答案:C

解析:热衰竭(中暑衰竭)由于大量出汗导致水、钠丢失,外周血管扩张引起血容量不足。主要表现皮肤苍白、出冷汗、脉搏细速、血压下降、昏厥或意识模糊,体内多无过量热蓄积,体温基本正常。

94.答案:B

95.答案:C

96.答案:A

97.答案:B

98.答案:B

99.答案:A

100.答案:C

专业实践能力

1.答案:A

解析:不锈钢金属节育器可放置 20 年;塑料或硅胶节育器可放置 3~5 年;带铜节育器可放置 3~5 年;有铜套时可放置 10~15 年;带孕酮节育器一般可放置 10 年。

2.答案:B

解析:避孕方法宜选用安全套或阴道隔膜。

3.答案:B

4.答案:D

解析:排卵前随雌激素水平不断增高,宫颈黏液分泌量逐渐增多,变稀薄透明,有利于精子通行。取黏液涂于玻片,干燥后可见羊齿植物叶状结晶。

5.答案:A

解析:见红为可靠的分娩先兆。

6.答案:C

解析:胎盘剥离征象:子宫体变硬呈球形,子宫底升高达脐上;阴道突然流出大量血液;剥离的胎盘降至子宫下段,阴道口外露的一段脐带自行延长;用手掌尺侧在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段,子宫体上升而外露的脐带不再回缩。

7.答案:A

8.答案:D

解析:此病常在月经期后复发,治疗后应在每次月经干净后复查 1 次,连续 3 个月经周期均是阴性称治愈。

9.答案:C

解析:轻度病人一般无自觉症状。Ⅱ、Ⅲ度病人主诉有外阴“肿物”脱出,行动不便,轻者卧床后“肿物消失”,重者“肿物”一直存在,不可还纳。

10.答案:E

解析:引流管脱出,病人立即形成开放性气胸,因此应该立即封闭伤口。

11.答案:D

12.答案:B

解析:单纯性肥胖症患儿不宜采取减肥,因小儿处于不断生长发育中,但需控制糖类、脂肪的摄入,提高蛋白质的摄入比例,并增加纤维素、维生素和矿物质的摄入。

13.答案:D

解析:肺炎球菌肺炎高热首选物理降温。

14.答案:B

15.答案:A

解析:急性肾炎伴肾衰竭时,最重要的是严格量出为人,减少钠和蛋白质的摄入,以减轻水肿和氮质血症。

16.答案:C

解析:脉冲发生器是心脏起搏器的装置。

17.答案:E

18.答案:C

解析:肝癌主要的病因是肝炎和肝硬化。

19.答案:E

解析:取仰卧中凹位,抬高头胸部 20°,抬高下肢 30°,有利于呼吸和静脉血回流。

20.答案:C

解析:搂抱与抚摸是最适宜的婴儿心理沟通方式。

21.答案:C

解析:枕先露分娩机制的正常顺序:衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转。

22.答案:C

解析:T 形管引流病人下床活动时引流瓶应低于腰部,T 形管阻塞时不可加压冲洗,正常胆汁色泽为深绿、较稠厚,T 形管造影显示通畅要引留几天再拔管。

23.答案:C

解析:妇科腹部手术前1天为病人冲洗阴道2次,第1次冲洗后在宫颈口及阴道穹隆部涂甲紫,为手术切除宫颈标记之用。

24.答案:C

25.答案:D

解析:其他措施不是牵引的目的。

26.答案:D

解析:苯丙酮尿症强调早诊断,一旦确诊尽早给予低苯丙氨酸饮食,以控制智力障碍的进一步发展。

27.答案:C

28.答案:C

29.答案:B

解析:十二指肠溃疡病人疼痛发生在胃处于空虚状态时,进食后疼痛即可缓解。

30.答案:E

解析:麻疹初期最有诊断价值的是麻疹黏膜斑;恢复期最有意义的是皮肤呈麦麸样脱屑,并有棕褐色色素沉着。

31.答案:E

解析:心功能Ⅲ级是指体力活动明显受限,休息时无症状,轻于日常的活动即可出现明显的心悸、气短、呼吸困难等,休息较长时间后症状可缓解。应严格限制一般的体力活动,每天有充分的休息时间,但日常生活可以自理或在他人协助下自理。

32.答案:A

解析:胚胎早期(2~12周)是重要器官的形成时期,此期如遇感染或理化因素的影响,最易发生死胎、流产、先天畸形。

33.答案:D

解析:急性胰腺炎是胰腺分泌的消化酶对胰腺及其周围组织自身消化所致的化学性炎症,主要的治疗措施是抑制或减少胰腺分泌,其中最基本的措施是禁食和胃肠减压。

34.答案:C

解析:食管胃底静脉曲张多由肝硬化肝门静脉高压引起,血管粗、压力大,加之肝硬

化病人本身存在凝血功能障碍,一旦出血不易控制。

35.答案:D

解析:西咪替丁和雷尼替丁属于H₂受体拮抗药。

36.答案:C

解析:哮喘持续状态病人一般给予鼻导管吸氧,如果严重缺氧则应面罩给氧,如果仍不能改善严重缺氧可用压力支持机械通气。

37.答案:B

38.答案:C

39.答案:D

40.答案:B

41.答案:D

42.答案:C

解析:阿司匹林具有抗凝作用,在白血病及出血性疾病时要禁用,以防出血倾向。

43.答案:D

44.答案:D

45.答案:C

46.答案:E

47.答案:D

48.答案:A

49.答案:B

50.答案:B

51.答案:E

52.答案:A

53.答案:C

54.答案:D

55.答案:E

解析:该女性虽然胎膜早破,但是胎先露部未衔接,因此治疗原则是住院待产,严密注意胎心音变化,绝对卧床休息,抬高臀部,避免不必要的肛检与阴道检查。严密观察产妇的生命体征、白细胞计数,了解感染的征象。一般于胎膜破裂后12小时即给予抗生素预防感染发生。

56.答案:B

解析:病人出现了放射性直肠炎,对急性直肠炎应立即停止放疗,用消化道黏膜保护剂药保留灌肠。收敛解痉:可用颠茄合剂、复方樟脑酊;饮食以无刺激、易消化、营养丰富、多次少餐为原则,限制纤维素摄入。

57.答案:A

解析:患者有体克表现,应首先抗休克。

58.答案:B

解析:病人病史以及夜间痛、饥饿、进食可缓解的临床症提示患有十二指肠溃疡。

59.答案:C

60.答案:D

解析:患者只剩余 1 个肾脏时,观察健侧肾功能尤为重要。

61.答案:D

解析:热射病应迅速采取各种降温措施,如物理降温和药物降温。

62.答案:C

解析:禁用热水或乙醇擦洗,以防皮肤血管扩张促进毒物吸收。

63.答案:A

解析:服用华法林过量易引起出血。

64.答案:A

解析:子宫左角破口有水泡状物,出血活跃,镜下见子宫肌壁深层及浆膜下有增生活跃的滋养层细胞,可见绒毛结构,伴停经后大出血,说明宫角妊娠破裂的可能性大。

65.答案:C

解析:从宫口开大 3 cm 开始至宫口开全为活跃期,超过 8 小时为活跃期延长进入活跃期后,宫口不再扩张达 2 小时以上,为活跃期停滞。

66.答案:A

67.答案:D

68.答案:C

69.答案:C

70.答案:A

71.答案:D

解析:该产妇出现了子痫,多数情况子

痫发作者往往在发作后自然临产。如经治疗病情得以控制仍未临产者,应在孕妇清醒后 24~48 小时引产,或子痫病人经药物控制后 6~12 小时,需考虑终止妊娠。护士做好终止妊娠的准备。

72.答案:D

解析:妊娠高血压综合征基本病变是全身小动脉痉挛。小动脉痉挛造成管腔狭窄,周围阻力增大,内皮细胞损伤,通透性增加,体液和蛋白质渗漏,表现为血压上升、蛋白尿、水肿和血液浓缩等。全身各组织器官因缺血、缺氧而受到不同程度损害,严重时脑的病理生理变化可导致抽搐、昏迷。

73.答案:D

74.答案:D

解析:禁止灌肠,以免引起颅内压升高。

75.答案:A

解析:术后出血是最危险的并发症。

76.答案:D

解析:其他措施均可能导致颅内感染。

77.答案:C

解析:分娩期心功能 I ~ II 级,胎儿不大,胎位正常,宫颈条件良好者,在严密监护下可经阴道分娩,第二产程时需助产。

78.答案:C

解析:为防止产后出血过多,可静脉或肌内注射缩宫素,禁用麦角新碱,以免静脉压升高,诱发心力衰竭。

79.答案:D

解析:抗生素术后常规应用 1 周。

80.答案:C

81.答案:C

82.答案:E

83.答案:D

84.答案:E

85.答案:D

86.答案:B

87.答案:E

88.答案:C

解析:外阴纤维瘤为发生于外阴的纤维组织的良性肿瘤。生长缓慢,一般不恶变多位于大阴唇,初起为硬的皮下结节,继而可增大,大小不一,表面可有溃疡和坏死。以单发为主。

89.答案:B

解析:外阴脂肪瘤生长于阴阜、阴唇或外阴其他脂肪组织处,位于皮下组织内,呈圆形分叶状,大小不等。质地较软,生长缓慢。恶变机会亦少。

90.答案:B

91.答案:E

92.答案:D

93.答案:B

94.答案:A

95.答案:D

96.答案:A

97.答案:C

98.答案:C

99.答案:A

100.答案:E

