

## 诊断学基础

1. 体温在 39℃ 以上，持续数日以上，一日内波动范围不超过 1℃ 者，此热型属于
    - A. 弛张热
    - B. 稽留热
    - C. 间歇热
    - D. 波状热
    - E. 不规则热
  2. 若患者胸痛部位在胸骨后，并向左肩部放射，最可能的疾病为
    - A. 胸膜疾患
    - B. 心绞痛
    - C. 肋间神经病变
    - D. 食管炎症
    - E. 肋骨骨折
  3. 引起痰分层现象的疾病是
    - A. 慢性支气管炎
    - B. 肺脓肿
    - C. 肺结核
    - D. 肺炎链球菌肺炎
    - E. 心源性哮喘
- (4~5 题共用备选答案)
- A. 肺炎链球菌肺炎
  - B. 支气管扩张
  - C. 支气管哮喘
  - D. 肺癌
  - E. 急性肺水肿
4. 咳嗽伴大量脓痰的是
  5. 咳嗽伴粉红色泡沫痰的是
  6. 患者咳嗽。查体：气管向左偏移，右侧胸廓较左侧饱满，叩诊出现鼓音。应首先考虑的是
    - A. 右侧气胸
    - B. 左侧肺不张
    - C. 肺气肿
    - D. 右下肺炎
    - E. 右侧胸腔积液
  7. 夜间阵发性呼吸困难，可见于
    - A. 急性脑血管疾病
    - B. 瘧病
    - C. 急性感染所致的毒血症
    - D. 慢性阻塞性肺气肿
    - E. 左心功能不全



金英杰医学网  
JINYINGJIE.COM

8. 患者反复呕吐隔餐食物。查体：消瘦，上腹部膨胀，并见胃型。应首先考虑的是

- A. 肝炎
- B. 肝硬化
- C. 胃炎
- D. 幽门梗阻
- E. 胆囊炎

9. 可引起腹泻伴里急后重的疾病是

- A. 食物中毒
- B. 直肠癌
- C. 过敏性紫癜
- D. 肠结核
- E. 克隆恩病

10. 上消化道出血可单纯表现为呕血或黑便，也可两者兼有，这取决于

- A. 出血量
- B. 原发病
- C. 在胃内停留时间
- D. 出血部位
- E. 出血速度

11. 下列除哪项外，均属于现病史的内容

- A. 起病情况
- B. 主要症状及伴随症状
- C. 诊疗经过
- D. 病情演变情况
- E. 预防接种情况

12. 下列问诊方法中不正确的是

- A. 首先进行过渡性交谈
- B. 先问简单问题
- C. 由主诉开始，逐步深入
- D. 当患者的回答与医师的想法有距离时可进行暗示性和诱导
- E. 避免重复提问

(13~14 题共用备选答案)

- A. 月经情况
- B. 生育情况
- C. 冶游史
- D. 家族遗传病史
- E. 预防接种史

13. 属于既往史的是

14. 属于个人史的是

15. 肝脾触诊最适用

- A. 深压触诊法
- B. 浅部滑行触诊法
- C. 深部滑行触诊法
- D. 双手触诊法
- E. 冲击触诊法

金英大医学网  
JINYINGDAIYIXUE.COM



16. 当实质性器官被含气组织覆盖时，其叩诊音为

- A. 清音
- B. 鼓音
- C. 实音
- D. 浊音
- E. 过清音

17. 肺部叩诊过清音见于

- A. 肺炎球菌性肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 胸腔积液
- D. 阻塞性肺气肿
- E. 原发性支气管肺癌

18. 用口测法测量体温时，正确的是

- A. 正常值为  $36\sim 37^{\circ}\text{C}$
- B. 小儿常用
- C. 昏迷患者可用
- D. 体温在 1 日内有  $1\text{ C}$  以上波动
- E. 体温表放置舌下，紧闭口腔，5 分钟即可读数

19. 患者因病不能自行调节自己的体位，属于

- A. 自动体位
- B. 被动体位
- C. 翻转体位
- D. 强迫体位
- E. 角弓反张位

20. 皮下出血直径大于 5 mm 不伴皮肤隆起者是

- A. 瘀点
- B. 紫癜
- C. 瘀斑
- D. 血肿
- E. 红痣

21. 长期服用肾上腺糖皮质激素的病人会出现

- A. 二尖瓣面容
- B. 满月面容
- C. 急性病容
- D. 粘液水肿
- E. 贫血面容

22. 对于下列疾病，蜘蛛痣有诊断意义的是

- A. 肝硬化
- B. 麻疹
- C. 猩红热
- D. 伤寒
- E. 药物过敏

23. 常早期转移到左侧锁骨上窝淋巴结的恶性肿瘤是

- A. 支气管肺癌



- B. 乳腺癌  
C. 食管癌、胃癌  
D. 鼻咽癌  
E. 甲状腺癌
24. 草莓舌见于  
A. 维生素 A 缺乏  
B. 贫血  
C. 猩红热  
D. 结核  
E. 肿瘤
25. 大量腹水而肝、脾难以触及时最适用  
A. 浅部触诊  
B. 深部滑行触诊  
C. 双手触诊  
D. 深压触诊  
E. 冲击触诊
26. 关于扁桃体肿大，叙述正确的是  
A. I 度肿大为刚超过咽腭弓  
B. II 度肿大为达到咽后壁中线  
C. 超过咽腭弓而未达到中线是III度肿大  
D. 扁桃体肿大共分四度  
E. 达到或超过咽后壁中线为扁桃体III度肿大
27. 双侧瞳孔扩大见于  
A. 阿托品过量  
B. 有机磷农药中毒  
C. 吗啡中毒  
D. 青光眼  
E. 虹膜炎
28. 关于麻疹黏膜斑的描述，以下正确的是  
A. 位于颊黏膜上，高出黏膜表面  
B. 位于第二磨牙的颊黏膜上，针尖大小白色斑点  
C. 位于第一磨牙的颊黏膜上，片状白斑  
D. 颊黏膜上出现瘀斑  
E. 颊黏膜上出现黑色色素沉着
29. 当颈部出现肿块，需要和甲状腺进行鉴别时，最主要是依据  
A. 肿块的位置  
B. 表面是否光滑  
C. 表面有无结节  
D. 甲状腺可随吞咽而上下移动  
E. 肿块的深度
30. 甲状腺功能亢进时特征性的改变是  
A. 甲状腺质地较柔软  
B. 甲状腺可随吞咽上下移动  
C. 甲状腺出现结节

- D. 甲状腺有血管杂音  
E. 甲状腺对称性肿大
31. 以下情况均可使气管移向健侧，但应除外
- A. 肺气肿  
B. 大量胸腔积液  
C. 胸腔积气  
D. 胸膜粘连  
E. 纵隔肿瘤
32. 乳腺皮肤呈橘皮样改变提示
- A. 乳腺炎  
B. 乳腺增生  
C. 乳腺囊肿  
D. 乳腺癌  
E. 乳腺萎缩
33. 胸骨角连接于
- A. 第1肋软骨  
B. 第2肋软骨  
C. 第3肋软骨  
D. 第4肋软骨  
E. 第5肋软骨
34. 肺内局限性的湿啰音提示
- A. 急性肺水肿  
B. 炎性病变  
C. 胸腔积液  
D. 黏稠的分泌物  
E. 支气管痉挛
35. 颈静脉怒张常见于
- A. 高血压病  
B. 严重贫血  
C. 左心衰  
D. 右心衰  
E. 肝硬化
36. 大叶性肺炎叩诊呈
- A. 过清音  
B. 鼓音  
C. 浊音或实音  
D. 清音  
E. 空瓮音
37. 鉴别胸膜摩擦音和心包摩擦音主要依靠
- A. 声音粗糙的程度  
B. 声音发出的部位  
C. 声音持续时间的长短  
D. 屏住呼吸是否存在  
E. 伴有啰音还是杂音



金英杰医学网  
JINYINGJIE.COM

38. 两上肢自然下垂，肩胛角平

- A. 第 3 肋间
- B. 第 4 肋间
- C. 第 5 肋间
- D. 第 6 肋间
- E. 第 7 肋间

39. 患者，男，34 岁，呼吸困难 3 天就诊。查体：左胸呼吸运动减弱，气管右移，左侧语颤明显减弱，叩诊鼓音，听诊呼吸音低弱。应考虑

- A. 肺气肿
- B. 肺心病
- C. 左侧胸腔积液
- D. 左侧气胸
- E. 左侧肺实变

40. 患儿，12 岁。突然出现喘憋，呼吸困难，口唇紫绀，呼气延长，肺部满布哮鸣音。应考虑

- A. 气道异物
- B. 气胸
- C. 肺实变
- D. 支气管哮喘
- E. 肺不张

41. 患者，男，32 岁淋雨后出现寒战、高热、咳嗽、胸痛 2 天。查体右下肺呼吸动度减弱，语颤增强，叩诊实音。应考虑

- A. 干性胸膜炎
- B. 渗出性胸膜炎（胸腔积液）
- C. 肺炎肺实变
- D. 肺不张
- E. 气胸

42. 肺炎球菌肺炎的痰液特征是

- A. 粉红色泡沫样痰
- B. 鲜红色痰
- C. 棕褐色痰
- D. 铁锈色痰
- E. 灰黄色痰

43. 心尖搏动增强可见于

- A. 心包积液
- B. 重症贫血
- C. 心肌炎
- D. 气胸
- E. 肺气肿

44. 患儿，6 岁。进食时，突然出现喘憋。呼吸困难，哭闹，烦躁不安，口唇发绀。查体见吸气时胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显下陷。应考虑为

- A. 自发性气胸
- B. 急性喉炎
- C. 癫痫发作



D. 食物中毒

E. 气道异物

45. 患者，女，60岁。查体：桶状胸，心尖搏动出现在剑突下，且深吸气时增强，肺动脉瓣第二心音增强。应首先考虑的是

A. 冠心病

B. 风心病

C. 高血压性心脏病

D. 肺心病

E. 心肌炎

46. 患者，男，17岁。不明原因的发热、牙龈出血1周。查体发现轻度贫血貌，颌下及腹股沟淋巴结肿大，胸骨压痛，肝脏肋下2指。应考虑为

A. 败血症

B. 淋巴结结核

C. 再生障碍性贫血

D. 急性白血病

E. 急性病毒性肝炎

47. 患者，女，30岁。家人发现其神志不清2小时，双瞳孔缩小，呼气有大蒜味，可能的病因是

A. 脑出血

B. 脑膜炎

C. 脑炎

D. 有机磷农药中毒

E. 安眠药中毒

48. 患者，男，60岁。神志不清1天，查血压140/90 mmHg，双瞳孔等大，呼气有烂苹果味，尿糖(++++)。可能的病因是

A. 脑出血

B. 脑膜炎

C. 有机磷农药中毒

D. 酒精中毒

E. 糖尿病酮症酸中毒

49. 一青年男性患者，腹痛伴发热、恶心，查体右下腹有压痛及反跳痛，最可能的诊断是

A. 急性胃炎

B. 急性胆囊炎

C. 消化性溃疡

D. 急性阑尾炎

E. 急性肠炎

50. 下列哪项提示左心功能不全

A. 脉搏强而大

B. 舒张早期奔马律

C. 奇脉

D. 脉搏过缓

E. 脉搏绝对不齐

51. 患者心悸、气短1年，劳累后加重。检查：脉搏80次/分，节律不规整；心率约110



次/分，心律完全不规则，心音强弱绝对不一致。此患者心律失常的类型是

- A. 窦性心律不齐
- B. 窦性心动过速
- C. 过早搏动
- D. 心房纤维颤动
- E. 室上性心动过速

52. 临床上最为严重的心律失常类型是

- A. 房颤
- B. 室颤
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 房性早搏
- E. 室性早搏

53. 患者，女，38岁。近1年来经常出现心慌，疲乏，劳累后气急，呼吸困难。查体：心浊音界向左下扩大，胸骨右缘第2肋间可听到粗糙的收缩期吹风样杂音。诊断应考虑为

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 房间隔缺损
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 主动脉瓣关闭不全

54. 患者，男，54岁，咳嗽气喘病史20年，近年来出现右上腹胀痛及下肢水肿。查体：心率118次/分，肺气肿体征，肝大，肝-颈静脉返流征(+)。最可能的诊断是

- A. 心包积液
- B. 纤维素性心包炎
- C. 病毒性心肌炎
- D. 右心功能不全
- E. 肝硬化

55. 患者，女，34岁。童年时有关节疼痛史，近1年来时常感到心悸易倦。查体：心脏叩诊呈梨形心，心尖部可听到舒张期隆隆样杂音。其诊断是

- A. 病毒性心肌炎
- B. 风湿性心肌炎
- C. 风心病二尖瓣狭窄
- D. 风心病二尖瓣关闭不全
- E. 房间隔缺损

56. 患者，男，42岁，神疲易倦、心慌5年余。上小学时曾有游走性关节疼痛病史。查体：心尖搏动向左下移位，搏动范围弥散，心尖区可听到3级以上的收缩期风样杂音。最可能的诊断是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 风湿性心肌炎

57. 患者，男，34岁，近1周来发热，心前区疼痛，伴轻度呼吸困难。查体：心浊音界呈烧瓶状，并随体位而变化。其诊断是



- A. 心肌炎
- B. 心肌病
- C. 心绞痛
- D. 心包积液
- E. 心肌梗死

58. 患者, 男, 21 岁, 腹痛 9 小时。饱食后重体力劳动 1 小时开始出现腹部阵发性绞痛, 伴呕吐, 呕吐后腹痛稍减轻, 无排气排便。查体: 腹部膨隆, 脐周明显压痛, 无反跳痛, 无肌紧张, 肠鸣音亢进, 移动性浊音 (-), X 线腹透可见阶梯状含气液平面。临床最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 胃肠穿孔
- C. 机械性肠梗阻
- D. 麻痹型肠梗阻

(59~60 题共用备选答案)

- A. 第一心音
- B. 第二心音
- C. 第三心音
- D. 第四心音
- E. 心包拍击音

59. 因二尖瓣、三尖瓣关闭时的振动而致的是

60. 因主动脉瓣、肺动脉瓣关闭时的振动而致的是

(61~62 题共用备选答案)

- A. 窦性心动过速
- B. 窦性心动过缓
- C. 非阵发性房性心动过速
- D. 室性逸搏心律
- E. 正常窦性心律

61. 心率 100 次/分, 律规整, 最大可能是

62. 心率 45 次/分, 律规整, 最大可能是

63. 腹部叩诊出现移动性浊音, 应首先考虑的是

- A. 尿潴留
- B. 幽门梗阻
- C. 右心功能不全
- D. 急性胃炎
- E. 巨大卵巢囊肿

64. 常见板状腹的疾病是

- A. 结核性腹膜炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性弥漫性腹膜炎
- D. 肠梗阻
- E. 腹水

65. 中枢性瘫痪的特点是

- A. 肌张力降低
- B. 腱反射减弱

金英大医学网  
JINYINGDAIYIXUE.COM



- C. 浅反射消失  
D. 不出现病理反射  
E. 肌张力增强
66. 肝性脑病可见到的症状是  
A. 静止性震颤  
B. 动作性震颤  
C. 老年性震颤  
D. 扑翼样震颤  
E. 手足抽搐
67. 下列可引起中性粒细胞生理性增多的是  
A. 睡眠  
B. 妊娠末期  
C. 休息  
D. 缺氧  
E. 情绪激动
68. 健康成人白细胞正常值为  
A.  $(4\sim 10)\times 10^9/L$   
B.  $(4\sim 11)\times 10^9/L$   
C.  $(5\sim 10)\times 10^9/L$   
D.  $(4.5\sim 10)\times 10^9/L$   
E.  $(4.5\sim 11)\times 10^9/L$
69. 嗜酸性粒细胞增多见于  
A. 副伤寒  
B. 感染早期  
C. 寄生虫疾病  
D. 应用肾上腺皮质激素  
E. X线照射后
70. 健康成人女性血红蛋白的正常值为  
A. 105~150 g/L  
B. 110~150 g/L  
C. 110~155 g/L  
D. 115~155 g/L  
E. 120~160 g/L
71. 健康成人男性红细胞的正常值为  
A.  $(3.0\sim 5.0)\times 10^{12}/L$   
B.  $(3.5\sim 5.0)\times 10^{12}/L$   
C.  $(3.5\sim 5.5)\times 10^{12}/L$   
D.  $(4.0\sim 5.5)\times 10^{12}/L$   
E.  $(4.5\sim 6.5)\times 10^{12}/L$
72. 多尿是指 24 小时尿量大于  
A. 2000 ml  
B. 1000 ml  
C. 1500 ml  
D. 3000 ml



E. 2500 ml

73. 下列哪种疾病必有血尿

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急性黄疸性肝炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 肾病综合征
- E. 肝脓肿

(74~75 题共用备选答案)

- A. 白细胞管型
- B. 颗粒管型
- C. 透明管型
- D. 脂肪管型
- E. 蜡样管型

74. 肾病综合征患者最常见的管型是

75. 肾功能衰竭患者尿中可出现

(76~77 题共用备选答案)

- A. 脓血便
- B. 鲜血便
- C. 柏油样便
- D. 白陶土样便
- E. 稀糊状便

76. 阻塞性黄疸可见

77. 痢疾可见

(78~79 题共用备选答案)

- A. 鲜红血丝痰
- B. 粉红色泡沫样痰
- C. 铁锈色痰
- D. 棕褐色痰
- E. 黑色痰

78. 大叶性肺炎可见

79. 急性肺水肿可见

(80~83 题共用备选答案)

- A. AFP (甲胎蛋白)
- B. ALT (谷丙转氨酶)
- C. ALP (碱性磷酸酶)
- D. CHE (胆碱酯酶)
- E. AMS (血清淀粉酶)

80. 反映肝损害最敏感的检查指标是

81. 原发性肝癌的特异性肿瘤标记物是

82. 急性胰腺炎的特异性检查指标是

83. 有机磷农药中毒时活性降低的是

(84~85 题共用备选答案)

- A. HBsAg (+)
- B. 抗-HBs (+)



- C. HBeAg (+)  
D. 抗-HBc (+)  
E. 抗-HBe (+)
84. 作为机体获得对 HBV 免疫力及乙型肝炎患者痊愈的指标是
85. 反映 HBV 活动性复制和传染性强的指标是
86. 对诊断急性心肌梗死最有价值的血清酶是
- A. 谷草转氨酶  
B. 血清淀粉酶  
C. 碱性磷酸酶  
D. 谷丙转氨酶  
E. 肌酸磷酸激酶及其同工酶
87. 引起病理性血糖升高的原因不包括下列哪种疾病
- A. 甲状腺功能亢进症  
B. 嗜铬细胞瘤  
C. 糖尿病  
D. 肾上腺皮质功能亢进症  
E. 胰岛细胞瘤
88. 空腹血糖测定的正常参考值是
- A. 3.9~6.1 mmol/L  
B. 3.5~5.1 mmol/L  
C. 1.9~3.1 mmol/L  
D. 2.6~5.4 mmol/L  
E. 3.9~5.1 mmol/L
89. 出现大便隐血试验阳性, 其上消化道出血量至少达到的数量是
- A. 5 mL 以上  
B. 10 mL  
C. 20 mL  
D. 50 mL  
E. 60 mL
90. 确诊急性心肌梗死最有意义的是
- A. 心电图+血清酶  
B. 测中心静脉压  
C. X 线胸片  
D. 测定血压及脉搏  
E. 心音图
91. 下列各项, 不符合渗出液特点的是
- A. 比重>1.018  
B. 能自凝  
C. 蛋白定量>30 g/L  
D. 可查到致病菌或癌细胞  
E. 不会查到致病菌或癌细胞
92. 心电图 U 波增高, 可见于
- A. 低血钙  
B. 低血钾



JINJIANGJIE.COM

- C. 高血压
- D. 冠心病
- E. 高血钠

93. 心肌梗死特征性心电图出现在 II、III、AVF 导联，可以确定梗死的部位是

- A. 前间壁
- B. 前壁
- C. 侧壁
- D. 下壁（膈面）
- E. 正后壁

（94~95 题共用备选答案）

- A. P 波
- B. QRS 波群
- C. T 波
- D. U 波
- E. S-T 段

94. 代表左右心房去极化的波是

95. 代表左右心室去极化的波是

96. X 线检查人体内产生自然对比最明显的部位是

- A. 胸部
- B. 腹部
- C. 躯干
- D. 四肢
- E. 头部

97. 消化道造影检查常用的造影剂是

- A. 碘化油
- B. 硫酸钡
- C. 胆影葡胺
- D. 泛影葡胺
- E. 气体

98. 中央型肺癌最典型的征象是

- A. 黏液嵌塞征
- B. 局限性肺气肿
- C. 段或叶的肺不张
- D. 阻塞性肺炎
- E. 肺门阴影增浓

99. 需通过支气管造影确诊的疾病是

- A. 支气管扩张
- B. 肺气肿
- C. 慢性支气管炎
- D. 肺癌
- E. 肺结核

（100~101 题共用备选答案）

- A. X 线检查
- B. 数字化减影血管造影



C. M 型超声检查

D. CT 检查

E. MR 检查

100. 诊断骨折最常用的检查方法是

101. 诊断心脏和大血管疾病最常用的检查方法是

102. 患者，女，18 岁，近 2 个月来感乏力，午后低热，体温 37.6℃，食欲不佳，盗汗，伴咳嗽中带血。胸片显示右上肺见淡密度斑片状影，其密度不均，边界不清。诊断考虑为

A. 肺炎

B. 肺结核

C. 肺癌

D. 肺间质性病变

E. 肺脓肿

103. 立位腹部平片可见膈下游离气体影，首先考虑的是

A. 肺炎

B. 急性胃肠穿孔

C. 肠炎

D. 胰腺炎

E. 肠梗阻

(104~105 题共用备选答案)

A. 骨骼

B. 软组织与液体

C. 脂肪

D. 气体

E. 胸膜

104. 密度最低，X 线片上呈黑色的是

105. 密度最高，X 线片上呈白色的是



## 参考答案

1. 【答案】B

2. 【答案】B

3. 【答案】B

4. 【答案】B

5. 【答案】E

6. 【答案】A

7. 【答案】E

8. 【答案】D

9. 【答案】B

10. 【答案】A

11. 【答案】E

12. 【答案】D

13. 【答案】E

15. 【答案】C

16. 【答案】D

17. 【答案】D
18. 【答案】E
19. 【答案】B
20. 【答案】C
21. 【答案】B
22. 【答案】A
23. 【答案】C
24. 【答案】C
25. 【答案】E
26. 【答案】E
27. 【答案】A
28. 【答案】B
29. 【答案】D
30. 【答案】D
31. 【答案】D
32. 【答案】D
33. 【答案】B
34. 【答案】B
35. 【答案】D
36. 【答案】C
37. 【答案】D
38. 【答案】E
39. 【答案】D
40. 【答案】D
41. 【答案】D
42. 【答案】B
44. 【答案】E
45. 【答案】D
46. 【答案】D
47. 【答案】D
48. 【答案】E
49. 【答案】D
50. 【答案】B
51. 【答案】D
52. 【答案】B
53. 【答案】D
54. 【答案】D
55. 【答案】C
56. 【答案】B
57. 【答案】D
58. 【答案】C
59. 【答案】A
60. 【答案】B
61. 【答案】A



62. 【答案】B  
63. 【答案】C  
64. 【答案】C  
65. 【答案】E  
66. 【答案】D  
67. 【答案】B  
68. 【答案】A  
69. 【答案】C  
70. 【答案】B  
71. 【答案】D  
72. 【答案】E  
73. 【答案】A  
74. 【答案】D  
75. 【答案】E  
76. 【答案】D  
77. 【答案】A  
78. 【答案】C  
79. 【答案】B  
80. 【答案】B  
81. 【答案】A  
82. 【答案】E  
83. 【答案】D  
84. 【答案】B  
85. 【答案】C  
86. 【答案】E  
87. 【答案】E  
88. 【答案】A  
89. 【答案】A  
90. 【答案】A  
91. 【答案】E  
92. 【答案】B  
93. 【答案】D  
94. 【答案】A  
95. 【答案】B  
96. 【答案】A  
97. 【答案】B  
98. 【答案】E  
99. 【答案】A  
100. 【答案】A  
101. 【答案】C  
102. 【答案】B  
103. 【答案】B  
104. 【答案】D  
105. 【答案】A

