

## 中西医执业助理 A 卷答案 91-150 题

91、患者突起胃脘疼痛，呕吐清涎，面色苍白，舌苔白润，脉沉紧，其临床意义是

- A、表实寒证
- B、表实热证
- C、里实寒证
- D、里虚寒证
- E、里虚热证

【答案】C

92、患者消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔的临床意义是

- A、太阳病证
- B、阳明病证
- C、少阳病证
- D、少阴病证
- E、厥阴病证

【答案】E

93、患者，男，41岁。午后呕吐2次，腹泻5次，经输液治疗后，夜间吐泻未作，天明前左腿抽筋2次，起床后仍感疼痛。用药应首选的药物是

- A、藿香
- B、佩兰
- C、木瓜
- D、石菖蒲
- E、苍术

【答案】C

94、患者舌短缩，色红绛而干的临床意义是

- A、寒凝筋脉
- B、气血俱虚
- C、痰湿内蕴
- D、热盛伤津
- E、动风先兆

【答案】D

95、患者，女，23岁。心烦失眠1个月。患者因最近与同事发生矛盾，心情烦躁，入夜难以入睡，自觉手足心发热，口干欲饮，但所饮不多，舌红苔薄而干，脉细数的临床意义是

- A、心阴虚证
- B、肝阴虚证
- C、心火上炎证
- D、肝火上炎证
- E、肝气郁结证

【答案】B

96、患者，女，17岁。因高考将至，过度紧张，而致心情烦躁，入夜难眠，口干多饮，舌红苔黄干，脉数的临床意义是

- A、心阴虚证
- B、肝阴虚证

- C、心血虚证
- D、心火亢盛证
- E、肝火上炎证

【答案】D

97、患者，男，49岁。小便开始或末尾尿液混浊，色如米泔，伴有小便不畅，舌质淡，苔薄黄，脉象弦滑。用药应首选的药物是

- A、木通
- B、茯苓
- C、萆薢
- D、车前子
- E、泽泻

【答案】C

98、者，男，42岁。胁肋胀痛，脘腹灼热疼痛，口苦，舌质红，脉弦数。用药应首选的药物是

- A、木香
- B、香附
- C、乌药
- D、川楝子
- E、佛手

【答案】D

99、患者，男，40岁。腰腿怕冷，痿软无力，伴有阳痿、早泄、尿频症状，舌淡苔白，脉沉迟少力。用药应首选的药物是

- A、干姜
- B、细辛
- C、肉桂
- D、吴茱萸
- E、小茴香

【答案】C

100、患者，男，33岁，身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，舌红少苔，脉虚数。治疗应首选

- A. 导赤散
- B. 凉膈散
- C. 生脉散
- D. 竹叶石膏汤
- E. 清暑益气汤

【答案】D

101、患者，女，58岁，恶寒蜷卧，四肢厥冷，吐泻腹痛，口不渴，神衰欲寐，脉沉微。治疗应首选

- A. 理中丸
- B. 肾气丸
- C. 四逆散
- D. 当归四逆汤
- E. 回阳救急汤

【答案】E

102、患者，女，37岁，症见眩晕，头痛，胸膈痞满，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑者，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 清气化痰丸
- C. 茯苓丸
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 小陷胸汤

【答案】D

103、患者，女，33岁，恶寒发热，头痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，恶心呕吐，善泄泻，舌苔白腻，应选用的治则是

- A. 燥湿运脾，行气和胃
- B. 解表化湿，理气和中
- C. 清热，利湿，退黄
- D. 清热泻火，利水通淋
- E. 宣畅气机，清利湿热

【答案】B

104、患者，女，28岁，胆怯易惊，虚烦不宁，失眠多梦，或呕恶呃逆，或眩晕，或癫痫等，苔腻微黄，脉弦滑，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 清气化痰丸
- C. 茯苓丸
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 小陷胸汤

【答案】A

105、患者，男，15岁，食少难消，脘腹痞满，大便溏薄，倦怠乏力，苔腻微黄，脉虚弱治宜选用

- A. 健脾丸
- B. 保和丸
- C. 四逆散
- D. 痛泻要方
- E. 葛根黄芩黄连汤

【答案】A

106、患者外感风寒湿邪，症见恶寒发热头痛，肌表无汗，肢体酸楚疼痛，口苦而渴者，治宜选用

- A. 参苏饮
- B. 败毒散
- C. 桂枝汤
- D. 小青龙汤
- E. 九味羌活汤

【答案】E

107、患者，女，31岁，两胁作痛，头痛目眩，月经不调，乳房作胀，神疲食少，脉弦而虚者。治宜选用

- A. 四逆散
- B. 柴胡疏肝散

C、逍遥散

- D、一贯煎
- E、痛泻要方

【答案】C

108、患者，中年男性。持续或间断咳血痰或少量咯血，最大可能是

- A. 肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 肺气肿

D. 肺癌

- E. 肺梗死

【答案】D

109、患者，男，30岁，食欲和记忆力减退，检查：眼睑苍白，血红细胞、白细胞和血小板均减少。应首先考虑的是

A. 再生障碍性贫血

- B. 缺铁性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 失血性贫血
- E. 巨幼红细胞性贫血

【答案】A

110、患者，女，25岁。大咯血急诊入院，既往有反复咳嗽、大量脓痰及咯血病史。胸片示左下肺肺纹理增多、增粗、排列紊乱。诊断最可能的是

- A. 肺结核
- B. 肺炎
- C. 肺癌

D. 支气管扩张

- E. 肺脓肿

【答案】D

111、患儿，男，10岁。皮肤黄染伴右上腹绞痛2天。实验室检查：尿胆红素(+)，尿胆原(-)。应首先考虑的是

- A. 蚕豆病
- B. 胃炎
- C. 胆道蛔虫症
- D. 急性病毒性肝炎
- E. 遗传性球形红细胞增多症

【答案】C

112、患者，男，32岁，牙痛剧烈，伴口臭，口渴，便秘，舌苔黄，脉洪。治疗应首选

- A. 风池
- B. 外关
- C. 足三里
- D. 风门

E. 内庭

【答案】E

113、患者，男，48岁。大便出血，色鲜红，血量不等，有赘物垂于肛外。治疗应首选

A. 承山

- B. 大肠俞
- C. 小肠俞
- D. 膈俞
- E. 血海

【答案】A

114、患者高血压史2年。平素心烦惊悸，健忘失眠。治疗应首选

- A. 合谷
- B. 间使
- C. 神门
- D. 内关
- E. 灵道

【答案】C

115、患者，女，68岁。因心力衰竭入院，拟用地高辛口服治疗，每日0.25mg。已知地高辛半衰期为36小时，达稳定的血药浓度约需

- A. 2~3天
- B. 6~7天
- C. 9~10天
- D. 12~14天
- E. 16~18天

【答案】B

116、患者，男，40岁。癫痫病史多年，今因癫痫持续状态被送入医院。应采取的治疗措施是

- A. 口服苯巴比妥
- B. 口服苯妥英钠
- C. 口服丙戊酸钠
- D. 静脉注射安定、地西泮
- E. 肌肉注射氯丙嗪

【答案】D

117、患者，男，62岁。患高血压病8年，突发气促，端坐呼吸，咳吐粉红色泡沫痰。检查：双肺广泛水泡音，血压160/90mmHg。治疗应首选

- A. 氨茶碱
- B. 螺内酯(安体舒通)
- C. 地高辛
- D. 吗啡
- E. 多巴酚丁胺

【答案】C

118、病原体侵入人体后能否引起疾病，主要取决于

- A. 机体的保护性免疫
- B. 机体的天然屏障作用
- C. 病原体的毒力与数量
- D. 病原体的侵入途径与特异性定位
- E. 病原体的致病力与机体的免疫功能

【答案】E

119、属DNA病毒的是

- A. 甲型肝炎病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 丙型肝炎病毒
- D. 丁型肝炎病毒
- E. 戊型肝炎病毒

【答案】B

120、普通型流脑临床特征性体征是皮肤

- A. 瘀点或瘀斑
- B. 水疱
- C. 黑痂
- D. 斑丘疹
- E. 脓肿

【答案】A

- A、上出息道，下走气街
- B、熏于肓膜，散于胸腹
- C、通过三焦，流行全身
- D、上荣头目，达于周身
- E、与血同行，环周不休

121、宗气的分布是 A

122、卫气的分布是 B

- A、胆
- B、胃
- C、小肠
- D、大肠
- E、膀胱

123、具有“主津”功能的脏是 D

124、具有“主液”功能的脏是 C

- A、大汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，神情淡漠，呼吸微弱，脉微欲绝
- B、形体消瘦，五心烦热，颧红盗汗，口燥咽干，皮肤干燥，脉象细数
- C、身热大汗，汗热质黏，面色潮红，躁扰不安，渴喜冷饮，脉细数疾
- D、高热肢厥，神识昏沉，胸腹灼热，口渴喜饮，面色紫暗，脉沉有力
- E、经常畏冷，四肢不温，渴喜热饮，常自汗出，尿清便溏，脉迟无力

125、真寒假寒证的临床表现是 D

126、亡阳证的临床表现是 A

- A、发热，微恶风寒，舌边尖红，脉浮数
- B、发热，神昏谵语，斑疹紫暗，出血动风，舌质深绛
- C、身热夜甚，心烦，舌红绛，脉细数
- D、壮热，汗出，口渴，脉洪大
- E、发热，汗出，口渴，舌红苔黄，脉数

127、血分证的辨证要点是 B

128、营分证的辨证要点是 C

- A、气陷证
- B、气虚证
- C、气不固证
- D、气脱证
- E、血脱证

129、年高体弱，小便淋沥不尽，夜尿多，神疲，气短，动则汗出，脉弦缓的临床意义是 C

130、外伤后腹痛，出冷汗，面色苍白，脉微的临床意义是 D

- A、泻下力强
- B、泻下力缓
- C、偏于活血
- D、清上焦火热
- E、善止血

131、生大黄的作用特点是 A

132、大黄炭的作用特点是 E

- A、木通
- B、金钱草
- C、石韦
- D、地肤子
- E、海金沙

133、具有利尿通淋、止咳功效的药物是 C

134、具有清热利湿、止痒功效的药物是 D

- A、青蒿鳖甲汤
- B、茵陈蒿汤
- C、半夏泻心汤
- D、四逆散
- E、蒿芩清胆汤

135、清胆利湿，和胃化痰的方剂是 E

136、寒热平调，消痞散结的方剂是 C

- A、止嗽散
- B、泻白散
- C、清气化痰丸
- D、苏子降气汤
- E、贝母瓜蒌散

137、热痰咳嗽。症见胸膈痞闷，气急呕恶，咯痰不爽，苔黄而腻者，治宜选用 C

138、燥痰咳嗽。症见呛咳气急，咯痰不爽，咽喉干燥，苔白而干者，治宜选用 E

- A、咯铁锈色痰
- B、咯粉红色泡沫痰
- C、唇色、睑结膜苍白
- D、咳嗽，午后潮热，盗汗
- E、弛张热，皮肤、巩膜黄染

139、患败血症时，可出现 E

140、患肺结核时，可出现 D

- A、闪罐法
- B、留罐法

- C、走罐法
- D、刺血拔罐法
- E、留针拔罐法

141、治疗丹毒、扭伤常选用 **D**

142、治疗局部皮肤麻木或功能减退常选用 **A**

- A、磺胺嘧啶
- B、甲硝唑
- C、甲氧苄啶
- D、左氧氟沙星
- E、呋喃唑酮

143、治疗各种厌氧菌感染的重要药物是 **B**

144、可以代替大环内酯类用于支原体肺炎的药物是 **D**

- A、氢氯噻嗪
- B、普萘洛尔
- C、胍屈嗪
- D、哌唑嗪
- E、卡托普利

145、可引起高血钾、血管神经性水肿的降压药物是 **E**

146、可引起红斑狼疮样综合征的降压药物是 **C**

- A、经济标准
- B、疗效标准
- C、社会标准
- D、行为标准
- E、科学标准

147、评价医务人员医疗行为善恶标准的出发点和根本标准是 **B**

148、评价医疗行为是否有利于人类生存和改善，是否有利于人类健康符合 **C**

- A、地方卫生法规
- B、基本法律
- C、卫生法律
- D、卫生规章
- E、卫生行政法规

149、省级人民代表大会制定颁布的是 **A**

150、国务院卫生行政部门颁布的是 **D**