

初级备考测评第四天答案与解析

基护一

1. 答案：D

解析：“将您的右手握拳，穿刺时可能有点痛，但我会轻一些，请您放心”属于安慰用语。

2. 答案：B

解析：“您好，我是您的责任护士，叫张研，有事请找我”，属于介绍用语，语义逻辑判断，本题选B项。

3. 答案：D

解析：《中华人民共和国护士管理办法》中规定护士执业注册有效期为5年需连续注册（A错误），中断注册者超过3年的，还应当提交在省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门规定的教学、综合医院接受3个月临床护理培训并考核合格的证明（B、C错误），护士在执业中得悉就医者的隐私，不得泄露，但法律另有规定的除外。（E错误），护生进行专业实习须在护士的指导下进行（D正确）。

4. 答案：D

解析：10%氯化钾用于严重低钾血症或不能口服者。一般用法将10%氯化钾注射液10~15ml加入5%葡萄糖注射液500ml中滴注。10%氯化钾严禁直接静脉滴注与推注，故选D。

5. 答案：B

解析： $1000 \times 0.1\% \div 5\% = 20\text{ml}$ 。

6. 答案：C

解析：1860年，南丁格尔在英国创立第一所护士学校。

7. 答案：C

解析：1887年，美国护士麦克奇尼在上海妇孺医院开设护士培训班。1888年，美国护士约翰逊在福州成立了我国第一所护士学校。

8. 答案：D

解析：1903年，美国北卡罗莱、新泽西等州首先颁布了《护士执业法》，作为护士执业的法律规范。1919年，英国颁布了世界上第一部护理法。1921年，荷

兰颁布了本国的护理法。1953年，国际护士学会制定了《国际护士学会护士守则》。

9. 答案：B

解析：1909年，中国护理界群众性的学术团体“中华护士会”在江西牯岭成立，1936年改为中华护士学会，1964年改为中华护理学会并沿用至今。

10. 答案：D

解析：1919年，英国颁布了世界上第一部护理法。1921年，荷兰颁布了本国的护理法。1953年，国际护士学会制定了《国际护士学会护士守则》，并分别于1965年和1973年修订。1968年，国际护士学会成立了护理立法委员会，制定了世界护理法上划时代的纲领性文件《系统制定护理法规的参考性指导》，为各国制定护理法所涉及的内容提供了权威性的指导。

11. 答案：D

解析：1950年全国第一届卫生会议召开，将中等专业教育作为培养护士的唯一途径，并由卫生部制订全国统一教学计划和编写统一教材。故本题选D。

12. 答案：C

解析：1966年，美国精神病学家提出临终患者的五个心理阶段，依次为：否认期、愤怒期、协议期、忧郁期、接受期，被公认为是现代临终关怀运动中最权威、最准确剖析临终患者心理学特征的学说。故本题选C。

13. 答案：C

解析：24小时尿量 $>2500\text{ml}$ 称为多尿。

14. 答案：C

解析：24小时尿量 400ml 或每小时尿量 $<17\text{ml}$ ，称为少尿。

15. 答案：C

解析： 500ml 的95%乙醇溶液可以配置70%乙醇溶液一共 $500 \times 95\% \div 70\% \approx 678\text{ml}$ 。因此需要加蒸馏水 $678 - 500 = 178\text{ml}$ 。故选C。

16. 答案：A

解析：I类，层流洁净手术室和层流洁净病房；II类，普通手术室、产房、婴儿房、早产儿室、普通保护性隔离病房、供应室无菌区、烧伤病房、重症监护病房；III类，儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房和房间。故选A。

17. 答案：A

解析：A 错误，头下应置一枕头，防止面部淤血；B 正确，如有假牙应尽量戴好以维持死者面部容貌；C 正确，用绷带托扶下颌以维持死者面部容貌；D 正确，如有伤口应更换清洁敷料；E 正确，对腔隙如鼻、耳、口腔、肛门、阴道等仍可能流血或仍有液体渗出者，可用棉球、凡士林纱布等堵塞，但应防止堵塞过多而引起容貌改变。故本题选 A。

18. 答案：D

解析：A 可增加胶体渗透压及微循环血量。B 可补充电解质和水。C 可调节酸碱平衡。葡萄糖溶液可补充热量和水分，减少组织分解，减少酮体产生，减少蛋白消耗，促进钾离子进入细胞内。有 5% 和 10% 两种浓度。E 为高渗溶液，用于利尿脱水，可迅速提高血浆渗透压，回收组织水份进入血管内，消除水肿。同时可降低颅内压，改善中枢神经系统的功能。故本题应选 D。

19. 答案：A

解析：A 抬高头胸部，有利于呼吸；抬高下肢，有利于静脉血回流，增加心输出量，适用于休克患者；B 适用于肺部分泌物引流、十二指肠引流、妊娠时胎膜早破、跟骨牵引或胫骨牵引时；C 适用于灌肠、肛门检查、臀部肌内注射、配合胃镜检查等；D 适用于心肺疾患所引起呼吸困难的患者、腹腔、盆腔手术后或有炎症的患者、腹部手术后患者、某些面部及颈部手术后患者；E、适用于颈椎骨折进行颅骨牵引时作反牵引力、预防脑水肿、开颅手术后。休克患者应安置中凹位。故本题选 A。

20. 答案：C

解析：A 为大量不保留灌肠，成人每次用量 500ml；B 生理盐水中含有钠盐，不适宜钠滞留患者；C 正确；D 应为 4℃；E 保留灌肠后患者不易入睡。