

2021 年 7 月临床执业医师月度考试（第四单元）

1、（A1 型选择题）微血栓的主要成分是

- A.血小板
- B.白蛋白
- C.纤维蛋白
- D.纤维素
- E.白细胞

2、（A1 型选择题）不属于风湿热诊断标准中主要表现的是

- A.心脏炎
- B.舞蹈病
- C.皮下小结
- D.关节痛
- E.环形红斑

3、（A1 型选择题）乳腺癌治疗方案设计和预后判断最有意义的是检测前哨淋巴结的

- A.大小

- B.数量
- C.质地
- D.染色的状况
- E.是否有癌转移

4、（A1 型选择题）不是分枝杆菌特性的是

- A.生长慢并有分枝生长的趋势
- B.抗酸染色阳性
- C.毒力和耐药性均可发生变异
- D.营养要求高
- E.专性厌氧

5、（A1 型选择题）下列不属于维系蛋白质三级结构的化学键的是

- A.氢键
- B.盐键
- C.肽键
- D.范德华力
- E.疏水键

6、（A1 型选择题）肠伤寒坏死灶的主要部位是

- A.黏膜下层
- B.皱襞内
- C.毛细血管内
- D.黏膜层
- E.淋巴组织内

7、（A1 型选择题）属于非二氢吡啶类钙通道阻滞剂的是

- A.氨氯地平
- B.硝苯地平
- C.非洛地平
- D.维拉帕米
- E.吲达帕胺

8、（A1 型选择题）下列疾病属于下丘脑性闭经的是

- A.空蝶鞍综合征
- B.颅咽管瘤
- C.子宫内膜炎

D.卵巢早衰

E.Asherman 综合征

9、（A1 型选择题）骨折的特有体征是

A.局部皮下瘀斑

B.功能障碍

C.局部压痛

D.轴向叩击痛

E.反常活动

10、（A1 型选择题）可分泌胃蛋白酶原的主要细胞是

A.肥大细胞

B.主细胞

C.黏液细胞

D.杯状细胞

E.壁细胞

11、（A1 型选择题）卵巢纤维瘤伴胸腹水形成称为

A.Meniere 综合征

B.Down 综合征

C.Cushing 综合征

D.Meigs 综合征

E.类癌综合征

12、（A1 型选择题）抢救大咯血患者时，最不宜采取的体位是

A.右侧卧位

B.头低足高位

C.俯卧位

D.仰卧位

E.左侧卧位

13、（A1 型选择题）可导致输血反应的天然抗体类型是

A.IgD

B.IgG

C.IgM

D.IgE

E.IgA

14、（A1 型选择题）肾脏在胎儿期合成较多的激素是

A.1, 25- (OH) 2D3

B.前列腺素

C.肾素

D.促红细胞生成素

E.利钠激素

15、（A1 型选择题）吸入性肺脓肿多发于右肺的最主要原因是

A.右主支气管较细

B.右主支气管较短

C.右主支气管较长

D.右主支气管周围淋巴结多

E.右主支气管陡直,较粗大

16、（A1 型选择题）苯丙酮尿症属于

A.染色体畸变

B.常染色体隐性遗传

C.常染色体显性遗传

D.X 连锁显性遗传

E.X 连锁隐性遗传

17、（A1 型选择题）急性炎症渗出主要成分是

A.淋巴细胞

B.浆细胞

C.巨噬细胞

D.嗜酸性粒细胞

E.中性粒细胞

18、（A1 型选择题）ABO 抗原引起的反应

A.IV型超敏反应

B.III型超敏反应

C.II型超敏反应

D. I 型超敏反应

E.以上均不是

19、（A1 型选择题）需治疗的无症状性菌尿见于

A.老年女性

B.长期留置导尿管

C.糖尿病

D.妊娠妇女

E.绝经前非妊娠妇女

20、（A1 型选择题）痰呈铁锈色最常见于

A.葡萄球菌肺炎

B.肺炎支原体肺炎

C.肺炎链球菌肺炎

D.克雷伯杆菌肺炎

E.病毒性肺炎

21、（A1 型选择题）前置胎盘病例，仅适用于阴道分娩的是

A.边缘性前置胎盘而胎儿为头位

B.部分性前置胎盘而胎儿为头位

C.部分性前置胎盘而胎儿为臀位

D.低置性前置胎盘而胎儿为臀位

E.以上均不是

22、（A1 型选择题）下列选项不是微量元素的是

- A.铁
- B.碘
- C.锌
- D.镁
- E.铜

23、（A1 型选择题）支气管哮喘患者急性发作时， PaCO_2 逐渐增高表示

- A.没有临床意义
- B.病情严重
- C.病情好转
- D.发作早期
- E.有心血管并发症

24、（A1 型选择题）癫痫持续状态首选的治疗药物是

- A.苯妥英钠
- B.异戊巴比妥
- C.水合氯醛

D.地西洋

E.苯巴比妥钠

25、（A1 型选择题）有关气道高反应性（AHR）的描述正确的是

A.气道炎症是导致 AHR 的重要机制

B.AHR 是哮喘发作的重要神经机制

C.AHR 棒测阳性者可诊断支气管哮喘

D.肺泡巨噬细胞激活可降低 AHR

E.AHR 不受遗传因素的影响

26、（A1 型选择题）急性胰腺炎的典型症状是

A.上腹部烧灼样疼痛，进食后可缓解

B.上腹部持续性剧烈疼痛,向左上臂内侧放射

C.阵发上腹部钻顶样疼痛，辗转体位

D.脐周阵发性疼痛，停止排便和排气

E.上腹部持续性剧烈疼痛，向腰背部放射

27、（A1 型选择题）高压蒸汽灭菌法通常在 103.4kPa 的压力下维持时间为

A. 15~20 分钟

B.0~40 分钟

C.1~5 分钟

D.6~10 分钟

E.55~60 分钟

28、（A1 型选择题）“人命至重，有贵千金”，说这句话的是

A.希腊医生希波克拉底

B.明代李天成

C.唐代孙思邈

D.东汉华佗

E.东汉张仲景

29、（A1 型选择题）引起早产最常见的原因是

A.子宫畸形

B.急性肾盂肾炎

C.下生殖道及泌尿道感染

D.胎盘早剥

E.吸烟，酗酒

30、（A1 型选择题）心脏骤停最重要的诊断依据是

- A. 桡动脉搏动消失
- B. 手足抽搐
- C. 心音消失
- D. 呼吸断续
- E. 呼之不应

31、（A1 型选择题）心尖搏动点向左下移位常见于

- A. 右心房增大
- B. 心包积液
- C. 左心室增大
- D. 右心室增大
- E. 左心房增大

32、（A1 型选择题）苯丙酮尿症主要的神经系统危害是

- A. 多动
- B. 肌痉挛
- C. 癫痫小发作

D.行为落后

E.智能发育落后

33、（A1 型选择题）放置宫内节育环的时间是

A.月经后 3~7 天

B.月经前 3~7 天

C.月经后 1 天

D.月经前 1 天

E.无时间限制

34、（A1 型选择题）新生儿接种卡介苗的时间是

A.出生后 5 天

B.出生后 4 天

C.出生后 3 天

D.出生后 2 天

E.出生后 1 天

35、（A1 型选择题）区分胃幽门与十二指肠的解剖标志是

A.胃冠状静脉

- B.胃短静脉
- C.胃网膜右动脉
- D.胃十二指肠动脉
- E.幽门前静脉

36、（A1 型选择题）术后 3~6 日发热的最常见原因是

- A.代谢异常
- B.低血压
- C.肺不张
- D.感染
- E.输血反应

37、（A1 型选择题）对于胃食管反流病患者，需要定期接受内镜检查的是

- A.非糜烂性胃食管反流病
- B.合并食管孔疝
- C.反酸、烧心反复出现
- D.Barrett 食管
- E.伴有咽部异物感

38、（A1 型选择题）先天性巨结肠最常见的并发症是

- A.肠梗阻
- B.败血症
- C.营养不良
- D.肠穿孔
- E.小肠结肠炎

39、（A1 型选择题）弥漫性硬化性肾小球肾炎的肾脏表现为

- A.大红肾
- B.大瘢痕性固缩肾
- C.大白肾
- D.蚤咬肾
- E.颗粒性固缩肾

40、（A1 型选择题）骨折切开复位比闭合复位的最大优点是

- A.达到解剖复位
- B.制动时间缩短
- C.降低感染风险

D.缩短骨折愈合时间

E.减少骨折部位创伤

41、（A1 型选择题）在梗阻性黄疸中，鉴别胆总管结石和胰头癌的主要依据是

A.血尿淀粉酶变化时间和幅度

B.皮肤瘙痒

C.黄疸进行性加重

D.肝功能改变分析

E.胆囊肿大

42、（A1 型选择题）原发性肝癌最理想的肿瘤标记物

A.CEA

B.GGT

C.CA19-9

D.CA125

E.AFP

43、（A1 型选择题）导致食物中毒的副溶血性弧菌最容易污染的食品是

- A.剩米饭
- B.罐头
- C.家庭自制豆制品
- D.海产品和盐渍食品
- E.禽肉类及其制品

44、（A1 型选择题）诊断支气管扩张首选的检查是

- A.胸部超声
- B.支气管造影
- C.胸部高分辨 CT
- D.胸部 X 线
- E.胸部磁共振

45、（A1 型选择题）协助诊断肾挫伤，首要的检查是

- A.血肌酐
- B.尿常规
- C.静脉尿路造影
- D.血细胞比容

E.腹部 CT 平扫

46、（A1 型选择题）肾病综合征最基本、最重要的病理生理机制是

A.肾小管重吸收蛋白不足

B.肝脏合成白蛋白不足

C.血浆蛋白分解代谢增强

D.蛋白质摄入不足

E.大量蛋白尿从尿中丢失

47、（A1 型选择题）小儿重症肺炎出现严重腹胀，最可能的原因是

A.低钙血症

B.中毒性肠麻痹

C.低钠血症

D.低钾血症

E.消化不良

48、（A1 型选择题）慢性阻塞性肺疾病的慢性气道炎症最主要的效应细胞是

A.嗜酸性粒细胞

- B.树突状细胞
- C.中性粒细胞
- D.巨噬细胞
- E.淋巴细胞

49、（A1 型选择题）能够引起排卵后体温升高的激素是

- A.黄体生成素
- B.促卵泡激素
- C.孕激素
- D.雌激素
- E.催乳素

50、（A1 型选择题）持续性心房颤动是指心房颤动持续时间

- A.大于 24 小时
- B.大于 48 小时
- C.大于 7 天
- D.大于 1 个月
- E.大于 3 个月

51、（A1 型选择题）最易发生血栓并发症的肾病综合征病理类型是

- A.微小病变肾病
- B.系膜增生性肾炎（非 IgA 肾病）
- C.系膜增生性 IgA 肾病
- D.局灶节段性肾小球硬化
- E.膜性肾病

52、（A1 型选择题）蜘蛛痣的常见部位是

- A.上腹部
- B.上胸部
- C.足部
- D.臀部
- E.大腿

53、（A1 型选择题）肝硬化大量腹水不会出现的腹部体征是

- A.腹部膨隆
- B.液波震颤阳性
- C.移动性浊音阳性

D.振水音阳性

E.蛙状腹

54、（A2型选择题）女，6岁。诊断为单纯性肾病综合征，病程中患儿出现腰痛、尿呈洗肉水样，此时最可能是发生了

A.泌尿系感染

B.肾结石

C.肾衰竭

D.肾静脉血栓形成

E.电解质紊乱

55、（A2型选择题）男，20岁。跨栏比赛时会阴部受伤。伤后会阴部疼痛、青紫，尿道出血，不能自行排尿。应考虑的诊断是

A.睾丸损伤

B.耻骨骨折

C.后尿道损伤

D.尿道球部损伤

E.膀胱破裂

56、（A2 型选择题）女，17 岁。下腹疼痛 2 个月。盆腔 B 超检查子宫大小正常，左侧宫旁探及 6cm×5cm×3cm 大小肿物，边界清。血清 AFP900μg/L。最可能的诊断是

- A. 卵巢畸胎瘤
- B. 卵巢颗粒细胞瘤
- C. 卵巢内胚窦瘤
- D. 卵巢卵泡膜细胞瘤
- E. 卵巢无性细胞瘤

57、（A2 型选择题）女，25 岁，足月顺产后 2 周开始下床活动，觉左下肢痛、肿胀，左下肢皮肤略发绀，皮温高，表浅静脉曲张，沿左股静脉走行区有明显压痛。应考虑为

- A. 血栓性股静脉炎
- B. 血栓性大隐静脉炎
- C. 左髂股静脉血栓形成
- D. 局限性股深静脉血栓形成
- E. 以上都不对

58、（A2 型选择题）女孩，10 岁。午餐时突发神志丧失，手中持碗失落，

打碎后即醒。脑电图示:3周/秒,棘慢波规律和对称性发放。最可能的诊断是

- A.复杂部分发作
- B.部分性发作
- C.杰克逊癫痫
- D.不能分类的癫痫发作
- E.失神发作

59、(A2型选择题)某学生希望毕业后成为外科医师,因此他在临床实习中主动向老师请教,积极为患者服务,并能结合临床案例查阅相关的文献,他的行为表现在意志品质中称为

- A.意志力
- B.坚韧性
- C.果断性
- D.自制力
- E.自觉性

60、(A2型选择题)男,2岁。发热、流涕、咳嗽3天,今晨前额及耳后出现浅红色斑丘疹。球结膜充血,口腔黏膜粗糙,声音嘶哑,精神萎靡,两肺呼吸音粗。最可能的诊断是

- A.川崎病
- B.风疹
- C.麻疹
- D.幼儿急疹
- E.猩红热

61、（A2 型选择题）女，2 岁。生长发育迟缓及智力发育落后。查体：眼裂小、眼外眦上斜、眼距宽、外耳小、鼻梁低平，皮肤细腻。为明确诊断，首选的检查是

- A.尿三氯化铁试验
- B.尿蝶呤分析
- C.血 T3、T4、TSH
- D.染色体核型分析
- E.骨龄测定

62、（A2 型选择题）某新生儿出生 7 天，被确诊为化脓脑膜炎，下述最常见的致病菌

- A.肺炎球菌
- B.流感杆菌

C.脑膜炎奈瑟菌

D.金黄色葡萄球菌

E.B 族链球菌

63、（A2 型选择题）26 岁，初产妇。妊娠 38 周，规律宫缩 7 小时，血压 110/70mmHg，骨盆不小，预测胎儿体重为 2800g，枕左前位，胎心良，肛诊宫口开大 4cm。本例正确的处置应是

A.人工破膜

B.不需干涉产程进展

C.静脉患者 25%硫酸镁 16ml

D.静脉滴注宫缩素

E.静脉推注地西洋 10mg

64、（A2 型选择题）女，9 岁。眼睑水肿伴少尿、血尿 3 天，3 周前曾患皮肤脓疱。最主要的治疗是

A.脱水剂

B.糖皮质激素

C.环磷酰胺

D.硝苯地平

E.限盐

65、（A2 型选择题）女，42 岁。人工流产术后 2 年，阴道断续流血 6 个月余，近日出现咳血丝痰。血 β -hCG 为 13000U/L。胸部 X 线片示肺部多个结节。首选的治疗方法是

A.肺叶切除+子宫切除术

B.放射治疗

C.使用化疗药物甲氨蝶呤

D.肺叶切除术

E.子宫切除术

66、（A2 型选择题）男，18 岁。反复喘息发作 2 年，常在春季发病，表现为突然发作呼吸困难，每次发作 1~2 小时，经咳出白色黏痰后症状缓解。血象检查:嗜酸性粒细胞增多，IgE 增高。X 线胸片正常。应诊断为

A.急性左心衰竭

B.支气管哮喘

C.急性间质性肺炎

D.复发性多软骨炎

E.慢性支气管炎

67、（A2 型选择题）女，48 岁。反酸、烧心、上腹胀 4 年余。对明确诊断有帮助的是

- A. 消化道造影
- B. 心电图
- C. CT 检查
- D. 质子泵抑制剂试验治疗
- E. 幽门螺杆菌检测

68、（A2 型选择题）女，28 岁。在心理咨询中谈到所交的两个男朋友她都很喜欢，不知道该与哪个继续相处，难以作出抉择，希望得到帮助，而根据心理治疗的原则，心理咨询师没有替她作出决定。该咨询师遵循的原则是

- A. 灵活原则
- B. 综合原则
- C. 回避原则
- D. 耐心原则
- E. 中立原则

69、（A2 型选择题）女，30 岁。反复上腹痛 2 年，加重并呕吐宿食 2 周，伴有口渴少尿。最可能的电解质失衡种类是

A.低钾低氯性酸中毒

B.高钾低氯性碱中毒

C.低钾高氯性酸中毒

D.低钾低氯性碱中毒

E.低氯低镁性酸中毒

70、（A2 型选择题）男，56 岁。间断咳嗽、咳痰 3 年余，偶有痰中带血，经反复抗感染治疗效果欠佳。下肺纹理呈垂柳样改变。该患者最可能的诊断是

A.克雷伯杆菌肺炎

B.支气管扩张

C.肺结核

D.干酪性肺炎

E.支气管炎

71、（A2 型选择题）女，60 岁。因持续胸痛 6 小时入院。查体：双肺底有少量湿啰音，诊断为急性心肌梗死。该患者心功能分级为

A.NYHA 分级 I 级

B.NYHA 分级 II 级

C.NYHA 分级Ⅲ级

D.Killip 分级为Ⅰ级

E.Killip 分级为Ⅱ级

72、（A2 型选择题）女，62 岁。诊断为胃癌，血压 160/100mmHg，中度贫血，消瘦。术前，准备不必要的项目是

A.纠正贫血

B.改善营养状态

C.检测肝功能

D.血生化检测

E.血压降至正常

73、（A2 型选择题）男,75 岁。进行性吞咽困难 3 个月余，目前能进半流食。胃镜检查:食管距门齿 20cm 处发现一长约 6cm 菜花样肿物，病理报告为鳞状细胞癌。其最佳治疗施为

A.食管癌根治术

B.姑息食管癌切除术

C.放疗

D.胃造瘘术

E.化疗

74、（A2 型选择题）女,43 岁。患十二指肠球溃疡 20 年，近日又有疼痛发作，反酸。下列药物抑酸效果最好的是

A. 硫糖铝

B. 法莫替丁

C. 西咪替丁

D. 奥美拉唑

E. 复方氢氧化铝（胃舒平）

75、（A2 型选择题）男婴,9 天。因发热、拒奶 3 天，惊厥 2 次来诊。查体：反应差，中度黄染，脐部有脓性分泌物，前囟饱满。WBC $20\times 10^9/L$ ，N0.78，L0.22。最可能的病原体是

A. 流感嗜血杆菌

B. 新型隐球菌

C. 脑膜炎双球菌

D. 肺炎链球菌

E. 大肠埃希菌

76、（A2 型选择题）男，20 岁。心尖部隆隆样杂音，并于收缩晚期听见喀

喇音，提示病变瓣膜弹性良好的是

- A.心尖部杂音
- B.杂音的响度
- C.杂音的性质
- D.杂音持续的时间
- E.开瓣音

77、（A2 型选择题）女，30 岁。半小时前被自行车撞伤左胸，伤后疼痛，活动后加重，呼吸困难逐渐加重。查体：脉搏 110 次/分，气管向右移位，皮下气肿（+）。其诊断可能性最大的是

- A.闭合性气胸
- B.张力性气胸
- C.肋骨骨折病气胸
- D.肋骨骨折并张力性气胸
- E.肋骨骨折

78、（A2 型选择题）某人已被确诊为某病，而本人否认自己有病，此人角色行为的改变属于

- A.角色行为冲突

- B.角色行为减退
- C.角色行为强化
- D.角色行为异常
- E.角色行为缺如

79、（A2 型选择题）男，40 岁。右面部肿 10 天，多次挤压，今突发寒战高热，伴头晕，无抽搐。查体： $T40^{\circ}\text{C}$ ，R26 次/分，BP100/70mmHg，右面部肿，口唇无偏斜，胸壁及肢体皮下可见出血斑。血 WBC $20\times 10^9/\text{L}$ ，核左移。该患者目前的诊断是

- A.右腮腺脓肿
- B.脓毒症
- C.感染性休克
- D.颅内感染
- E.菌血症

80、（A2 型选择题）男，18 岁。在与同学争吵过程中突然晕倒，呼之不应，推之不动，四肢发硬僵卧于床，双目紧闭，眼睑颤动，同学急抬入病房。询问家属，患者既往有类似发作史。神经系统检查未见阳性体征。最可能的诊断是

- A.恐惧症

- B.焦虑症
- C.人格障碍
- D.分离性障碍
- E.抑郁症

81、（A2 型选择题）女，70 岁。急性肠梗阻术后 6 天，未进食但仍感腹胀，恶心未呕吐，有少量肛门排气。查体：腹部均匀隆起，腹软叩诊呈鼓音、无压痛和反跳痛，肠鸣音减弱。首先采取的重要处理措施是

- A.服用增强胃肠动力药物
- B.进流食
- C.高渗盐水灌肠
- D.查血生化并纠正水、电解质紊乱
- E.禁食水

82、（A2 型选择题）女，50 岁。上腹部不适，纳差 2 年。胃镜检查提示慢性萎缩性胃炎，黏膜病理检查提示慢性萎缩性胃炎，重度肠上皮化生。为防止癌变，最合适的随访检查方法是

- A.腹部 CT
- B.上消化道造影

C.腹部 B 超检查

D.血清肿瘤标志物

E.胃镜

83、（A2 型选择题）男，25 岁。近半年来脑子里总是反复考虑某些事情，知道没必要考虑，但是仍然没有办法控制。该患者应选用的药物是

A.阿米替林

B.丙咪嗪

C.氯米帕明

D.多塞平

E.氯丙咪嗪

84、（A2 型选择题）男，9 岁。未进早餐入校锻炼，半小时后四肢无力，平卧于地上，勉强翻身。血钾 5.6mmol/L。注射葡萄糖酸钙后症状消失缓解。一年中类似发作 5 次。可能的诊断是

A.高钾血症

B.周期性瘫痪

C.癌病性瘫痪

D.吉兰-巴雷综合征

E.低血糖

85、（A2 型选择题）男，2 岁。秋季发病。低热伴腹泻 2 天，为蛋花汤样便，10 次/天，无腥臭味。粪便常规偶见白细胞。最可能的病原体是

- A.冠状病毒
- B.肠道腺病毒
- C.柯萨奇病毒
- D.轮状病毒
- E.诺沃克病毒

86、（A2 型选择题）女，50 岁。发作劳力性胸痛 2 个月余，每次持续 5~10 分钟，休息 2~3 分钟可自行缓解。查体：BP140/90mmHg，心率 111 次/分，律齐。心电图示窦性心律。为控制心率，宜首选的药物是

- A.地高辛
- B.胺碘酮
- C.普罗帕酮
- D.美托洛尔
- E.维拉帕米

87、（A2 型选择题）初产妇，27 岁。妊娠 34 周，恶心、呕吐，腹胀，黄疸

轻度，乏力，诊断妊娠合并急性乙型病毒性肝炎。该患者的治疗应

- A. 无需特殊处理，等至顺产
- B. 立即剖宫产
- C. 立即隔离、保肝治疗
- D. 人工引产
- E. 严密监护下继续妊娠

88、（A2 型选择题）女，30 岁。2 周前发热、咳嗽、咳黄痰，经抗感染治疗后好转，现再次高热、咳嗽、胸闷。查体： $T39.5^{\circ}\text{C}$ ，P115 次/分，R24 次/分，气管右移，左侧语颤减弱，叩诊肺实音，呼吸音消失。血常规 $\text{WBC}23\times 10^9/\text{L}$ 。最有效的治疗措施是

- A. 胸腔内注入抗生素
- B. 胸腔成形术
- C. 胸膜剥脱术
- D. 静脉滴注广谱抗生素
- E. 胸腔闭式引流

89、（A2 型选择题）女，48 岁。胃大部切除术后 3 天出现阵发性腹痛、腹胀，无肛门排气，生命体征稳定。最可能的原因是

- A.吻合口炎
- B.腹腔内血肿形成
- C.手术后肠蠕动功能失调
- D.肠扭转
- E.肠系膜血管缺血性疾病

90、（A2 型选择题）女，52 岁。因局部脓肿发生休克。经补足血容量，纠正酸中毒，血压、脉搏仍未好转，但无心力衰竭现象，测中心静脉压为 15cmH₂O。其下一步治疗首选的是

- A.应用血管扩张剂
- B.应用血管收缩剂
- C.补充高渗盐溶液
- D.给予 5%碳酸氢钠溶液
- E.给予小剂量糖皮质激素

91、（B1 型选择题）胆总管远端单发 1.0cm 嵌顿结石目前,常用的术式是

- A.胆囊造瘘术
- B.奥狄（Oddi）括约肌切开成形术

C.肝内胆管空肠吻合术

D.T 管引流术

E.胆总管切开，胆总管空肠 Y 型吻合术

92、（B1 型选择题）胆总管泥沙样结石伴远端狭窄宜选择的术式是

A.胆囊造瘘术

B.奥狄（Oddi）括约肌切开成形术

C.肝内胆管空肠吻合术

D.T 管引流术

E.胆总管切开，胆总管空肠 Y 型吻合术

93、（B1 型选择题）诊断反流性食管炎最可靠的辅助检查是

A.食管酸滴注试验

B.24 小时食管 pH 监测

C.胃镜及活检

D.胸部 X 线片

E.食管压力测定

94、（B1 型选择题）诊断胃食管酸反流最适用的辅助检查是

A.食管酸滴注试验

B.24 小时食管 pH 监测

C.胃镜及活检

D.胸部 X 线片

E.食管压力测定

95、（B1 型选择题）夜间阵发性呼吸困难，高枕卧位，颈静脉怒张，双肺底可闻及干、湿啰音，肝大，下肢水肿，诊断考虑是

A.急性右心衰竭

B.慢性右心衰竭

C.急性左心衰竭

D.慢性左心衰竭

E.全心衰竭

96、（B1 型选择题）呼吸困难，咳粉红色泡沫样痰，双肺满布干、湿啰音，双下肢无水肿，诊断宜首先考虑

A.急性右心衰竭

B.慢性右心衰竭

C.急性左心衰竭

D.慢性左心衰竭

E.全心衰竭

97、（B1 型选择题）胎盘未剥离时过早挤揉子宫可造成

A.胎盘植入

B.胎盘剥离不全

C.胎盘粘连

D.胎盘嵌顿

E.胎盘滞留

98、（B1 型选择题）第三产程中，子宫不协调性收缩可造成

A.胎盘植入

B.胎盘剥离不全

C.胎盘粘连

D.胎盘嵌顿

E.胎盘滞留

99、（B1 型选择题）胎盘与宫壁界限不清为

- A.胎盘植入
- B.胎盘剥离不全
- C.胎盘粘连
- D.胎盘嵌顿
- E.胎盘滞留

100、（B1 型选择题）合并糖尿病的高血压患者，血清肌酐正常，降压治疗宜首选的药物是

- A. α 受体阻断剂
- B. 噻嗪类利尿剂
- C. β 受体阻断剂
- D. 二氢吡啶类钙通道阻滞剂
- E. 血管紧张素转换酶抑制剂

101、（B1 型选择题）合并低钾血症的高血压患者降压不宜使用的药物是

- A. α 受体阻断剂
- B. 噻嗪类利尿剂
- C. β 受体阻断剂

D.二氢吡啶类钙通道阻滞剂

E.血管紧张素转换酶抑制剂

102、（B1 型选择题）80%的小儿动脉导管解剖上关闭的时

A.生后 1~2 岁

B.生后 3 个月内

C.生后 3~4 个月

D.生后 5~7 个月

E.生后 8~10 个月

103、（B1 型选择题）小儿卵圆孔解剖上关闭的时间是

A.生后 1~2 岁

B.生后 3 个月内

C.生后 3~4 个月

D.生后 5~7 个月

E.生后 8~10 个月

104、（B1 型选择题）可采用维生素治疗的贫血是

A.巨幼红细胞性贫血

- B.溶血性贫血
- C.再生障碍性贫血
- D.缺铁性贫血
- E.甲状腺功能减退所致贫血

105、（B1 型选择题）可采用雄激素治疗的贫血是

- A.巨幼红细胞性贫血
- B.溶血性贫血
- C.再生障碍性贫血
- D.缺铁性贫血
- E.甲状腺功能减退所致贫血

106、（B1 型选择题）帕金森病的典型步态是

- A.醉汉步态
- B.慌张步态
- C.剪刀样步态
- D.跨阈步态
- E.共济失调步态

107、（B1 型选择题）痉挛性截瘫的典型步态是

- A.醉汉步态
- B.慌张步态
- C.剪刀样步态
- D.跨阈步态
- E.共济失调步态

108、（B1 型选择题）小脑病变出现的步态是

- A.醉汉步态
- B.慌张步态
- C.剪刀样步态
- D.跨阈步态
- E.共济失调步态

109、（B1 型选择题）男，36 岁。车祸致胸腹复合伤 4 天，呕血 1 天，共 3 次，每次约 50~100mL，呕血前无不适症状。既往无腹痛史。呕血的原因是

- A.急性胃黏膜病变出血
- B.食管胃底静脉曲张破裂

- C.胃癌出血
- D.十二指肠溃疡出血
- E.胃溃疡出血

110、（B1 型选择题）女，32 岁。大量呕血 1 天，伴恶心，之后出现黑便。既往有饥饿性上腹痛，伴烧心、反酸，进食后可缓解。最可能的诊断是

- A.急性胃黏膜病变出血
- B.食管胃底静脉曲张破裂
- C.胃癌出血
- D.十二指肠溃疡出血
- E.胃溃疡出血

111、（B1 型选择题）克罗恩病的好发部位是

- A.十二指肠多见
- B.从直肠向近端结肠呈倒灌性分布
- C.空肠多见
- D.回盲部多见
- E.全消化道均可发生，呈节段性跳跃性分布

112、（B1 型选择题）肠结核的好发部位是

- A.十二指肠多见
- B.从直肠向近端结肠呈倒灌性分布
- C.空肠多见
- D.回盲部多见
- E.全消化道均可发生，呈节段性跳跃性分布

113、（B1 型选择题）上述病原体中，血浆凝固酶（+）的是

- A.肺炎克雷伯杆菌
- B.流感嗜血杆菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.铜绿假单胞菌
- E.大肠埃希菌

114、（B1 型选择题）上述病原体中，最常见于社区获得性肺炎的是

- A.肺炎克雷伯杆菌
- B.流感嗜血杆菌
- C.金黄色葡萄球菌

D.铜绿假单胞菌

E.大肠埃希菌

115、（B1 型选择题）阴囊包块，透光试验阴性，平卧后消失，多见于

A.睾丸鞘膜积液

B.交通性鞘膜积液

C.腹股沟斜疝

D.睾丸肿瘤

E.精索鞘膜积液

116、（B1 型选择题）阴囊包块，透光试验阳性，平卧后消失，多见于

A.睾丸鞘膜积液

B.交通性鞘膜积液

C.腹股沟斜疝

D.睾丸肿瘤

E.精索鞘膜积液

117、（B1 型选择题）常致反射性心动过速的药物是

A.甲氨蝶呤

B.硝苯地平

C.卡托普利

D.氢氯噻嗪

E.美托洛尔

118、（B1 型选择题）可引起心动过缓的降压药是

A.甲氨蝶呤

B.硝苯地平

C.卡托普利

D.氢氯噻嗪

E.美托洛尔

119、（B1 型选择题）可引起低血钾的药物是

A.甲氨蝶呤

B.硝苯地平

C.卡托普利

D.氢氯噻嗪

E.美托洛尔

120、（B1 型选择题）常见的副反应干咳药物是

- A.甲氨蝶呤
- B.硝苯地平
- C.卡托普利
- D.氢氯噻嗪
- E.美托洛尔

121、（A3/A4 型选择题）男，23 岁。发热伴下肢和腹部皮肤瘀斑 5 天。查体：双下肢和腹部皮肤有多处瘀斑，双侧颈部、腋窝和腹股沟可触及淋巴结肿大，活动无压痛，最大者为 2cm×2.5cm，胸骨压痛（+），腹软，肝肋下 1.5cm，脾肋下 2cm。实验室检查：Hb78g/L，WBC18×10⁹/L，分类可见原始和幼稚细胞，PLT25×10⁹/L，网织红细胞 0.002。该患者最可能的诊断是

- A.急性粒细胞白血病
- B.霍奇金淋巴瘤
- C.急性淋巴细胞白血病
- D.非霍奇金淋巴瘤
- E.系统性红斑狼疮

122、（A3/A4 型选择题）男，23 岁。发热伴下肢和腹部皮肤瘀斑 5 天。查

体:双下肢和腹部皮肤有多处瘀斑, 双侧颈部、腋窝和腹股沟可触及淋巴结肿大, 活动无压痛, 最大者为 2cm×2.5cm,胸骨压痛 (+), 腹软, 肝肋下 1.5cm, 脾肋下 2cm。实验室检查:Hb78g/L, WBC18×10⁹/L, 分类可见原始和幼稚细胞,PLT25×10⁹/L,网织红细胞 0.002。为明确诊断, 首选的检查是

- A.ANA 谱
- B.淋巴结活检
- C.骨髓细胞学检查
- D.腹部 B 超
- E.骨髓活检

123、(A3/A4 型选择题) 男, 23 岁。发热伴下肢和腹部皮肤瘀斑 5 天。查体:双下肢和腹部皮肤有多处瘀斑, 双侧颈部、腋窝和腹股沟可触及淋巴结肿大, 活动无压痛, 最大者为 2cm×2.5cm,胸骨压痛 (+), 腹软, 肝肋下 1.5cm, 脾肋下 2cm。实验室检查:Hb78g/L, WBC18×10⁹/L, 分类可见原始和幼稚细胞,PLT25×10⁹/L,网织红细胞 0.002。明确诊断后, 首选的治疗措施是

- A.ABVD 方案化疗
- B.CHOP 方案化疗
- C.VDLP 方案化疗
- D.DA 方案化疗

E.给予大剂量糖皮质激素

124、（A3/A4 型选择题）男，5 个月。二胎之小，单纯母乳喂养，面色苍白，食欲减退 2 个月。查体：肤色苍白，肝肋下 3.5cm，脾肋下 1.5cm，血 Hb80g/L,RBC $3.3 \times 10^{12}/L$,MCV60fl, MCH24pg, MCHC25%, PLT、WBC 正常。最可能的诊断是

A.再生障碍性贫血

B.营养性巨幼细胞贫血

C.感染性贫血

D.缺铁性贫血

E.混合性贫血

125、（A3/A4 型选择题）男，5 个月。二胎之小，单纯母乳喂养，面色苍白，食欲减退 2 个月。查体：肤色苍白，肝肋下 3.5cm，脾肋下 1.5cm，血 Hb80g/L,RBC $3.3 \times 10^{12}/L$,MCV60fl, MCH24pg, MCHC25%, PLT、WBC 正常。经有效治疗后，首先出现的变化是

A.血红蛋白上升

B.红细胞上升

C.网织红细胞上升

D.红细胞游离原卟啉上升

E.细胞内含铁酶活性开始恢复

126、（A3/A4 型选择题）男，5 个月。双胎之小，单纯母乳喂养，面色苍白，食欲减退 2 个月。查体：肤色苍白，肝肋下 3.5cm，脾肋下 1.5cm，血 Hb80g/L,RBC $3.3 \times 10^{12}/L$,MCV60fl, MCH24pg, MCHC25%, PLT、WBC 正常。若 Hb 恢复正常，还需要继续药物治疗的时间是

A.3~4 周

B.1~2 周

C.6~8 周

D.8~10 周

E.10~12 周

127、（A3/A4 型选择题）女，60 岁。头痛、呕吐 3 天,4 个月前有头部摔伤史。头颅 CT 示右颞部新月形中等密度。最有助于进一步明确诊断的检查是

A.CT 增强扫描

B.MRI 检查

C.脑电图

D.脑血管造影

E.脑脊液检查

128、（A3/A4 型选择题）女，60 岁。头痛、呕吐 3 天,4 个月前有头部摔伤史。头颅 CT 示右颞部新月形中等密度。该患者最可能的诊断是

- A.脑挫伤
- B.脑肿瘤
- C.慢性硬膜下血肿
- D.脑转移瘤
- E.慢性硬膜外血肿

129、（A3/A4 型选择题）女，60 岁。头痛、呕吐 3 天,4 个月前有头部摔伤史。头颅 CT 示右颞部新月形中等密度。该患者治疗首选的是

- A.对症支持治疗
- B.脱水利尿药降低颅压
- C.手术切除治疗
- D.钻孔引流术
- E.镇静止痛药治疗

130、（A3/A4 型选择题）男，24 岁。3 个月前因工作失误受到领导批评，觉得脸上无光，觉得同事看不起她，在背后议论她，不愿意出门，耳边常有命令性幻听。查体:躯体及神经系统无阳性体征。该患者的诊断最可能是

- A.精神分裂症
- B.抑郁症
- C.脑肿瘤所致精神障碍
- D.内分泌疾病所致精神障碍
- E.偏执性精神障碍

131、（A3/A4 型选择题）男，24 岁。3 个月前因工作失误受到领导批评，觉得脸上无光，觉得同事看不起她，在背后议论她，不愿意出门，耳边常有命令性幻听。查体：躯体及神经系统无阳性体征。改善目前较合理的治疗药物是

- A.丙咪嗪
- B.氯硝西泮
- C.碳酸锂
- D.氯丙咪嗪
- E.氯丙嗪

132、（A3/A4 型选择题）男，24 岁。3 个月前因工作失误受到领导批评，觉得脸上无光，觉得同事看不起她，在背后议论她，不愿意出门，耳边常有命令性幻听。查体：躯体及神经系统无阳性体征。经药物治疗仍然极度兴奋则进一步选择治疗方案为

A.加大药物剂量

B.心理治疗

C.针灸治疗

D.中药治疗

E.改良电抽搐治疗

133、（A3/A4 型选择题）女，30 岁。心悸、无力、手颤抖 3 个月，大便每日 2~3 次,不成形，体重下降 5kg，1 周前诊断为甲状腺功能亢进症（甲亢），尚未治疗。昨晚饮白酒半斤，呕吐一次，晨起醒来发现双下肢不能活动。为明确下肢不能活动的原因，首先应测定的是

A.血钠

B.血镁

C.血钾

D.血糖

E.血钙

134、（A3/A4 型选择题）女，30 岁。心悸、无力、手颤抖 3 个月，大便每日 2~3 次,不成形，体重下降 5kg，1 周前诊断为甲状腺功能亢进症（甲亢），尚未治疗。昨晚饮白酒半斤，呕吐一次，晨起醒来发现双下肢不能活动。下肢不能活动的紧急处理是

A.口服大剂量 β 受体阻断剂

B.注射 B 族维生素

C.口服丙硫氧嘧啶

D.静脉补钾

E.静脉滴注氢化可的松

135、（A3/A4 型选择题）男，9 岁。3 周前曾患脓疱病，水肿，少尿、肉眼血尿 3 天。BP150/105mmHg。尿常规:蛋白（+），大量红细胞，管型 1~2/HP。ASO 升高，血沉增快，血补体 C3 下降。首选的降压药是

A.哌唑嗪

B.二氮嗪

C.硝苯地平

D.卡托普利

E.硝普钠

136、（A3/A4 型选择题）男，9 岁。3 周前曾患脓疱病，水肿，少尿、肉眼血尿 3 天。BP150/105mmHg。尿常规:蛋白（+），大量红细胞，管型 1~2/HP。ASO 升高，血沉增快，血补体 C3 下降。应限制钠盐摄入直到

A.血沉正常

B.尿常规正常

C.肉眼血尿消失

D.补体恢复正常

E.水肿消退，血压正常

137、（A3/A4 型选择题）男，9 岁。3 周前曾患脓疱病，水肿，少尿、肉眼血尿 3 天。BP150/105mmHg。尿常规:蛋白（+），大量红细胞，管型 1~2/HP。ASO 升高，血沉增快，血补体 C3 下降。血补体 C3 恢复正常的时间多为起病后

A.12~24 周

B.8~12 周

C.4~8 周

D.2~4 周

E.1~2 周

138、（A3/A4 型选择题）女,72 岁。摔伤右髌部。既往全身情况良好。查体:右下肢缩短，外旋畸形，下肢轴向叩击痛阳性。最可能的诊断是

A.髌关节后脱位

B.股骨颈骨折

C.髌部软组织损伤

D.股骨干骨折

E.腕关节前脱位

139、（A3/A4 型选择题）女,72 岁。摔伤右髌部。既往全身情况良好。查体:右下肢缩短, 外旋畸形, 下肢轴向叩击痛阳性。首选的检查方法是

A.CT

B.核素扫描

C.关节造影

D.MRI

E.X 线片

140、（A3/A4 型选择题）女,72 岁。摔伤右髌部。既往全身情况良好。查体:右下肢缩短, 外旋畸形, 下肢轴向叩击痛阳性。最佳治疗方法是

A.持续皮牵引

B.人工髌关节置换术

C.股骨近端截骨术

D.持续骨牵引

E.髌人字石膏固定

141、（A3/A4 型选择题）女，32 岁。发热、咳黄痰 10 天，水肿伴恶心、呕吐、呼吸困难 1 周，1 天前突发抽搐、昏迷。既往 IgA 肾病 5 年。查体：BP180/110mmHg，贫血貌，深大呼吸双中下肺野闻及湿啰音，心率 120 次/分，双下肢水肿。Hb68g/L，SCr1325 μ mol/L。患者意识障碍最可能的原因是

- A.高血压脑病
- B.低钙血症
- C.脑血管病
- D.贫血
- E.尿毒症脑病

142、（A3/A4 型选择题）女，32 岁。发热、咳黄痰 10 天，水肿伴恶心、呕吐、呼吸困难 1 周，1 天前突发抽搐、昏迷。既往 IgA 肾病 5 年。查体：BP180/110mmHg，贫血貌，深大呼吸双中下肺野闻及湿啰音，心率 120 次/分，双下肢水肿。Hb68g/L，SCr1325 μ mol/L。当前最有效的治疗措施是

- A.抗感染
- B.大剂量利尿剂
- C.输血
- D.降压
- E.血液透析

143、（A3/A4 型选择题）女，65 岁。常规体检发现脾左肋下 5cm。实验室检查 Hb135g/L,WBC117×10⁹/L，分类中幼粒细胞 5%，晚幼粒细胞 12%，杆状核细胞 22%，分叶中性粒细胞 34%，嗜酸性粒细胞 8%，嗜碱性粒细胞 5%，淋巴细胞 14%。PLT560×10⁹/L，NAP（-）。为确定诊断，首选的检查是

A.腹部 CT

B.腹部 B 超

C.肝功能

D.骨髓检查

E.血免疫球蛋白

144、（A3/A4 型选择题）女，65 岁。常规体检发现脾左肋下 5cm。实验室检查 Hb135g/L,WBC117×10⁹/L，分类中幼粒细胞 5%，晚幼粒细胞 12%，杆状核细胞 22%，分叶中性粒细胞 34%，嗜酸性粒细胞 8%，嗜碱性粒细胞 5%，淋巴细胞 14%。PLT560×10⁹/L，NAP（-）。应进一步采取的检查是

A.骨髓干细胞培养

B.骨髓活检

C.食管造影

D.同位素扫描

E.染色体核型

145、（A3/A4 型选择题）女，65 岁。常规体检发现脾左肋下 5cm。实验室检查 Hb135g/L,WBC117×10⁹/L，分类中幼粒细胞 5%，晚幼粒细胞 12%，杆状核细胞 22%，分叶中性粒细胞 34%，嗜酸性粒细胞 8%，嗜碱性粒细胞 5%，淋巴细胞 14%。PLT560×10⁹/L，NAP（-）。最有效的治疗是

- A.羟基脲
- B.伊马替尼
- C.阿糖胞苷
- D.糖皮质激素
- E.脾切除

146、（A3/A4 型选择题）女，18 岁。疲乏无力，心烦易怒，怕热多汗半年，易饿，体重下降 11kg，月经量减少，经期仅 1~2 天。查体:BP140/70mmHg，皮肤微潮，手有细颤，轻微突眼，甲状腺一度弥漫性肿大，质软、无触痛。该患者最可能的诊断是

- A.Graves 病
- B.亚急性甲状腺炎
- C.单纯性甲状腺肿
- D.自主神经功能紊乱
- E.糖尿病

147、（A3/A4 型选择题）女，18 岁。疲乏无力，心烦易怒，怕热多汗半年，易饿，体重下降 11kg，月经量减少，经期仅 1~2 天。查体：BP140/70mmHg，皮肤微潮，手有细颤，轻微突眼，甲状腺一度弥漫性肿大，质软、无触痛。明确诊断的主要检查是

- A. 甲状腺放射性核素扫描
- B. 垂体功能测定
- C. 口服葡萄糖耐量试验
- D. 血甲状腺素水平测定
- E. 甲状腺摄 ^{131}I 率

148、（A3/A4 型选择题）女，18 岁。疲乏无力，心烦易怒，怕热多汗半年，易饿，体重下降 11kg，月经量减少，经期仅 1~2 天。查体：BP140/70mmHg，皮肤微潮，手有细颤，轻微突眼，甲状腺一度弥漫性肿大，质软、无触痛。最可能的检查结果是

- A. 甲状腺摄 ^{131}I 降低
- B. TSH 升高
- C. FT3 及 FT4 升高
- D. 继发性垂体功能降低
- E. 血糖升高

149、（A3/A4 型选择题）女，59 岁。外出途中突然头痛、眩晕，伴呕吐、走路不稳前来急诊。查体：BP180/105mmHg，心率 62 次/分，双眼向右水平眼震，右手指鼻不准，右侧跟膝胫试验阳性。最可能的诊断是

- A.右大脑梗死
- B.脑桥出血
- C.基底核区出血
- D.右枕叶出血
- E.右小脑半球出血

150、（A3/A4 型选择题）女，59 岁。外出途中突然头痛、眩晕，伴呕吐、走路不稳前来急诊。查体：BP180/105mmHg，心率 62 次/分，双眼向右水平眼震，右手指鼻不准，右侧跟膝胫试验阳性。首先应采取的处理措施是

- A.快速静脉滴注地塞米松 10mg
- B.降低颅内压
- C.利血平降血压
- D.肌内注射苯巴比妥钠预防癫痫
- E.若 CT 示出血量达 5ml 时，手术治疗

答案

1、正确答案：D

答案解析：解析：微血栓常出现在 DIC 时，强调的是血栓出现于微循环，又称纤维素性血栓。纤维素性血栓是指血栓是由纤维素构成的。

2、正确答案：D

答案解析：

3、正确答案：E

答案解析：排除法当然选 E

4、正确答案：E

答案解析：

5、正确答案：C

答案解析：解析:肽键维系蛋白质一级结构,蛋白质二级结构主要由氢键维系,三级结构主要是靠氨基酸侧链之间的疏水相互作用,氢键,范德华力和静电作用维持的。

6、正确答案：E

答案解析：解析：伤寒杆菌由口进入消化道，侵犯小肠粘膜的淋巴组织，在淋巴结内繁殖增多，再进入血液引起发烧、困倦、头痛、全身不适及恶心、呕吐、腹泻等症状，此时称菌血症期，如做血培养，可见伤寒杆菌生长。细菌随血流带到各个脏器，但主要病变在肠道。

7、正确答案：D

答案解析：记忆题

8、正确答案：B

答案解析：；解析：颅咽管瘤因瘤体增大压迫下丘脑和垂体柄引起闭经。空蝶鞍综合征属于垂体性闭经；。

9、正确答案：E

答案解析：解析：骨科诊断学上，骨折的特有的体征有三个：1、畸形；2、异常活动；3、骨擦音或者骨擦感。

10、正确答案：B

答案解析：解析：壁细胞分泌盐酸，G细胞分泌胃泌素，嗜银细胞分泌生长抑素，主细胞分泌蛋白酶原，黏液细胞分泌黏液。

11、正确答案：D

答案解析：解析：卵巢纤维瘤患者出现胸腔积液或腹腔积液，称为梅格斯(Meigs)综合征。答案为D。Meniere综合征是指内耳迷路病变导致的眩晕、耳

鸣、耳聋等症状。Down 综合征又称先天愚型、21-三体综合征，是小儿最常见的由常染色体畸变所致的先天性疾病。Cushing 综合征为各种病因造成肾上腺分泌过多糖皮质激素所致疾病的总称。类癌综合征是胃肠道类癌引起的以发作性皮肤潮红和腹泻为主要临床表现的综合征。

12、正确答案：D

答案解析：解析：仰卧位时，血不容易引流，易堵塞气管造成窒息。

13、正确答案：C

答案解析：ABO 血型抗体有"天然抗体"与"免疫性抗体"之分。所谓"天然抗体"是指没有可察觉的免疫刺激，而"天然"存在于人体内血清中。这些刺激源，如细菌等，广泛分布于自然环境。"天然抗体"多趋向于 IgM，而"免疫性抗体"则常是 IgG。

14、正确答案：D

答案解析：【解析】肾脏在胎儿期合成较多的激素为促红细胞生成素。

15、正确答案：E

答案解析：解析：右主支气管较左主支气管陡直，粗大，吸入物易进入右肺。

16、正确答案：B

答案解析：解析：苯丙酮尿症属于苯丙氨酸代谢障碍的常染色体隐性遗传

疾病。

17、正确答案：E

答案解析：解析：记忆题,考查急性炎症。

18、正确答案：C

答案解析：

19、正确答案：D

答案解析：解析：妇女无症状性菌尿不予治疗，但妊娠妇女的无症状细菌尿必须治疗，因治疗对于保护母亲和胎儿均有好处。

20、正确答案：C

答案解析：解析:肺炎链球菌肺炎即大叶性肺炎常呈铁锈色样痰。

21、正确答案：A

答案解析：解析:边缘性前置胎盘可通过阴道分娩予以试产。

22、正确答案：D

答案解析：解析：多数学者公认的必需的微量元素有 14 种，它们分别是铁、铜、锌、钴、锰、铬、钼、镍、钒、锡、硅、硒、碘、氟。锌、铜、铁、钙四种是与少儿生长发育息息相关且常缺乏的元素。

23、正确答案：B

答案解析：解析： PaCO_2 增高说明呼气受阻加重， CO_2 淤滞，表示症状加重。

24、正确答案：D

答案解析：解析：癫痫大发作首选苯妥英钠或苯巴比妥，癫痫小发作首选乙琥胺，癫痫大发作和部分局限发作首选苯妥英钠。地西洋是治疗癫痫持续状态的首选药物，显效快，且较其他药物安全。故本题答案为D。

25、正确答案：A

答案解析：

26、正确答案：E

答案解析：记忆题

27、正确答案：A

答案解析：【解析】记忆题，考查高压蒸汽灭菌法。；

28、正确答案：C

答案解析：解析：记忆题，这句话是孙思邈说的，他的主要贡献在于他的著作《千金方》。他在《千金方》的自序中明确指出，“人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此，故以为名也”。孙思邈认为，作为一个医生首先要具备良好的品质。

29、正确答案：C

答案解析：

30、正确答案：C

答案解析：；解析：心脏骤停是指心脏射血功能的突然停止。绝大多数心脏形猝死发生在有器质性心脏病的患者，在西方国家，酒精引起的心脑血管病、高血压、冠心病等有较高的高发病率，而有80%的心脏猝死是由以上因素导致的，其中冠心病患者中约有75%均有不同程度的心肌梗死病史。

31、正确答案：C

答案解析：【解析】：左心室扩大时心尖搏动向左下移位，右心室扩大时心尖搏动向左侧移位。

32、正确答案：E

答案解析：

33、正确答案：A

答案解析：记忆题

34、正确答案：E

答案解析：解析：新生儿接种卡介苗的时间为出生后第一天，只要没有禁忌症。

35、正确答案：E

答案解析：【解析】：幽门前静脉，位于幽门与十二指肠交界处前面上行进入门静脉，幽门前静脉是辨认幽门的标志，也是区分胃幽门与十二指肠的解剖标志。

36、正确答案：D

答案解析：解析：术后 24 小时以内发热，常常由于代谢性或内分泌异常、低血压、肺不张、输血所致。术后 3~6 天发热，需要警惕感染的可能，如静脉导管相关性感染、留置导尿管并发感染、手术切口或肺部感染等。故选 D。

37、正确答案：D

答案解析：解析：Barrett 食管是食管远端粘膜的鳞状上皮被化生的腺上皮所替代。这种化生的腺上皮可呈异形增生进而可形成腺癌。癌变率可达 10%。一般认为 Barrett 食管发生腺癌的危险性与其病灶的大小有关，2cm 以上的 Barrett 粘膜癌变的发生率较对照人群高 30~40 倍。需定期复查。

38、正确答案：E

答案解析：小肠结肠炎及肠穿孔是先天性巨结肠的常见并发症,亦是引起死亡最多见的原因。

39、正确答案：E

答案解析：【解析】弥漫性硬化性肾小球肾炎的肉眼病变：双侧肾脏对称性缩小，重量减轻，色苍白，质硬。表面呈弥漫性细颗粒状。切面皮质变薄，皮髓分界不清。颗粒性固缩肾。

40、正确答案：A

答案解析：【解析】切开复位的最大优点是可使手法复位不能复位的骨折达到解剖复位。

41、正确答案：C

答案解析：【解析】：胰头癌患者年龄一般较大，多在50岁以上。发病隐晦，往往先出现黄疸而后方伴有腹痛(以往无相似的腹痛黄疸史)。黄疸属进行性，可发展至甚深程度而无波动表现。而胆总管结石多有右上腹绞痛，胆道完全阻塞时，黄疸持续不见消退，但不呈进行性加重，颜色甚深呈黄绿色，皮肤瘙痒显著，粪便呈陶土色。

42、正确答案：E

答案解析：；解析：AFP检查诊断肝细胞肝癌的标准为：1.AFP $>500\mu\text{g}/\text{L}$ ，持续4周。2.AFP由低浓度逐渐升高不降。3.AFP在 $200\mu\text{g}/\text{L}$ ，以上的中等水平持续8周。

43、正确答案：D

答案解析：解析：非溶血性弧菌是一种海洋细菌，主要来源于鱼、虾、蟹、贝类和海藻等海产品。此菌对酸敏感，在普通食醋中5分钟即可杀死；对热的抵抗力也较弱。

44、正确答案：C

答案解析：记忆题

45、正确答案：B

答案解析：解析：肾挫伤非常重要的临床表现为血尿，所以首要的检查是尿常规检查。

46、正确答案：E

答案解析：解析：肾病综合征主要原因是肾小球毛细血管壁通透性增强,大量的白蛋白从尿中丢失。

47、正确答案：B

答案解析：解析：重症肺炎常发生中毒性肠麻痹，出现明显腹胀，以致膈肌升高进一步加重呼吸困难。胃肠道出血可吐出咖啡样物、便血或柏油样便。

48、正确答案：C

答案解析：解析：气道、肺实质及肺血管的慢性炎症是 COPD 的特征性改变，中性粒细胞、巨噬细胞、T 淋巴细胞等炎症细胞均参与了 COPD 发病过程。中性粒细胞的活化和聚集是 COPD 炎症过程的一个重要环节，通过释放中性粒细胞弹性蛋白酶、中性粒细胞组织蛋白酶 G、中性粒细胞蛋白酶 3 和基质金属蛋白酶引起慢性黏液高分泌状态并破坏肺实质。

49、正确答案：C

答案解析：【解析】：排卵后卵巢内形成黄体，黄体分泌孕激素。孕激素对中枢神经系统有致热升温作用，使基础体温升高 0.3~0.5℃，体温的升高一直播笔记（直播习题）奋斗没有终点，任何时候都是一个起点

直持续到月经来潮前 1~2 天开始下降。这样在一个有排卵的月经周期中基础体温的变化呈现双相型的曲线。

50、正确答案：C

答案解析：

51、正确答案：E

答案解析：解析：膜性肾病为中老年发生的肾病综合征，由于血液浓缩(有效血容量减少)及高脂血症造成血液粘稠度增加，引起机体凝血和纤溶失衡加之血小板功能亢进应用利尿剂和糖皮质激素等均进一步加重高凝状态。膜性肾病极易发生血栓栓塞并发症，肾静脉血栓发生率可高达 40%~50%。

52、正确答案：B

答案解析：【解析】蜘蛛痣出现的部位主要在上腔静脉分布区域，以颜面、颈部及上胸部最为多见。

53、正确答案：D

答案解析：解析：腹水：(1)是肝硬化晚期最突出的临床表现。(2)腹水出现以前，常发生肠内胀气，有腹水后腹壁紧张度增加，患者直立时下腹部饱满，仰卧时则腹部两侧膨隆呈蛙腹状。(3)大量腹水使腹压增高时，脐受压而突出形成脐疝。(4)叩诊有移动性浊音，大量腹水可有液波震颤。(5)大量腹水使横膈抬高和运动受限，可发生呼吸困难和心悸。(6)腹水压迫下腔静脉可引起肾瘀血和下肢水肿。(7)部分患者因大量腹水使腹压增高，腹水通过膈肌变薄的孔道和

胸膜淋巴管漏入胸腔，可产生胸水。振水音：(1)在胃内有多量液体及气体存留时可出现振水音。(2)检查时患者仰卧，医生以一耳凑近上腹部，同时以冲击触诊法振动胃部，即可听到气、液撞击的声音，亦可将听诊器鼓型体件置于上腹部进行听诊。(3)正常人在餐后或饮进多量液体时可有上腹部振水音，但若在清晨空腹或餐后 6~8h 以上仍有此音，则提示幽门梗阻或胃扩张。

54、正确答案：D

答案解析：解析：肾病综合征的低蛋白和高脂促进躯体高凝状态易导致各种动静脉血栓形成，以肾静脉血栓形成常见，表现为突发腰痛，出现血尿或血尿加重，少尿甚至肾衰竭。

55、正确答案：D

答案解析：【解析】：骑跨伤，尿道出血，不能自行排尿，首先考虑尿道球部损伤。

56、正确答案：C

答案解析：解析：患者，18岁，子宫左侧肿物，AFP 高于正常，考虑为卵巢内胚窦瘤。

57、正确答案：C

答案解析：解析：静脉血栓形成是静脉的一种急性非化脓性炎症，并伴有继发性血管腔内血栓形成的疾病。病变主要累及四肢浅表静脉或下肢深静脉。其临床特点为患肢局部肿痛、皮下可扪及有压痛的条索状物或伴有病变远

端浅表静脉曲张等静脉回流受阻现象。

58、正确答案：E

答案解析：

59、正确答案：E

答案解析：解析：学生态度积极，主动向老师请教，积极为患者服务，并能结合临床案例查阅相关的文献，简单分析便可知应选择 E。

60、正确答案：C

答案解析：【解析】：麻疹是儿童最常见的急性病毒传染病之一，传染性强，呼吸道飞沫为主要传播途径。以皮肤出现红色斑丘疹和颊粘膜上有麻疹粘膜斑及全身斑丘疹，伴随发热、上呼吸道炎症、眼结膜炎等并发症为特征。

61、正确答案：D

答案解析：解析：根据临床表现诊断为 21-三体综合征又称先天愚型或 Down 综合症，因此为明确诊断，选 D

62、正确答案：C

答案解析：【解析】脑膜炎奈瑟菌简称为脑膜炎球菌，是流行性脑脊髓膜炎（简称流脑）的病原菌。

63、正确答案：B

答案解析：解析：胎儿不大，未超过 3000g，骨盆正常且规律宫缩，7 小时宫口开大超过 3cm 属正常，正常情况下，4~8 小时宫口开到 3cm 以上，胎心良说明无窘迫，故可不干涉产程进展。

64、正确答案：E

答案解析：解析：根据患者的临床表现，可以诊断为肾小球肾炎，为自限性疾病，主要是对症治疗和一般治疗。一般治疗强调卧床休息；患者少尿，应采用利尿剂和限盐。

65、正确答案：C

答案解析：【解析】：本例诊断绒癌，首选化疗。

66、正确答案：B

答案解析：

67、正确答案：D

答案解析：【解析】：对有典型症状而内镜检查阴性者，可用质子泵抑制剂做试验性治疗，如疗效明显，一般可考虑诊断胃反流食管病。

68、正确答案：E

答案解析：【解析】：心理治疗师的客观中立工作原则是指有存在即合理，心理治疗师必须在治疗过程中保持客观中立的态度，不对咨询者的选择进行任何干预。

69、正确答案：D

答案解析：【解析】患者严重呕吐，胃液丧失过多，导致大量 H^+ 、 Cl^- 丢失， K^+ 也由此丧失，故易致低钾低氯性碱中毒。

70、正确答案：C

答案解析：【解析】：患者的主要表现为咳嗽、咳痰、咯血、消瘦。胸部 X 线下肺纹理呈垂柳样改变符合慢性纤维空洞型肺结核表现，故选 C。

71、正确答案：E

答案解析：【解析】：肺部啰音急性心肌梗死引起的心力衰竭称为"泵衰竭"，采用 Killip 分级法：Ⅰ级：尚无明显的心力衰竭；Ⅱ级：有左心衰竭，肺部啰音 $< 50\%$ 肺野；Ⅲ级：肺部有啰音，且啰音的范围大于 $1/2$ 肺野(急性肺水肿)；Ⅳ级：心源性休克，有不同阶段和程度的血流动力学变化。

72、正确答案：E

答案解析：【解析】：血压在 $160/100\text{mmHg}$ 以下可不必做特殊准备，血压过高者，使血压平稳在一定水平。但不必要求降至正常水平才能手术。

73、正确答案：C

答案解析：

74、正确答案：D

答案解析：【解析】奥美拉唑作用于胃腺壁细胞，为 H^+-K^+-ATP 酶抑制剂，

选择性对胃酸分泌有明显抑制作用，起效迅速，适用于胃及十二指肠溃疡，返流性食管炎和胃泌素瘤。能特异性地抑制壁细胞顶端膜构成的分泌性微管和胞浆内的管状泡上的 H^+-K^+-ATP 酶，从而有效地抑制胃酸的分泌。

75、正确答案：E

答案解析：；解析:本例为外部感染引起的化脓性脑膜炎,2个月以下小儿和新生儿易以大肠杆菌多见。

76、正确答案：E

答案解析：解析:开瓣音提示脱垂的二尖瓣弹性良好；。

77、正确答案：D

答案解析：解析：张力性气胸又称高压性气胸，属胸外科，常见于较大肺气泡的破裂或较大较深的肺裂伤或支气管破裂，其裂口与胸膜腔相通，且形成活瓣。

78、正确答案：E

答案解析：【解析】某人已被确诊为某病,而本人否认自己有病,此人角色行为的改变属于角色行为缺如。

79、正确答案：B

答案解析：【解析】：女，右面部疔肿 10 天，多次挤压排脓，突发寒战高热，胸壁及肢体皮下可见出血斑，考虑脓毒症。

80、正确答案：D

答案解析：解析：分离性障碍又称癔症性精神障碍，是癔症较常见的表现形式，具体表现为：身份识别、记忆或遗失破坏或分离而这些对于我们正常人来说都是整合的。包括分离性身分障碍，分离性遗忘症，分离性神游症，人格解体障碍。

81、正确答案：D

答案解析：解析：患者肠梗阻术后肠鸣音弱，应该复查血生化，确定有无低血钾，并纠正。

82、正确答案：E

答案解析：【解析】：定期胃镜检查是胃癌高发患者首选的检查方法。

83、正确答案：C

答案解析：【解析】强迫症的临床表现为有意识的自我强迫与反强迫。此人患强迫症，选C。

84、正确答案：B

答案解析：解析：周期性麻痹是一组与钾离子代谢有关的代谢性疾病。临床表现为反复发作的弛缓性骨骼肌瘫痪或无力，持续数小时至数周，发作间歇期完全正常。发病机制不清楚，普遍认为与钾离子浓度在细胞内外的波动有关。根据发作时血清钾浓度之不同，可分为低血钾、高血钾和正常血钾三型。国外报道周期性麻痹有家族史，为常染色体显性遗传。格林-巴利综合

征：表现四肢近端肌力减退，伴四肢末梢型感觉障碍，脑脊液蛋白-细胞分离，血清钾正常。肌电图检查有助于鉴别。瘧病性瘫痪：患者起病常有精神刺激因素，临床症状表现多样，暗示治疗有效，血清钾正常。

85、正确答案：D

答案解析：【解析】根据临床表现，患者为轮状病毒感染。

86、正确答案：D

答案解析：

87、正确答案：C

答案解析：解析：妊娠合并轻型肝炎时与非孕期相同，注意休息，加强营养，高蛋白，积极保肝治疗。

88、正确答案：E

答案解析：

89、正确答案：C

答案解析：

90、正确答案：E

答案解析：【解析】：中心静脉压正常值 5-10cm 水柱，高于 15cm 水柱为静脉压升高，现在患者无心衰现象，则应该应用血管扩张剂。

91、正确答案：B

答案解析：

92、正确答案：E

答案解析：

93、正确答案：C

答案解析：

94、正确答案：B

答案解析：

95、正确答案：E

答案解析：

96、正确答案：C

答案解析：

97、正确答案：B

答案解析：

98、正确答案：D

答案解析：

99、正确答案：A

答案解析：

100、正确答案：E

答案解析：

101、正确答案：B

答案解析：

102、正确答案：B

答案解析：

103、正确答案：D

答案解析：

104、正确答案：A

答案解析：

105、正确答案：C

答案解析：

106、正确答案：B

答案解析：

107、正确答案：C

答案解析：

108、正确答案：E

答案解析：

109、正确答案：A

答案解析：

110、正确答案：D

答案解析：

111、正确答案：E

答案解析：

112、正确答案：D

答案解析：

113、正确答案：C

答案解析：

114、正确答案：B

答案解析：

115、正确答案：C

答案解析：

116、正确答案：B

答案解析：

117、正确答案：B

答案解析：

118、正确答案：E

答案解析：

119、正确答案：D

答案解析：

120、正确答案：C

答案解析：

121、正确答案：C

答案解析：

122、正确答案：C

答案解析：

123、正确答案：C

答案解析：解析：1.急性粒细胞白血病临床表现与急性淋巴细胞白血病相似。但淋巴结、肝、脾肿大不如后者显著显著。2.骨髓象骨髓检查是确立诊断和评定疗效的重要依据。3.目前常用的方案有①VCLP，②VDLP，③CODLP(或 COAIP)。

124、正确答案：D

答案解析：

125、正确答案：E

答案解析：

126、正确答案：C

答案解析：解析：1.MCV60fl，MCH24pg，MCHC25%，支持小细胞低色素性贫血，缺铁性贫血表现为缺铁引起的小细胞低色素性贫血。婴幼儿需铁量增加，若不补充蛋类、肉类等含铁量较高的辅食，易造成缺铁。2.若治疗有效，首先出现细胞内含铁酶活性开始恢复，而后外周血网织红细胞增多。3.继续口服1-2月至血清铁蛋白正常。

127、正确答案：E

答案解析：

128、正确答案：C

答案解析：

129、正确答案：D

答案解析：解析：1.脑脊液检查压力高支持硬膜下血肿诊断。2.慢性硬脑膜下血肿的诊断：①多见于中老年；②不明显的外伤史；③慢性颅内压增高症状；④有精神症状；⑤有肢体偏瘫和尿失禁；⑥最确切的诊断为CT检查。硬脑膜下血肿(并发于脑挫裂伤)：CT表现为额极、颞极和额叶的眶面，新月形高密度占位。硬脑膜外血肿：CT表现为颅骨内板下方的局限性梭形高密度区，局部常有颅骨骨折合并发生。3.慢性硬脑膜下血肿的治首选疗为钻孔冲洗引流术。

130、正确答案：A

答案解析：

131、正确答案：E

答案解析：

132、正确答案：E

答案解析：

133、正确答案：C

答案解析：

134、正确答案：D

答案解析：解析：1.甲亢合并周期性瘫痪绝大多数为男性青壮年、多为低钾性，常在夜间发作、次日午后减轻，因此首先检查血钾。2.紧急情况下静脉补钾治疗。

135、正确答案：D

答案解析：

136、正确答案：E

答案解析：

137、正确答案：C

答案解析：解析：1.患有脓疮病的儿童出现恶心、头痛、尿少、面部及四肢浮肿。这些是肾小球肾炎的征象，应选择卡托普利，具有轻至中等强度的降压作用，可降低外周血管阻力，增加肾血流量，不伴反射性心率加快。2.为防止水钠进一步潴留，导致循环过度负荷之严重并发症，须减轻肾脏负担，急性期宜限制盐、水、蛋白质摄入。对有水肿、血压高者用免盐或低盐饮食。3.病初血清补体 C3 及总补体下降，于 4~8 周逐渐恢复正常。

138、正确答案：B

答案解析：

139、正确答案：E

答案解析：

140、正确答案：B

答案解析：

141、正确答案：E

答案解析：

142、正确答案：E

答案解析：解析:1.该患者有5年IgA肾病史,结合其实验室检查,考虑尿毒症,意识障碍最可能的原因是尿毒症脑病。2.尿毒症患者应选择血液透析。

143、正确答案：D

答案解析：

144、正确答案：E

答案解析：

145、正确答案：B

答案解析：

146、正确答案：A

答案解析：

147、正确答案：D

答案解析：

148、正确答案：C

答案解析：解析：1.Graves 病临床表现除甲状腺肿大和高代谢综合征外，尚有突眼及较少见的胫前粘液性水肿或指端粗厚等。2.血甲状腺素水平升高支持该诊断。3.血 FT₃、FT₄(或 TT₃、TT₄)增高及 sTSH 降低(<0.1mU / L)者符合甲亢；仅 FT₃ 或 TT₃ 增高而 FT₄，TT₄ 正常可考虑为 T₃ 型甲亢；仅有 FT₄ 或 TT₄ 增高而 FT₃、TT₃ 正常者为 T₄ 型甲亢；血 TSH 降低，FT₃、FT₄ 正常，符合亚临床型甲亢。

149、正确答案：E

答案解析：

150、正确答案：B

答案解析：解析：1.小脑出血，常有头痛呕吐眩晕和共济失调明显，共济失调表现在患侧眼震和小脑语言等，多无瘫痪。2.本例头痛呕吐颅压增高表现应降颅压，血压≥200 / 110mmHg，应采用降血压治疗，当小脑出血≥10cm 或直径≥3cm 可考虑手术。