

2017 年护士执业资格考试考前压轴密卷

模拟试卷(二)



考试日期:5月6日-8日



考前点睛班

考生姓名:_____

准考证号:_____

考场号:_____

答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

2017 年护士执业资格考试于 5 月 6 日、7 日、8 日举行并全面实行人机对话考试。为帮助广大考生熟悉人机对话考试模式,金英杰国家医学考试研究中心开发人机对话考试系统,免费供考生演练,希望能够帮助大家顺利通过 2017 年护士资格考试!



人机对话模拟

模拟试卷(二)

专业实务

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 肝癌按组织细胞分型,最常见的类型是
- A. 弥漫型
B. 结节型
C. 肝细胞型
D. 胆管细胞型
E. 混合型
2. 属于甲类传染病的疾病是
- A. 伤寒
B. 鼠疫
C. 肺结核
D. 猩红热
E. 传染性非典型肺炎
3. 高渗性脱水早期的主要表现是
- A. 尿量减少
B. 血压下降
C. 口渴
D. 神志淡漠
E. 烦躁
4. 高血压病人心电图的常见表现有
- A. 室性期前收缩
B. 室上性心动过速
C. 心房颤动
D. 右室劳损
E. 左室肥大
5. 炎症性病变所致的急腹症一般不会出现
- A. 持续性腹痛
B. 体温升高、白细胞计数升高
C. 恶心、呕吐
D. 固定压痛点
E. 肠鸣音亢进
6. 胎盘滞留是指胎儿娩出后胎盘多长时间尚未娩出
- A. 5 min
B. 10 min
C. 15 min
D. 30 min
E. 60 min
7. 结肠癌的好发部位是
- A. 降结肠
B. 盲肠
C. 升结肠
D. 乙状结肠
E. 横结肠
8. 关于侵蚀性葡萄胎的叙述,正确的是
- A. 侵蚀性葡萄胎是一种良性滋养细胞疾病
B. 最主要的症状是停经后阴道出血
C. 肺部转移灶表现为紫蓝色结节
D. 转移灶最常见的部位是肺部
E. 多继发于人工流产后
9. 输卵管峡部妊娠时,最易出现的病理结局是
- A. 孕卵向宫腔生长
B. 陈旧性宫外孕
C. 继发性腹腔妊娠
D. 输卵管妊娠破裂
E. 输卵管妊娠流产
10. 扩张型心肌病病人心脏基本结构改

变是

- A. 右心室流出道梗阻
- B. 室间隔肥厚
- C. 单侧或双侧心腔扩大
- D. 左心室肥厚
- E. 心室容积减少

11. 多见于儿童及青壮年男性的腹外疝是

- A. 股疝
- B. 腹股沟直疝
- C. 腹股沟斜疝
- D. 脐疝
- E. 切口疝

12. 关于急性渗出性心包炎的叙述, 错误的是

- A. 积液在数周至数月吸收
- B. 早期壁层和脏层出现纤维蛋白、白细胞渗出

- C. 大量积液可引起心脏压塞
- D. 渗液常为浆液性
- E. 病变不累及心外膜下心肌

13. 破伤风阵发性痉挛最先累及的肌肉是

- A. 四肢肌
- B. 颈项肌
- C. 咀嚼肌
- D. 肋间肌
- E. 背腹肌

14. 胎盘早期剥离的主要病理变化是

- A. 胎盘边缘血窦破裂
- B. 胎盘血管痉挛
- C. 包蜕膜出血
- D. 底蜕膜出血
- E. 真蜕膜出血

15. 新生儿在出生后 24 小时内出现黄疸者应首先考虑为

- A. 新生儿生理性黄疸
- B. 新生儿溶血症
- C. 新生儿肝炎

D. 新生儿败血症

E. 胆道闭锁

16. 分娩时持续性枕横位最早导致的母婴损伤是

- A. 产后出血
- B. 宫颈水肿
- C. 胎膜早破
- D. 脐带脱垂
- E. 子宫破裂

17. 对于消化性溃疡患者, 引起胃酸分泌过多的食品是

- A. 牛奶
- B. 香蕉
- C. 蛋汤
- D. 米汤
- E. 香菇

18. 慢性阻塞性肺疾病好发于

- A. 10 岁以下儿童
- B. 青壮年
- C. 老年
- D. 青春期
- E. 婴儿期

19. 小儿肺部易发生感染的主要内因是

- A. 呼吸中枢不健全
- B. 黏膜纤毛运动差
- C. 胸腔小而肺相对较大
- D. 肺含血量丰富, 含气量少
- E. 肋骨呈水平位, 呼吸运动度小

20. 下列疾病中, 以假小叶形成为主要病理改变的是

- A. 慢性肝淤血
- B. 弥漫型肝炎
- C. 急性重型肝炎
- D. 肝硬化
- E. 亚急性重型肝炎

21. 护士指导肥厚型梗阻性心肌病人避免屏气的主要目的是

- A. 避免心衰
- B. 避免出血

- C.防止晕厥
D.防止栓塞
E.防止抽搐
- 22.胰腺癌最常见的发生部位是
A.胰管
B.胰导管
C.胰头部
D.胰体部
E.胰尾部
- 23.下列有关感染性心内膜炎的叙述,正确的是
A.心肌内部的炎症
B.以左心室扩张为主
C.心包的微生物感染
D.心包内有赘生物形成
E.心肌内膜表面的微生物感染
- 24.新生儿低钙血症症状多出现在
A.生后 10 天
B.生后 5~10 天
C.生后 5~12 天
D.生后 6~10 天
E.生后 8~10 天
- 25.心脏的正常起搏点是
A.窦房结
B.结间束
C.房室结
D.希氏束
E.浦肯野纤维
- 26.小肝癌的直径范围是
A.1.0 cm 左右
B.3.1~4 cm
C.4.1~5 cm
D.5.1~10 cm
E.≥10 cm
- 27.纵隔摆动常见于
A.闭合性气胸
B.开放性气胸
C.张力性气胸
D.损伤性气胸
E.急性脓胸
- 28.护士执业注册管理办法规定的健康标准不包括
A.乙肝表面抗原阳性,但肝功能正常者
B.双耳听力障碍
C.色弱
D.色盲
E.精神病史
- 29.正常人体温在 24 h 内呈周期性波动,体温最高出现在
A.上午 7~8 点
B.清晨 2~6 点
C.午后 13~18 点
D.上午 9~11 点
E.中午 12 点左右
- 30.子宫内膜癌最常见的病理类型是
A.内膜样腺癌
B.未分化癌
C.鳞状细胞癌
D.透明细胞癌
E.小细胞癌
- 31.3~4 个月婴儿佝偻病激期较特异的表现为
A.颅骨软化
B.方颅
C.枕秃
D.肋骨串珠
E.夜间惊啼
- 32.病理学上区分内痔与外痔的分界线为
A.直肠肛门移行带
B.内括约肌
C.齿状线
D.白线
E.肛垫
- 33.与消化性溃疡发生关系密切的细菌是
A.链球菌
B.霍乱弧菌

- C. 幽门螺杆菌
D. 痢疾杆菌
E. 大肠埃希菌
34. 关于牛奶与母乳成分的比较, 对牛奶的叙述正确的是
- A. 蛋白质含量高, 以酪蛋白为主
B. 铁含量少, 吸收率高
C. 矿物质含量少于母乳
D. 含不饱和脂肪酸较多
E. 乳糖含量高于母乳
35. 中医在诊治疾病的活动中, 主要在于
- A. 辨识治疗方法
B. 辨识体征
C. 辨病
D. 辨证
E. 辨症
36. 下列哪一条血管破裂可引起硬脑膜外血肿
- A. 大脑中动脉
B. 脑膜中动脉
C. 颞浅动脉
D. 海绵窦
E. 枕动脉
37. 短绀脉常见于
- A. 肺动脉高压患者
B. 心包积液患者
C. 左心房传导阻滞患者
D. 动脉导管未闭患者
E. 心房纤颤患者
38. 伤寒病人常见的热型是
- A. 间歇热
B. 不规则热
C. 体温最低
D. 稽留热
E. 弛张热
39. 急性胰腺炎患者应慎用的药物是
- A. 洛赛克
B. 生长抑素
C. 吗啡
D. 奥曲肽
E. 钙剂
40. 左心功能不全引起的呼吸困难是由于
- A. 上腔静脉淤血
B. 体静脉淤血
C. 门静脉淤血
D. 下肢静脉淤血
E. 肺循环淤血
41. 血栓闭塞性脉管炎主要累及
- A. 四肢小动脉
B. 四肢中小静脉
C. 下肢大隐静脉
D. 下肢末梢神经
E. 四肢交感神经
42. 妊娠合并心脏病产妇, 在分娩时出现“胎儿窘迫”, 其原因是
- A. 胎儿畸形
B. 胎儿先天性心脏病
C. 母体血氧含量不足
D. 胎盘功能减退
E. 脐带血运受阻
43. 颈椎病的基本原因是
- A. 先天性椎管狭窄
B. 颈椎间盘退行性变
C. 颈部急、慢性损伤
D. 颈椎骨折或脱位
E. 颈椎间盘突出
44. 胰腺癌最常见的组织类型是
- A. 窦性癌
B. 黏液癌
C. 未分化癌
D. 黏液性囊腺癌
E. 导管细胞腺癌
45. 口服别嘌呤醇治疗纯尿酸肾结石的机理是
- A. 限制肠道对磷的吸收
B. 减少尿酸形成
C. 促进结石溶解

- D.减轻患者疼痛
E.促进结石排出
- 46.患者,男性,54岁。有慢性咳嗽史10余年,听诊两肺底有散在湿啰音,慢性支气管炎的X线表现为
- A.肺部有块影
B.肺内有液平
C.肺大泡征象
D.肺纹理增粗
E.肺透亮度增加
- 47.患者,女性,31岁。第1胎,孕28周,诊断为妊娠期高血压疾病,其基本病理变化是
- A.全身小动脉痉挛
B.全身动脉痉挛
C.胎盘血管痉挛
D.子宫血管痉挛
E.螺旋小动脉痉挛
- 48.患者,女性,46岁。经期延长,诊断性刮宫结果提示黄体萎缩不全,基础体温的特征是
- A.基础体温呈双相,下降缓慢
B.基础体温呈双相,下降迅速
C.基础体温呈单相,下降缓慢
D.基础体温呈单相,下降迅速
E.基础体温呈双相,无下降
- 49.患者,女性,56岁。诊断胰头癌,行胰头十二指肠肠切除术,术后出现高血糖。经一段时间治疗后患者拟于明日出院,正确的饮食指导原则是
- A.低脂、高蛋白、高维生素
B.低脂、低糖、高维生素
C.高脂、低糖、低蛋白
D.高脂、低糖、高蛋白
E.低脂、低糖、低蛋白
- 50.患者,女性,32岁。系统性红斑狼疮病史1年。近日因日晒过多、面部蝶形红斑明显,对其进行健康教育,错误的是
- A.合理安排休息与活动
B.忌食芹菜、香菜、无花果
C.服用避孕药避孕、防止疾病恶化
D.避免服用诱发狼疮的药物
E.遵医嘱用药,勿擅自减药或停药
- 51.患者,男性,65岁。发现右腹股沟内侧包块3年余。3天前腹股沟包块突然增大、变硬,不能还纳,伴剧烈疼痛,8小时前疼痛有所缓解,但出现发热,患者最可能出现了
- A.急性阑尾炎
B.绞窄性疝
C.嵌顿性疝
D.难复性疝
E.易复性疝
- 52.患者,女性,51岁。因淋巴瘤入院接受化疗,护士在评估患者时发现其口腔黏膜有乳白色分泌物,在给予口腔护理时首选的溶液是
- A.生理盐水
B.过氧化氢溶液
C.0.1%醋酸溶液
D.1%~4%碳酸氢钠溶液
E.多贝尔溶液
- 53.患儿,女,6个月。室间隔缺损,哭闹时常有口唇发绀。对其饮食护理正确的是
- A.喂哺过程中可暂停,给予休息
B.喂哺后取仰卧位以利于消化
C.提供低蛋白易消化食物
D.每餐宜喂饱,以保证营养
E.勿边喂哺边吸氧
- 54.患者,男性,32岁。暴食后突发急性胰腺炎入院,观察时要警惕患者可能发生的最常见并发症是
- A.休克
B.化脓性感染
C.肾衰
D.中毒性脑病
E.胰腺假性囊肿
- 55.患儿,男,12岁。背部有一脓肿,切

开后,脓液稠厚、黄色、无臭味。感染的细菌可能是

- A.大肠杆菌
- B.金黄色葡萄球菌
- C.溶血性链球菌
- D.绿脓杆菌
- E.变形杆菌

56.患者,男性,25岁。一周前肛门周围持续性跳痛,皮肤红肿,并有局部压痛及波动感,诊断为肛门周围脓肿。行手术治疗,并应用抗生素。选择抗生素的方法,正确的是

- A.对绿脓杆菌有效的抗生素
- B.对革兰阴性杆菌和厌氧菌有效的抗生素,宜联合用药
- C.对金黄色葡萄球菌有效的抗生素
- D.对厌氧菌有效的抗生素
- E.对革兰阴性菌有效的抗生素

57.患者,男性,23岁。胸部外伤致右侧第5肋骨骨折并发气胸,呼吸困难、发绀,出冷汗。查体:血压90/60 mmHg,气管向左侧移位,右胸部饱满,叩诊呈鼓音,呼吸音消失,颈胸部有广泛皮下气肿。造成该患者极度呼吸困难、发绀的主要原因是

- A.广泛皮下气肿
- B.健侧肺扩张受限
- C.伤侧胸腔内压力不断升高
- D.静脉血液回流受阻
- E.纵隔向健侧移位

58.新生儿,出生3天,今晨喂哺时护士发现其口腔出现白色斑点,棉签擦拭不去,可采用

- A.0.9%生理盐水清洁口腔
- B.2%碳酸氢钠溶液清洁口腔
- C.2%利多卡因涂沫患处
- D.3%过氧化氢溶液清洁口腔
- E.5%金霉素鱼肝油涂抹患处

59.患者,男性,49岁。全身微循环障碍,该患者禁忌使用冷疗的理由是

- A.可降低血液循环,会影响创面愈合
- B.可导致组织缺血缺氧而变性坏死
- C.可引起过敏
- D.可引起腹泻
- E.可发生冻伤

60.患者,女性,45岁。胃大部切除术后第1天,医嘱记录出入液量,该患者每日排出量的记录内容不包括

- A.伤口渗出液
- B.腹腔引流液
- C.胃肠减压吸出液
- D.尿量
- E.汗液

61.患者,女,35岁。患急性胆囊炎入院手术治疗。术后患者回到病房,护士跟她她说:“你已经做完手术回到病房了”,这是属于

- A.一般性沟通
- B.事务性沟通
- C.治疗性沟通
- D.情感性沟通
- E.共鸣性沟通

62.患者,女,2岁。因进行性青紫、乏力一年余入院。平时安静不愿运动,吃奶、哭闹时容易气促、口唇发绀。婴儿期有喂养困难史,一直以来进食较少,患者出现杵状指。该患者最可能的诊断是

- A.房间隔缺损
- B.法洛四联症
- C.室间隔缺损
- D.肺动脉狭窄
- E.动脉导管未闭

63.患者,女性,58岁。上消化道大出血入院时已休克。现取中凹卧位,具体的卧姿是上身和下肢分别抬高

- A.上身 5° ~ 10° 、下肢 10° ~ 20°
- B.上身 5° ~ 10° 、下肢 20° ~ 30°
- C.上身 10° ~ 15° 、下肢 20° ~ 30°
- D.上身 15° ~ 20° 、下肢 15° ~ 25°

E. 上身 20°~25°、下肢 20°~25°

64. 患者, 女性, 32 岁, 已婚。近年来, 月经周期 30~32 天, 月经持续 10~15 天, 经量时多时少。基础体温呈双相, 为明确诊断需行刮宫术, 时间应在

- A. 月经来潮前 1 周
- B. 月经来潮 2 小时内
- C. 月经第 3 天
- D. 月经第 5 天
- E. 月经来潮 24 小时内

65. 患者, 男性, 45 岁。误服高浓度氢氧化钠溶液后被发现, 立即送往医院, 此时最佳的处理方法是

- A. 碳酸氢钠洗胃
- B. 高锰酸钾溶液洗胃
- C. 盐水洗胃
- D. 口服蛋清水
- E. 口服稀盐酸

66. 患者, 男性, 65 岁。因喉癌手术行气管切开, 为其气管内吸痰时正确的操作是

- A. 如痰液较多, 可持续吸引至痰液吸尽
- B. 用同一根吸痰管吸净口腔痰液后, 再吸气管内痰液
- C. 吸痰负压为 40.0~53.3 kPa
- D. 储液瓶内的吸出液应及时倾倒, 一般不应超过储液瓶的 1/2
- E. 由气管深部开始上下反复提拉吸痰

67. 一心瓣膜病患者心脏图; 该患者所患疾病为



- A. 主动脉瓣关闭不全

B. 三尖瓣关闭不全

C. 二尖瓣关闭不全

D. 二尖瓣狭窄

E. 主动脉瓣狭窄

68. 患儿, 3 岁。体温升高达 39 °C, 口唇及颊黏膜出现成簇小疱疹。入院后诊断为疱疹性口腔炎。疱疹性口腔炎黏膜损伤特点为

- A. 黄白色纤维素性渗出物
- B. 潮红、可有渗血
- C. 有灰白色假膜
- D. 白色片状物
- E. 充血、红绒状

69. 患者, 男性, 68 岁。因“颌下急性蜂窝织炎”入院。患者颈部明显红肿、疼痛, 伴严重全身感染症状, 自感心慌、气紧、胸闷, 口唇发绀。既往有冠心病及慢性支气管炎史。入院后予以补液、抗感染治疗。目前患者最可能发生的并发症是

- A. 慢性支气管炎急性发作
- B. 急性心肌梗死
- C. 急性呼吸衰竭
- D. 窒息
- E. 急性肺水肿

70. 产妇, 34 岁。阴道分娩后发生晚期产后出血, 最常见的原因是

- A. 胎盘附着面复旧不全
- B. 蜕膜残留
- C. 肿瘤
- D. 子宫内膜炎
- E. 胎盘、胎膜残留

71. 患者, 女性, 41 岁。原发性肝癌晚期, 无明显诱因突发右上腹剧痛, 面色苍白, 大汗。查体: 腹膜刺激征阳性, 考虑为

- A. 肝癌腹膜移位
- B. 肝癌结节破裂
- C. 急性胃穿孔
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性胰腺炎

72. 患儿,男,11 个月。玩耍中突然神志不清,两眼上翻,面肌及四肢抽动,数秒钟即恢复,急送医院就诊。患儿活泼如常,无异常表现,但查体出现阳性隐性体征,诊断为维生素 D 缺乏性手足搐搦症。维生素 D 缺乏性手足搐搦症的隐性体征是

- A. 布氏征
- B. 脑膜刺激征
- C. 巴宾斯基征
- D. 克氏征
- E. 陶瑟征

73. 患者,女性,55 岁。因慢性支气管炎合并铜绿假单胞菌感染入院,患者高热,精神差,疲乏无力,护士为患者做特殊口腔护理时应选用的漱口液是

- A. 0.9% 氯化钠
- B. 0.1% 醋酸溶液
- C. 0.2% 呋喃西林
- D. 1%~3% 过氧化氢
- E. 1%~4% 碳酸氢钠

74. 患者,女性,51 岁。输血发生溶血反应,出现黄疸、血红蛋白尿,此时的处理措施是

- A. 端坐位加压吸氧
- B. 静脉滴注碳酸氢钠
- C. 皮下注射肾上腺素
- D. 静脉注射 10% 葡萄糖酸钙
- E. 置患者于头低足高位

75. 患者,女性,46 岁。因 2 型糖尿病入院。患者因口服降糖药无效,需注射胰岛素。护士根据护理计划,对患者进行胰岛素的指导,其中正确的是

- A. 皮下注射,不用排气
- B. 避开发炎、硬结和瘢痕处
- C. 进针角度为 90°
- D. 用 70% 乙醇消毒局部皮肤
- E. 选择并固定注射部位

76. 患者,女性,45 岁。平素体健,淋雨后突发寒战、高热、咳嗽,咳铁锈色痰。X 胸

片示右肺中叶呈均匀一致的致密阴影,引发患者肺部病变最可能的病原体是

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 真菌
- D. 衣原体
- E. 支原体

77. 患者,男性,56 岁。肝硬化多年,行脾脏切除术后 10 天。目前血氨增高,无临床表现,处于亚临床肝性脑病阶段。饮食原则重点是

- A. 提供优质蛋白质
- B. 避免动物性食物
- C. 肠胃外营养
- D. 流食
- E. 无渣饮食

78. 患者,男性,33 岁。腹部刀伤急症入院,医嘱破伤风抗毒素治疗,皮试结果弱阳性,正确的处理方法是

- A. 直接注射
- B. 脱敏注射
- C. 口服抗过敏药物
- D. 改用抗生素
- E. 通知医生修改医嘱

79. 患者,女性,42 岁。被汽车撞伤,右上腹剧痛,脉搏 100 次/分,呼吸 36 次/分,血压 90/65 mmHg,诊断尚未明确时应禁用

- A. 安定
- B. 吗啡
- C. 鲁米那
- D. 非那根
- E. 6-氨基乙酸

80. 患者,男性,22 岁。因车祸导致双下肢截肢,在某医院安装假肢,假肢由某工厂生产,某公司销售,2 个月后发现假肢质量有问题,依据《侵权责任法》,患者正确的做法是

- A. 向销售公司申请赔偿
- B. 向医院、工厂、销售公司申请赔偿

- C.向工厂申请赔偿
D.自行承担损害
E.向医院申请赔偿
- 81.帕金森病患者,出现面部表情呆板,活动笨拙,起床、翻身、步行及转身都迟缓,手指精细动作困难,拟给予药物治疗。对于药物治疗的叙述,正确的是
- A.从小剂量开始,缓慢递增
B.用足量已达到满意疗效
C.一旦症状改善即可逐渐减量
D.首选抗胆碱能药物
E.可在晚上加用单胺氧化酶 β 抑制剂
- 82.患者,女性,44岁。肛瘘5个月余,行手术治疗,术后3天出现肛门轻度失禁,少量粪便自行外溢。护士给予其的健康指导中,错误的是
- A.出院后发现异常应及时就诊
B.建议患者择期行肛门成形术
C.解释肛门失禁原因
D.保持肛周皮肤干燥,可局部涂抹氧化锌
E.保持肛门周围皮肤清洁,勤换内裤
- 83.患者,女性,56岁。患慢性肺源性心脏病10年。2周前出现双下肢水肿,自行每日3次服用氢氯噻嗪。近日来主诉全身乏力,心跳不规律。最可能的原因是该药物导致了
- A.心肌缺血
B.周围神经炎
C.低血钾
D.低血糖
E.肠黏膜出血
- 84.患者,男性,35岁。9月10日因胆结石收入院,在院期间饮食、作息、排泄均正常,手术拟于9月18日进行,9月16日值班护士巡视时发现其晚上入睡困难,夜间常醒来,且多次询问护士做手术是不是很痛,手术有无危险。对于该患者目前的情况,正确的护理问题是
- A.睡眠型态紊乱:与生理功能改变有关
B.睡眠型态紊乱:与即将手术,心理负担过重有关
C.睡眠型态紊乱:与护士夜间巡视有关
D.睡眠型态紊乱:与环境的改变有关
E.睡眠型态紊乱:与入睡困难,夜间常醒有关
- 85.患者,女性,36岁。因慢性再生障碍性贫血入院治疗。治疗2个月后出现痤疮,最可能导致出现这些副作用的药物是
- A.糖皮质激素
B.丙酸睾酮
C.环孢素
D.促红细胞生成素
E.白细胞介素
- 86.患者,男性,76岁。在家滑到后入院治疗,入院后诊断为股骨颈骨折,给予皮牵引治疗,患者平卧。请问易发生压疮的部位是
- A.腕部
B.背部
C.腹部
D.头部
E.骶尾部
- 87.患者,男性,43岁。患风湿性心脏病8年。体检:双颊紫红,口唇发绀,心尖部闻及舒张期隆隆样杂音。考虑为
- A.二尖瓣狭窄
B.二尖瓣关闭不全
C.主动脉瓣狭窄
D.主动脉瓣关闭不全
E.联合瓣膜病变
- 88.患者,女性,62岁。因肠梗阻入院治疗。责任护士来到其床边自我介绍,询问病史,此时他们的关系处于护患关系的
- A.准备期
B.初始期
C.工作期
D.结束期

- E.延续期
- 89.患儿,男,10月龄。人工喂养。腹泻伴呕吐2天,大便呈黏液状,带脓血,有腥臭味。应采取的处理措施是
- 给予止泻剂
 - 去乳糖配方奶粉
 - 给予糖皮质激素
 - 禁食、禁水12小时
 - 给予肠黏膜保护剂
- 90.患者,男性,51岁。风湿性心脏病伴心功能不全,双下肢及身体下垂部位严重水肿,该患者每日饮食中应控制
- 摄入盐量不超过5g
 - 摄入盐量不超过2g
 - 摄入盐量不超过0.5g
 - 摄入钠量不超过2g
 - 摄入钠量不超过0.5g
- 91.患者,男,50岁。输血过程中出现头部胀痛、四肢麻木、腰背部剧烈疼痛、呼吸困难、发绀等症状。下列护理措施中错误的是
- 严密观察生命体征和尿量
 - 静脉注射碳酸氢钠
 - 冷敷肾区,减轻疼痛
 - 停止输血,保留余血
 - 吸氧,建立静脉通路
- 92.患儿,女,8岁。确诊猩红热2周后并发急性肾小球肾炎,引发并发症的主要原因是链球菌及其毒素入侵人体后产生的
- 化脓性病变
 - 非特异性炎症
 - 感染性病变
 - 中毒性病变
 - 变态反应性病变
- 93.患者,男性,61岁。高血压病史12年,一直间断服用降压药物,血压多为160/100 mmHg。4小时前心前区持续疼痛,出冷汗急诊入院,经心电图检查确诊为急性心肌梗死,入院1小时后患者出现呼吸困难,两肺布满湿啰音,心率112次/分,律齐。首先考虑为
- 急性左心衰竭
 - 心肌再次梗死
 - 肺部感染
 - 严重心肌缺血、缺氧
 - 肺栓塞
- 94.患者,男性,43岁。胸外伤后呼吸困难,发绀,脉快。提示张力性气胸的是
- X线示伤侧肺明显萎缩
 - X线显示纵隔移位
 - 胸膜腔穿刺有高压气体冲出
 - 伤口处发出嘶嘶声响
 - 局部叩诊成鼓音
- 95.某初孕妇,32岁。妊娠38周。腹部触诊:宫底部可触及圆而硬胎儿部分,腹部右侧凹凸不平,左侧相对平坦,胎心音在脐上左侧听得最清楚。该孕妇的胎儿胎位可能是
- 枕左前位
 - 枕右前位
 - 骶左前位
 - 骶右前位
 - 肩右前位
- 96.患者,男性,75岁。患慢性阻塞性肺疾病30余年,现处于疾病稳定期,在为其制定肺功能康复计划时,应是
- 护士与患者共同制定,护士指导患者执行
 - 患者自行制定,由护士指导执行
 - 患者自行制定并执行
 - 护士单独制定,指导患者执行
 - 护士单独制定,强制患者执行
- 97.患者,女性,45岁,清洁工。患尿毒症入院,入院后家人一直陪伴其身边,当得知需要长期透析治疗后,患者经常独自流泪,默默发呆,不愿与人交流,最可能的原因是
- 尿毒症引起的精神症状
 - 害怕透析带来后遗症

- C.无力承受高额费用
- D.家属感情支持不足
- E.担心疾病影响工作

98.患者,男性,61岁。近日来出现咳嗽、打喷嚏时不自主排尿现象,这种现象称为

- A.压力性尿失禁
- B.反射性尿失禁
- C.急迫性尿失禁
- D.功能性尿失禁
- E.部分尿失禁

99.患者,男性,74岁。因膀胱癌住院手术,术后接受顺铂化疗,在给药前后,护士遵医嘱给患者输入大量液体进行水化,此做法

是为了防止该药物对患者产生

- A.肝功能损害
- B.神经毒性
- C.胃肠道反应
- D.肾功能损害
- E.骨髓抑制

100.老年人早中晚三餐食量的比例最好为

- A.20%、30%、50%
- B.25%、35%、40%
- C.30%、30%、40%
- D.30%、40%、30%
- E.40%、30%、30%

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题,请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(101~102题共用题干)

患者,女性,71岁。在家里突然晕倒,立即被送入医院,诊断为脑血管意外。患者配偶告知护士,患者发病前,一直自服降压药控制高血压。

101.患者逐渐恢复,为鼓励患者自己进食,护士应采取的措施是

- A.将餐具放到患者手里
- B.让患者根据自己的能力慢慢进食
- C.建议配偶帮助喂饭,并协助患者进食
- D.先给患者喂食,剩余部分让患者自己进食
- E.将食物和餐具放在患者方便拿取的餐桌上

102.能够确定患者意识状态的选项是

- A.疼痛刺激反应
- B.瞳孔对光反射
- C.角膜反射
- D.生命体征
- E.肌腱反射

(103~104题共用题干)

患者,女性,43岁。因车祸肝破裂,面色苍

白,脉搏快而弱,四肢冰冷,血压84/50 mmHg,呈现休克状态。

103.有助于确诊的检查是

- A.测血红蛋白
- B.测红细胞比积
- C.测肝功能
- D.B超检查
- E.腹腔穿刺

104.该患者休克的类型是

- A.失血性休克
- B.失液性休克
- C.过敏性休克
- D.心源性休克
- E.神经性休克

(105~106题共用题干)

足月新生儿,出生后1分钟,心率70次/分,呼吸弱而不规则,全身皮肤青紫,四肢张力松弛,喉反射消失,Apgar评分为3分。

105.该患儿为

- A.正常新生儿
- B.轻度窒息
- C.青紫窒息

D. 重度窒息

E. 急性窒息

106. 应首先采取的抢救措施是

A. 给氧

B. 保暖

C. 清理呼吸道

D. 人工呼吸

E. 心外按摩

(107~108 题共用题干)

患者, 男性, 26 岁。建筑工人, 因高空坠落入院治疗。入院后诊断为脊柱骨折合并下肢截瘫。患者生命体征平稳, 双下肢肌力 I 级, 患者经常一个人流泪。

107. 该患者目前首要的护理问题是

A. 有皮肤完整性受损的危险

B. 焦虑抑郁

C. 躯体活动障碍

D. 营养失调: 低于机体需要量

E. 有感染的危险

108. 有一天, 护士夜间查房时看见他正在哭泣, 护士应该

A. 告诉他不要哭泣, 以免影响其他患者休息

B. 保持沉默, 静静地陪伴患者

C. 假装没看到, 悄悄地离开病房

D. 告诉他男性应该坚强一些

E. 为患者拉上隔帘

(109~110 题共用题干)

患者, 男性, 56 岁。确诊为原发性支气管肺癌, 准备手术治疗收入院。

109. 护士评估患者健康资料时, 发现与肺癌最有关系的因素是

A. 高脂高盐饮食

B. 体重过重

C. 吸烟 30 年

D. 母亲有高血压

E. 发现糖尿病 5 年

110. 针对该患者的术前护理, 不妥的是

A. 鼓励戒烟

B. 高蛋白、高热量、高维生素、易消化饮食

C. 让患者卧床休息, 减少活动

D. 帮助患者调整好心态面对疾病

E. 介绍手术和术后情况

(111~112 题共用题干)

一建筑工人, 中午在工地食堂就餐 2 小时后出现腹痛、腹泻、呕吐等症状, 呕吐物为食用的食物, 大便为绿色水样便。入院后被诊断为食物中毒。

111. 引起食物中毒最常见的病原菌是

A. 金黄色葡萄球菌

B. 副溶血性弧菌

C. 沙门菌属

D. 大肠埃希菌

E. 溶血性链球菌

112. 入院后对病人呕吐物、粪便进行细菌培养, 找到了沙门菌。在治疗时应首选的抗生素是

A. 氯霉素

B. 四环素

C. 阿米卡星

D. 青霉素

E. 大环内酯类

(113~114 题共用题干)

孕妇, 31 岁。自述妊娠 42+1 周, 无临产先兆, 胎动次数每 12 小时 6 次, 估计胎儿体重约 4 200 g。

113. 为准确核实该孕妇孕周还应收集的资料是

A. 胎心率

B. 末次月经情况

C. 子宫底高度

D. 早孕反应开始时间

E. 胎动开始出现时间

114. 此时应采取的正确措施为

A. 待其自然分娩

B. 立即行剖宫产术

C. 立即静脉滴注缩宫素

- D.改善胎儿情况后剖宫产
E.改善胎儿情况后静脉滴注缩宫素
(115~116 题共用题干)

患者,男,38岁。1小时前口服安眠药2瓶,由家人急诊送入院,呼之无应答,神志昏迷,护士迅速给予洗胃,操作如图所示。



- 115.护士做图示动作的目的是
A.增大咽喉通道的弧度
B.增大鼻咽通道的弧度
C.使患者更安全
D.使患者更舒适
E.防止患者呕吐
- 116.护士应于何时做该图示动作
A.插胃管至贲门部时
B.插胃管至鼻咽喉部时
C.插胃管至咽喉部时
D.测胃管长度时
E.插胃管前
(117~118 题共用题干)

患儿,男,1岁。咳嗽、流涕1天,夜起发热来院。体温39℃,神志清楚。

117.护士应采取的适宜降温措施是

- A.冷湿敷
B.化学制冷袋
C.温水拭浴
D.乙醇拭浴
E.冰袋

118.操作中的注意事项,不正确的是

- A.胸前区、腹部和足底等处禁用冷疗
B.腋窝、腹股沟等处适当延长用冷时间
C.冷疗后30 min复测体温并记录
D.冷疗时间应为30~40 min
E.随时观察患儿情况

(119~120 题共用题干)

患者,女,49岁。子宫肌瘤切除术后第5天,手术切口疼痛、红肿,体温38.3℃,考虑该患者出现了院内感染。

119.该患者的院内感染类型是

- A.化脓性感染
B.切口真菌感染
C.自身感染
D.外源性感染
E.内源性感染

120.此型感染最有利的预防措施是

- A.勤换敷料
B.建议患者转院
C.提高机体抵抗力
D.使用抗生素
E.健全医院感染监测制度



实践能力

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 梗阻性肥厚型心肌病患者最常见的死亡原因是
 - A. 脑卒中
 - B. 猝死
 - C. 休克
 - D. 心肌梗死
 - E. 肺栓塞
2. 除腹痛外,高位小肠梗阻最主要的症状是
 - A. 停止排气排便
 - B. 肠腔积气
 - C. 呕吐频繁
 - D. 肠蠕动亢进
 - E. 腹胀明显
3. 细菌性肝脓肿患者最常见的早期症状是
 - A. 恶心
 - B. 黄疸
 - C. 贫血
 - D. 右上腹肌紧张,局部触痛明显
 - E. 寒战、高热
4. 临床上较常见的甲状腺癌是
 - A. 乳头状腺癌
 - B. 滤泡状腺癌
 - C. 髓样癌
 - D. 未分化癌
 - E. 继发性恶性肿瘤
5. 流行性脑脊髓膜炎普通型脓毒症期的临床表现特点是
 - A. 出现意识障碍
 - B. 皮肤瘀点及瘀斑
 - C. 抽搐发作
 - D. 生理反射异常及出现病理反射
 - E. 颅内压升高,呼吸衰竭
6. 抑郁症患者的核心表现是
 - A. 情绪低落
 - B. 思维迟缓
 - C. 情感淡漠
 - D. 睡眠障碍
 - E. 自责负罪
7. 子宫内膜异位症的典型症状是
 - A. 继发性渐进性痛经
 - B. 转移性疼痛
 - C. 撕裂样疼痛
 - D. 脐周疼痛
 - E. 牵拉性疼痛
8. 最危急的心律失常类型是
 - A. 窦性心动过速
 - B. 心房颤动
 - C. 室上性心动过速
 - D. 房室传导阻滞
 - E. 心室颤动
9. 为缓解疼痛,急性胰腺炎患者可采取的体位是
 - A. 仰卧位
 - B. 俯卧位
 - C. 弯腰屈膝侧卧位
 - D. 半坐卧位
 - E. 仰卧屈膝位
10. 夏科(Charcot)三联征是指
 - A. 腹痛、恶心、高热
 - B. 恶心、腹胀、寒战
 - C. 腹痛、腹胀、寒战高热
 - D. 腹痛、黄疸、恶心
 - E. 腹痛、寒战高热、黄疸
11. 中暑高热时,最合适的低压灌肠溶液为
 - A. 4℃氯化钠溶液+冰醋酸

- B.0℃生理盐水+食醋
C.4℃肥皂水
D.4℃葡萄糖盐水
E.50%硫酸镁溶液 100 mL
- 12.关于肝性脑病患者的治疗措施错误的是
- A.伴代谢性碱中毒者,宜用精氨酸
B.可口服抗菌药减少肠道产氨
C.积极去除各类诱发因素
D.烦躁者可使用镇静药
E.可服用轻泻剂清除肠内积食
- 13.柯氏斑是哪一种急性传染病的典型症状
- A.猩红热
B.风疹
C.水痘
D.麻疹
E.流行性腮腺炎
- 14.用利福平最主要的不良反应是
- A.肝功能改变
B.球后视神经炎
C.周围神经炎
D.高尿酸血症
E.严重胃肠道反应
- 15.关于脓性指头炎切开引流的叙述,正确的是
- A.在波动最明显处切开
B.在患指侧面横行切开
C.在患指背侧切开
D.在患指侧面纵行切开
E.在患指掌侧切开
- 16.肾损伤非手术治疗的卧床时间至少为
- A.7天
B.10天
C.14天
D.16天
E.21天
- 17.破伤风患者在治疗时,哪一项为首选

处理

- A.注射 TAT
B.使用镇静药物
C.补充液体
D.清除伤口坏死组织
E.播放舒缓音乐
- 18.骨折与脱位都会出现的临床表现是
- A.弹性固定
B.畸形
C.骨擦音
D.异常活动
E.关节部位空虚
- 19.泌尿系肿瘤患者的血尿特点是
- A.终末血尿
B.镜下血尿
C.全程肉眼血尿,终末加重
D.全血尿伴有血块
E.无痛性间歇性肉眼全程血尿
- 20.DIC 使用肝素治疗后引起大出血时,

应选用

- A.6-氨基乙酸
B.维生素 K
C.安络血
D.鱼精蛋白
E.止血敏
- 21.动脉硬化性脑梗死护理错误的是
- A.保持安静,避免搬动
B.头部冰袋冷敷
C.不能进食者及早鼻饲
D.定时测血压
E.发病 2 周后可做肢体功能锻炼
- 22.支气管扩张患者典型的临床表现是
- A.慢性咳嗽、大量脓痰、反复咯血
B.慢性咳嗽、大量脓痰、喘息
C.慢性咳嗽、呼吸困难、反复咯血
D.发作性喘息、大量脓痰、反复咯血
E.慢性咳嗽、长期低热、反复咯血
- 23.慢性呼吸衰竭患者禁用
- A.青霉素

- B.吗啡
 C.洛贝林
 D.氨茶碱
 E.β受体激动剂
- 24.不符合水痘特点的描述是
 A.潜伏期 14~16 天
 B.有瘙痒感
 C.皮疹多见于面部和四肢
 D.发热 1~2 天内出疹
 E.皮疹一般在 1~6 日内分批出齐
- 25.下列抗结核药物中不属于杀菌剂的是
 A.异烟肼
 B.利福平
 C.链霉素
 D.吡嗪酰胺
 E.对氨基水杨酸
- 26.患者,男性,71 岁。因良性前列腺增生行前列腺切除术。术后留置气囊导尿管的主要目的是
 A.引流膀胱
 B.防止感染
 C.膀胱冲洗
 D.观察尿量
 E.压迫前列腺窝
- 27.产后 2~3 天内产妇可能出现的正常表现是
 A.尿量增加
 B.尿潴留
 C.尿失禁
 D.少尿
 E.排尿困难
- 28.白血病患者的护理措施错误的是
 A.解除精神压力
 B.充分休息以减少体力消耗
 C.化疗前 1 小时进食
 D.加强口腔护理
 E.调整体位缓解疼痛不适
- 29.诊断葡萄胎最重要的辅助检查是
 A.血/尿 hCG 测定
 B.多普勒胎心听诊检查
 C.B 超检查
 D.腹部 CT 检查
 E.胸部 X 线检查
- 30.急性特发性血小板减少性紫癜治疗首选
 A.糖皮质激素
 B.脾切除
 C.免疫抑制剂
 D.输血
 E.抗感染
- 31.最能提示急性胰腺炎病情严重与预后不良的征兆是
 A.腹痛剧烈
 B.手足抽搐
 C.血糖增高
 D.代谢性碱中毒
 E.血清淀粉酶显著升高
- 32.典型水痘皮疹的特点是
 A.均为水滴样疱疹
 B.皮疹呈离心性分布
 C.首发于头面部
 D.丘疹、新旧疱疹和结痂同时存在
 E.预后留瘢痕
- 33.能保护人体防止感染乙型肝炎的是
 A.表面抗体
 B.核心抗体 IgM
 C.HBV、DNA
 D.核心抗体 IgG
 E.e 抗体
- 34.肺结核患者如高热可在有效抗结核药物治疗的同时加用
 A.抗生素
 B.退热药
 C.糖皮质激素
 D.止血药
 E.增强免疫力药物
- 35.对上呼吸道感染患儿发热的护理措

施,不正确的是

- A.保持室内温度适宜,空气清新
 - B.保证营养和水分的摄入
 - C.体温升至 38℃时,给予酒精擦浴
 - D.松解衣被,及时更换汗湿的衣物
 - E.注意观察是否有高热惊厥的发生
- 36.慢性肾衰竭尿毒症期一般不出现

- A.高钠血症
- B.高钾血症
- C.高钙血症
- D.高磷血症
- E.水肿

37.胸部损伤中最常见的是

- A.气胸
- B.血胸
- C.脓胸
- D.肋骨骨折
- E.心脏破裂

38.小夹板固定者的护理中不妥的是

- A.缚夹板的带结以不能上下移动为宜
- B.注意肢体的感觉、运动及血运
- C.抬高患肢
- D.告诉患者定时复诊
- E.可早期进行患肢功能锻炼

39.骨恶性肿瘤表现特点是

- A.病情发展缓慢
- B.无痛或轻度疼痛
- C.常以病理性骨折就诊
- D.X线摄片就可确认
- E.肿块表面皮温高及浅静脉扩张

40.根据乳腺癌淋巴转移的主要途径,护理评估应重点关注的部位是

- A.腹股沟
- B.颈下
- C.颈后
- D.颈前
- E.腋窝

41.肢体感觉障碍患者不宜

- A.使用热水袋

B.睡于软床上

- C.经常翻身
- D.用乙醇按摩
- E.用温水擦浴

42.对新生儿黄疸健康教育的叙述,错误的是

- A.保管患儿衣物时勿放樟脑丸
- B.母乳性黄疸的患儿须中断母乳喂养
- C.保持患儿大便通畅
- D.红细胞 G-6-PD 缺陷的患儿,忌食蚕豆

蚕豆

E.有后遗症的患儿,给予康复治疗和功能锻炼

43.肺炎球菌肺炎患者的典型临床症状不包括

- A.寒战、高热
- B.咳嗽
- C.咳铁锈色痰
- D.胸痛
- E.腹胀

44.连枷胸、开放性气胸、张力性气胸、血胸均可出现的表现是

- A.纵隔移位或摆动
- B.血压骤降
- C.极度呼吸困难
- D.高热
- E.心跳骤停

45.呼吸衰竭发生时最早因缺氧发生损害的组织器官是

- A.肝脏
- B.心脏
- C.肾脏
- D.肺脏
- E.大脑

46.对流行性腮腺炎腮肿的护理,不合适的措施是

- A.肿胀处可冷敷
- B.腺肿处可用醋调青黛散外敷
- C.宜进食易消化的软食

- D.保持口腔清洁,餐后漱口
E.进食酸性食物以促进食欲
- 47.HBsAg(+)、HBeAg(+)说明此患者
A.无传染性
B.具有免疫力
C.病情比较稳定
D.乙型肝炎恢复期
E.具有传染性
- 48.猩红热的临床特点应除外
A.全身皮肤弥漫性密集红色小丘疹
B.口腔颊黏膜有柯氏斑
C.草莓舌
D.口周苍白圈
E.帕氏线
- 49.有机磷农药中毒时,瞳孔的变化是
A.瞳孔缩小
B.瞳孔扩大
C.瞳孔形状不规则
D.瞳孔不等大
E.瞳孔忽大忽小
- 50.骨科颅骨牵引术适用于
A.胸椎骨折
B.腰椎骨折
C.颅骨骨折
D.颈椎骨折
E.颈椎病
- 51.食管癌手术患者的护理过程中错误的是
A.注意口腔卫生
B.术前做胃肠道准备
C.术后保持胃肠减压通畅
D.术后胃肠蠕动恢复后即可进食
E.注意并发吻合口瘘
- 52.骨肉瘤的特点是
A.以骨质破坏为主
B.干骺端骨性突起,有蒂或杵状
C.Codman 三角
D.X线片可见葱皮状骨膜反应
E.X线片可见肥皂泡样骨质破坏阴影
- 53.糖尿病酮症酸中毒患者血糖可高达
A.7.0~11.0 mmol/L
B.11.0~16.7 mmol/L
C.16.7~33.3 mmol/L
D.33.3~55.5 mmol/L
E.55.5 mmol/L 以上
- 54.帕金森病的高发人群为
A.老年男性
B.学龄儿童
C.老年女性
D.婴幼儿
E.青年
- 55.患者,男性,46岁。患尿毒症2年。血常规示 RBC $2.35 \times 10^{12}/L$, Hb 70 g/L。导致该患者贫血的最主要原因是
A.出血
B.低蛋白
C.促红细胞生成素缺乏
D.缺铁
E.叶酸缺乏
- 56.患儿,女性,6岁。确诊为室间隔缺损,需做扁桃体切除术,医嘱用抗菌药物,下列哪项为用药的主要目的
A.预防扁桃体周围脓肿
B.预防支气管炎
C.预防感染性心内膜炎
D.预防肺炎
E.预防变态反应性疾病
- 57.患者,男性,60岁。反复发作心前区闷痛,医生诊断为心绞痛。护士指导患者用硝酸甘油缓解心绞痛的正确方法是
A.温开水送服
B.直接吞服
C.置于舌下含化
D.研碎后吞服
E.药物与食物同服
- 58.2岁小儿,体检结果示体重 10 kg,身高 81 cm,腹壁皮下脂肪厚度 0.6 cm,皮肤稍苍白。对该小儿进行营养评价,结果应为

- A. 营养良好
B. 轻度营养不良
C. 中度营养不良
D. 重度营养不良
E. 营养过剩
59. 某新生儿出生时无呼吸, 心率低于 90 次/分, 全身苍白, 四肢瘫软。清理呼吸道后的下一步抢救措施是
- A. 药物治疗
B. 保暖
C. 胸外按压
D. 建立呼吸, 增加通气
E. 建立静脉通路
60. 患者, 男性, 36 岁。诊断为十二指肠溃疡, 现疼痛节律消失, 餐后腹痛伴呕吐, 呕吐物为宿食, 错误的护理措施是
- A. 禁食水
B. 连续胃肠减压
C. 静脉补液
D. 观察呕吐物情况
E. 餐前洗胃
61. 患者, 男性, 36 岁。十二指肠溃疡病史 3 年, 喜饮酒。因工作忙加班数日, 突感上腹疼痛加剧, 排黑便 2 次, 伴头晕、面色苍白、出冷汗、四肢乏力, 首先考虑的诊断是
- A. 急性胰腺炎
B. 急性肠胃穿孔
C. 急性肠梗阻
D. 肠系膜动脉栓塞
E. 上消化道出血
62. 患者, 女性, 45 岁。因餐后腹痛住院, 拟诊为急性水肿性胰腺炎行保守治疗。护士告知患者行胃肠减压的主要目的是
- A. 减轻腹胀
B. 防止恶心、呕吐
C. 减少胰液分泌
D. 预防感染
E. 防止胰液逆流
63. 患者, 男性, 71 岁。慢性咳嗽、咳痰 20 年。偶感风寒后, 出现发热, 呼吸困难, 咳大量脓性痰, 口唇发绀, 查血气分析结果为 PaCO_2 53 mmHg, PaO_2 61 mmHg, 给予吸氧治疗。此时吸氧流量应为
- A. 1~2 L/min
B. 2~3 L/min
C. 3~4 L/min
D. 4~5 L/min
E. 5~6 L/min
64. 患者, 女性, 78 岁。慢性肺源性心脏病 2 年。目前喘憋明显, 烦躁不安。治疗应慎用镇静剂是为了避免
- A. 洋地黄中毒
B. 双重感染
C. 低血钾
D. 诱发肺性脑病
E. 加重心力衰竭
65. 患者, 男性, 78 岁。肺气肿病史 5 年, 近日因感染出现痰多, 不易咳出, 常有头痛、烦躁, 神志恍惚, 白天嗜睡, 夜间失眠, 晨间护理时发现患者神志淡漠, 间歇性抽搐, 查体: 球结膜水肿。应考虑出现
- A. 窒息先兆
B. 呼吸性酸中毒
C. 肺性脑病
D. 休克早期
E. 肺感染
66. 患儿, 男性, 3 岁。自出生后 8 个月起出现青紫并逐渐加重, 生长发育明显落后于同龄儿, 杵状指(趾), 喜蹲踞, 该患儿最易出现下列哪种并发症
- A. 呼吸道感染
B. 感染性心内膜炎
C. 脑栓塞、脑脓肿
D. 心力衰竭
E. 贫血
67. 患者, 男性, 62 岁。高血压病史 15 年, 吸烟史 20 年, 体胖。血压为 160/95 mmHg。其行为需要护士矫正的是

- A. 高热量饮食
- B. 适量运动
- C. 足够睡眠
- D. 戒烟
- E. 应用降压药

68. 9 岁男孩, 因误吸笔帽急诊入院, 术前患儿活动时突然剧烈咳嗽, 口唇及颜面紫绀明显。护士应立即采取的措施是

- A. 通知医生
- B. 吸氧
- C. 用力叩击患儿背部
- D. 将患儿扶回病床
- E. 进行心电监测

69. 患者, 女性, 62 岁。心前区压榨性疼痛 3 小时伴冷汗、恐惧来院急诊, 为明确诊断首选的检查是

- A. 心电图
- B. 心脏超声
- C. 冠状动脉造影
- D. 胸部 X 线片
- E. 血脂测定

70. 患者, 男性, 60 岁。患左下肢静脉曲张 20 年, 行大隐静脉高位结扎术后 3 小时起立行走时, 小腿处伤口突然出血不止, 紧急处理应为

- A. 就地站立位包扎
- B. 抗感染治疗
- C. 手术治疗
- D. 平卧抬高患肢, 加压包扎
- E. 物理治疗

71. 患者, 男性, 56 岁。冠心病、心绞痛 5 年。3 小时前发生心前区剧烈疼痛, 服用硝酸甘油 3 片未缓解, 急诊入院。心电图检查发现 ST 段弓背向上抬高, 随后相应导联出现病理性 Q 波, 血压 88/55 mmHg, 心率 108 次/分, 律齐。入监护室观察治疗, 经用药后疼痛缓解。2 小时后心电监测示血压 70/50 mmHg, 心率 118 次/分, 患者烦躁不安, 皮肤湿冷。此时最可能发生了

- A. 脑出血
- B. 室壁瘤破裂
- C. 心源性休克
- D. 心律失常
- E. 心力衰竭

72. 患儿, 6 个月。腹股沟部有一肿块, 哭闹时变大, 安静睡觉时消失。诊断为腹股沟斜疝, 其治疗原则是

- A. 急诊手术
- B. 限期手术
- C. 择期手术
- D. 禁忌手术
- E. 暂不手术

73. 患者, 男性, 27 岁。因右上腹阵发性疼痛 2 天入院, 医生在检查时发现墨菲征阳性, 提示该患者可能患

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 胆总管结石
- D. 胃十二指肠溃疡穿孔
- E. 肝脾破裂

74. 患者, 女性, 40 岁。毛绒玩具车间工人, 有哮喘史 5 年。防止哮喘发作最有效的方法是

- A. 脱离变应原
- B. 药物治疗
- C. 免疫治疗
- D. 对症治疗
- E. 长期治疗

75. 患者, 女性, 50 岁。右上腹绞痛 3 小时, 诊断为胆囊结石, 为控制胆绞痛, 最有效的止痛法是肌内注射

- A. 阿尼利定(安痛定)
- B. 苯巴比妥钠
- C. 吗啡及阿托品
- D. 阿托品及哌替啶
- E. 地西洋

76. 护士查房时观察到一急性胰腺炎患者, 阵发性的肌肉抽搐, 最可能的原因是

A. 营养失调导致

B. 疼痛反应

C. 低钙反应

D. 精神高度紧张导致

E. 使用哌替啶后的正常反应

77. 患儿, 8 个月。因肺炎入院, 突然烦躁不安、发绀且进行性加重。体检: R 60 次/分, P 170 次/分, 心音低钝, 两肺布满细湿啰音, 诊断为肺炎合并心力衰竭。该患儿首先采取的护理措施是

A. 超声雾化吸入

B. 限制水、钠摄入量

C. 设法让患儿安静

D. 患儿取右侧卧位

E. 清理患儿呼吸道

78. 患者, 男性, 69 岁。因头痛、头晕 1 周加重 3 天伴视力模糊住院。血压 180/110 mmHg, 脉搏 98 次/分, 眼底检查发现棉絮状渗出, 心电图有心室肥大, 首要的护理措施是

A. 硝酸甘油静注

B. 硝酸甘油舌下含服

C. 静注西地兰

D. 静注利尿剂

E. 甘露醇快速静滴

79. 患者, 女性, 50 岁。因胸闷胸痛持续发作、手足搐搦 2 小时急诊入院, 入院诊断急性前壁心肌梗死, 1 小时后因病情严重恶化死亡。最可能的死因是

A. 脑出血

B. 呼吸衰竭

C. 心源性休克

D. 心功能衰竭

E. 心律失常

80. 患者, 男性, 40 岁。因右下肢大隐静脉曲张行大隐静脉高位结扎加剥脱术。术后护士指导其使用弹力绷带的正确方法是

A. 包扎前应下垂下肢

B. 手术部位的弹力绷带应缠绕得更紧

C. 包扎后应能扪及足背动脉搏动

D. 由近心端向远心端包扎

E. 两圈弹力绷带之间不能重叠

81. 患者, 男性, 28 岁。工作中右手食指被电锯切割离断, 立即将其送到医院行断肢再植。其断指的保存方式应该用无菌纱布包好, 放入干净的塑料袋后再置于

A. 干燥冷藏容器中

B. 新洁尔灭中

C. 酒精中

D. 生理盐水中

E. 与冰块直接接触的加盖容器中

82. 患者, 男性, 55 岁。患有慢性胃炎和关节炎, 服用布洛芬。近日因关节疼痛加重, 自行加服布洛芬。1 日前, 出现恶心、腹痛、食欲下降, 此时首先应采取的措施是

A. 禁用抑酸剂

B. 禁食

C. 服用硫糖铝

D. 停用布洛芬

E. 食用流质饮食

83. 患者, 女性, 55 岁。腹痛、腹泻、消瘦 2 个月。大便呈糊状, 有黏液脓血, 每天 3~4 次。无发热、午后潮热及不洁食物摄入情况。腹部 X 线显示多发性浅龛影及小充盈缺损。为明确诊断进一步要做的检查是

A. MRI 检查

B. 大便细菌培养

C. 粪便检查

D. X 线钡餐检查

E. 结肠镜检查

84. 患者, 男性, 32 岁。因胆道蛔虫采用纤维十二指肠镜取虫术, 除术前需禁食 12 小时外, 检查前 3 天应选择的饮食是

A. 低脂饮食

B. 高脂饮食

C. 禁食

D. 半流质饮食

E. 流质饮食

85. 患者, 男性, 55 岁。患肝炎后肝硬化

合并肝性脑病住院。经治疗后神智转清,可逐步增加蛋白饮食,但短期内蛋白质不能超过

- A. 20~30 g/d
- B. 40~50 g/d
- C. 60~70 g/d
- D. 80~90 g/d
- E. 100 g/d

86.患者,男性,45岁。行胆总管切开取石、T管引流术,术后第3天,护士查房时发现T管无胆汁流出,患者诉腹部胀痛。首先应

- A. 用无菌生理盐水冲洗T管
- B. 检查T管是否受压扭曲
- C. 用注射器抽吸T管
- D. 准备T管造影
- E. 继续观察,暂不处理

87.患者,男性,55岁。某晚参加宴会后次晨发现已死亡,检验发现床上有少量咖啡色血液,左侧腰腹部有大片青紫斑,可能的死因是

- A. 急性心肌梗死
- B. 重症急性胰腺炎
- C. 胃溃疡出血
- D. 高血压脑出血
- E. 高血压脑梗死

88.患者,女性,53岁。因突起意识障碍伴右侧肢体瘫痪入院。查体:呼之不应,压眶有痛苦表情,角膜反射及瞳孔对光反射存在。护士判断该患者意识状态为

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 意识模糊
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

89.患者,女性,36岁。诊断为支气管扩张。咳嗽,咳痰,痰量60 mL/d,最应采取的护理措施是

- A. 提供通风良好的病室环境

B. 指导患者大量饮水

C. 采取体位引流

D. 机械吸痰

E. 鼓励患者进行有效咳嗽

90.患儿,5个月。哭闹时右腹股沟部出现一肿块,安静时肿块消失,诊断为右腹股沟斜疝,目前的治疗原则是

- A. 紧急手术
- B. 择期手术
- C. 暂不手术
- D. 早期手术
- E. 限期手术

91.患者,男性,28岁。肛管手术后行温水坐浴的温度为

- A. 36~38℃
- B. 39~41℃
- C. 30~35℃
- D. 37~40℃
- E. 43~46℃

92.患者,女性,46岁。右上腹疼痛伴发热3天就诊,检查:体温38.5℃,血压正常,巩膜轻度黄染,右上腹有轻压痛,首选的辅助检查是

- A. B超
- B. 静脉胆道造影
- C. 口服胆囊造影
- D. 经皮肝穿刺胆道造影
- E. 经内镜逆行胆胰管造影

93.患者,女性,48岁。肥胖1年,伴月经减少,面部、背部痤疮。体格检查:血压160/110 mmHg,腹下侧、臀部、大腿见紫纹。实验室检查:皮质醇昼夜分泌节律消失,糖耐量减低。诊断最可能为

- A. 单纯性肥胖症
- B. 2型糖尿病
- C. 肥胖生殖无能症
- D. Cushing综合征
- E. 甲状腺功能减退症

94.孕妇,孕5周,突感左下腹隐痛,近

5 个小时未缓解,急诊就医,体检:阴道后穹隆饱满,宫颈举痛(+),考虑异位妊娠,需做辅助检查,首选简单可靠的方法是

A.阴道后穹隆穿刺

B.妊娠试验放免法

C.腹腔镜检查

D.X 线腹部平片

E.B 型超声波检查

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题,请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(95~96 题共用题干)

初孕妇,30 岁。平素月经规律,妊娠 36 周,2015 年 3 月 2 日来医院做产前检查。

95.正常情况下,该孕子宫底高度应在

A.耻骨联合上 2~3 横指

B.脐耻之间

C.脐上 3 横指

D.脐与剑突之间

E.剑突下 2 横指

96.下次预约检查时间为

A.2015 年 3 月 9 日

B.2015 年 3 月 11 日

C.2015 年 3 月 13 日

D.2015 年 3 月 14 日

E.2015 年 3 月 16 日

(97~100 题共用题干)

患者,女。20 岁,因近 1 个月脾气急躁,怕热,多汗,多食,失眠去医院就诊,查体:甲状腺 I 度肿大,两手颤抖,眼球有轻度突出,心率 90 次/分。实验室检查: T_3 6.5 mmol/L, T_4 263 mmol/L,均高于正常水平。

97.该患者最可能的诊断是

A.甲状腺癌

B.地方性甲状腺肿

C.甲状腺功能亢进

D.甲状腺功能亢进性心脏病

E.生理性甲状腺肿

98.该患者的最佳治疗方法是

A.心得安治疗

B.甲巯咪唑治疗

C.普萘洛尔治疗

D.放射性治疗

E.手术治疗

99.应用此治疗期间,应观察的不良反

应是

A.甲状腺功能低下

B.声音嘶哑

C.骨质疏松

D.粒细胞减少

E.红细胞减少

100.患者出现上述不良反应时,正确的

护理措施是

A.预防感染

B.给予清咽片

C.给予含钙丰富的饮食

D.补充甲状腺素

E.给予含铁丰富的饮食

(101~104 题共用题干)

患者,女,35 岁。既往月经规律,经量正常,身体健康。本月 11 日月经来潮,15 日月经干净,9 月 16 日来院,要求避孕,拟放置宫内节育器避孕。

101.放置的时间应为本月

A.18~22 日

B.22~24 日

C.24~26 日

D.26~28 日

E.28~30 日

102.放置时受术者应采取的体位为

A.半卧位

B.膝胸卧位

C.膀胱截石位

D.左侧卧位

E.右侧卧位

103. 指导患者术后第一次复查时间为术后

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 4 个月
- E. 5 个月

104. (假设信息) 放置宫内节育器 2 个月来, 患者月经量增多, 电话咨询, 护士恰当的措施为

- A. 建议来院就诊, 药物治疗
- B. 建议取出宫内节育器, 更换合适节育器
- C. 建议取出宫内节育器, 改用口服避孕药
- D. 建议取出宫内节育器, 改用避孕针
- E. 建议取出宫内节育器, 改用绝育术 (105~106 题共用题干)

患者, 女性, 17 岁。学习游泳不慎误入深水区域溺水, 经抢救出水, 发现心跳、呼吸已停。

105. 现场首要的处理是

- A. 送往医院
- B. 拨打急救电话
- C. 清理呼吸道积水
- D. 口对口人工呼吸
- E. 胸外心脏按压

106. 下一步的处理是

- A. 拨打急救电话
- B. 送往医院
- C. 立即心肺复苏
- D. 寻找患者家人
- E. 观察患者情况

(107~108 题共用题干)

初孕妇, 29 岁, 孕 18 周。产前检查骨盆外测量: 髂棘间径 24 cm, 髂嵴间径 25 cm, 骶耻外径 18 cm, 坐骨棘间径 7.5 cm, 坐骨结节间径 5.5 cm。

107. 该孕妇骨盆类型属于

- A. 扁平骨盆
- B. 漏斗骨盆
- C. 均小骨盆
- D. 畸形骨盆
- E. 倾斜骨盆

108. 此类骨盆分娩时易出现

- A. 胎膜早破
- B. 潜伏期延长
- C. 跨耻征阳性
- D. 胎头衔接受阻
- E. 持续性枕横位或枕后位

(109~110 题共用题干)

患者, 男, 67 岁。因心前区疼痛 3 小时, 呈压榨样, 伴冷汗, 恐惧来院就诊。

109. 目前该患者需要立即进行的检查是

- A. 肺功能检查
- B. 血常规
- C. 心电图检查
- D. 超声心动图
- E. CT

110. 根据目前病情, 暂不需要处理的是

- A. 测体温
- B. 心电监护
- C. 护理评估
- D. 血液生化检查
- E. 胸部 X 线检查

(111~113 题共用题干)

患者, 女, 38 岁。长期大量饮酒。昨日酗酒酒后上腹剧烈疼痛并向腰部放射, 伴阵发性加剧, 体温 38.8 °C, 血压 80/50 mmHg。初步考虑为急性胰腺炎。

111. 为明确诊断, 应做哪项检查

- A. 血清转氨酶
- B. 血肌酐
- C. 血淀粉酶
- D. 血磷酸肌酸激酶
- E. 血沉

112. 治疗过程中患者血压降至 80/50 mmHg, 最可能的原因是

- A. 合并感染
- B. 食道静脉破裂
- C. 伴胃溃疡
- D. 出血坏死
- E. 上感

113. 护士指导患者禁食、禁水的目的是

- A. 避免引起胃炎
- B. 减少胃酸、胰液分泌
- C. 减轻疼痛
- D. 减轻腹胀
- E. 避免感染

(114~115 题共用题干)

患者,女性,31岁。一次与人发生口角,对方声音洪亮,患者自感不是对手。第二天起出现无法说话,与之交谈只能用手势表示。能正常咳嗽,耳鼻喉、脑部 MRI 检查均无异常。

114. 考虑该患者为

- A. 缄默
- B. 违拗症
- C. 躯体化障碍
- D. 强迫症
- E. 癔症

115. 护理该患者时最应注意

- A. 转移注意力
- B. 建立良好的关系
- C. 协助患者料理生活
- D. 运用良好的沟通技巧
- E. 医、护高度保持一致

(116~118 题共用题干)

患者,男,69岁。前列腺肥大压迫尿道,造成排尿受阻,出现尿潴留。

116. 下列描述与之不相符的是

- A. 膀胱容积可增至 3 000~4 000 mL
- B. 膀胱高度膨胀,可到脐部

- C. 耻骨上可扪及囊样包块,叩诊呈鼓音
- D. 局部有压痛

E. 患者主诉下腹胀痛,排尿困难

117. 护士采取的护理措施中,错误的是

- A. 安慰患者,消除其焦虑和紧张情绪
- B. 病情允许,用力按压,协助排尿
- C. 热敷、按摩

D. 针刺中极、曲骨、三阴交穴等,刺激排尿

E. 听流水声或用温水冲洗会阴

118. 上述正确的处理仍不能解除潴留,为患者行导尿术,操作中正确的是

A. 初步消毒,先消毒尿道口、龟头、冠状沟

B. 插管时,提起阴茎与腹壁成 40°角

C. 使耻骨前弯消失

D. 将尿管轻轻插入尿道 10~15 cm,见尿再插入 1~2 cm

E. 第一次放尿不得超过 500 mL

(119~120 题共用题干)

患者,女,53岁。诊断为子宫肌瘤,拟行次全子宫切除术,患者得知病情后沉默寡言,情绪低落,时不时浮现出轻生念头。

119. 患者目前的心理反应主要为

- A. 震撼
- B. 矛盾
- C. 焦虑
- D. 抑郁
- E. 恐惧

120. 此时首要的护理措施为

- A. 继续观察
- B. 心理护理
- C. 止血
- D. 改善睡眠状态
- E. 尽快术前准备