

临 床 执 业 医 师 资 格 考 试

押 题 密 卷

全 真 模 考

第一单元

一、A1型题

1. 具有缓解胃肠痉挛作用的自主神经递质受体阻断剂是
 - A. 阿替洛尔
 - B. 阿托品
 - C. 酚妥拉明
 - D. 育亨宾
 - E. 筒箭毒碱
2. 《精神卫生法》规定承担精神障碍患者再次诊断的精神科执业医师人数是
 - A. 5人
 - B. 2人
 - C. 4人
 - D. 1人
 - E. 3人
3. 医务人员特别是护理人员最常见的安全事件是
 - A. 化学伤害
 - B. 锐器伤
 - C. 生物伤害
 - D. 电离辐射
 - E. 中毒
4. 在生产过程中形成的呼吸性粉尘是指
 - A. 能随呼吸进入人体并沉积于呼吸道的粉尘
 - B. 分散度较小的粉尘
 - C. 直径小于 5 μ m 的粉尘
 - D. 分散度较大的粉尘
 - E. 直径小于 15 μ m 的粉尘
5. 不属于地塞米松药理作用的是
 - A. 刺激骨髓造血功能
 - B. 抑制毛细血管和成纤维细胞增生
 - C. 增强机体对细菌内毒素的耐受力
 - D. 抑制体内环氧化酶
 - E. 稳定溶酶体膜
6. 反复输血的个体进行实体器官移植时易发生的现象是
 - A. 异种移植排斥反应
 - B. 慢性排斥反应
 - C. 超急性排斥反应
 - D. 自体移植排斥反应
 - E. 急性排斥反应
7. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎中增生的主要细胞是
 - A. 肾小球周围的成纤维细胞及系膜细胞
 - B. 肾球囊壁层上皮细胞及毛细血管内皮细胞

- C. 肾小球毛细血管内皮细胞及系膜细胞
 - D. 肾球囊脏层上皮细胞及系膜细胞
 - E. 肾球囊脏层上皮细胞及壁层上皮细胞
8. 肿瘤细胞被细胞毒性 T 细胞杀伤的关键条件是
- A. 表达黏附分子
 - B. 表达 MHC I 类分子
 - C. 表达 CD 分子
 - D. 分泌细胞因子
 - E. 表达 MHC II 类分子
9. 卫生服务反应性中的“对人的尊重”包括
- A. 尊严、自主性和保密性
 - B. 尊严、及时性和社会支持
 - C. 社会支持、及时性和保密性
 - D. 社会支持、自主性和保密性
 - E. 自主性、保密性和及时性
10. 两样本均数比较的 t 检验，差别有统计学意义时，P 越小，说明
- A. 两总体均数的差别不大
 - B. 两总体均数的差别越大
 - C. 越有理由认为两总体均数的差别很大
 - D. 越有理由认为两样本均数不同
 - E. 越有理由认为两总体均数不同
11. 糖尿病一般不会出现的血管病变是
- A. 玻璃样变性
 - B. 淀粉样变性
 - C. 纤维素样坏死
 - D. 纤维化
 - E. 钙化
12. 成熟红细胞利用葡萄糖的主要代谢途径是
- A. 磷酸戊糖途径
 - B. 无氧酵解
 - C. 有氧氧化
 - D. 三羧酸循环
 - E. 糖原分解
13. 不引起肉芽肿性炎的病原体是
- A. 结核杆菌
 - B. 痢疾杆菌
 - C. 麻风杆菌
 - D. 梅毒螺旋体
 - E. 伤寒杆菌
14. 与血浆凝固酶阴性葡萄球菌无关的疾病是
- A. 食物中毒
 - B. 败血症
 - C. 股骨头置换术后感染
 - D. 急性膀胱炎

- E. 细菌性心内膜炎
15. 属于酪氨酸衍生物的物质是
- A. 组胺
 - B. 精胺
 - C. 腐胺
 - D. 5-羟色胺
 - E. 多巴胺
16. 青霉素 G 的主要不良反应是
- A. 肾损害
 - B. 过敏
 - C. 听力减退
 - D. 肝损害
 - E. 胃肠道反应
17. 根据《放射诊疗管理规定》，非特殊需要，不得对受孕一定时间段的育龄妇女进行下腹部放射影像检查。该时间段是
- A. 受孕后 28-34 周
 - B. 受孕 34-36 周
 - C. 受孕后 8~15 周
 - D. 受孕后 36-38 周
 - E. 受孕后 16~28 周
18. 我国社区卫生服务体系建设内不包括
- A. 坚持公益性质，完善社区卫生服务功能
 - B. 建设大型综合医院
 - C. 加强社区卫生服务队伍建设与完善社区卫生服务运行机制
 - D. 建立社区卫生服务机构与预防保健机构、医院合理的分工协作关系
 - E. 坚持政府主导、鼓励社会参与，建立健全社会卫生服务网络
19. 医疗机构为预防传染病院内传播应承担的职责是
- A. 实施传染病预防控制规划
 - B. 收集和分析传染病疫情信息
 - C. 对传染病预防工作进行指导
 - D. 流行病学调查
 - E. 医疗废物处置
20. 对于大多数在小学里学习成绩中等的孩子而言，可以判断其智力水平处于正常范围，这一心理健康判断的角度为
- A. 文化学角度
 - B. 社会学角度
 - C. 人类学角度
 - D. 统计学角度
 - E. 病理学角度
21. 帕金森病的主要发病原因是
- A. 黑质-纹状体多巴胺通路受损
 - B. 纹状体受损
 - C. 丘脑底核受损
 - D. 大脑皮层-纹状体回路受损

F. 大脑皮层运动区受损

22. 对收受药品生产经营企业或其代理人财物且情节严重的医师，卫生计生行政部门应当作出的处理是

- A. 注销执业证书
- B. 暂停执业活动
- C. 吊销执业证书
- D. 记过
- E. 警告

23. 不属于氯丙嗪临床应用的选项是

- A. 精神分裂症
- B. 感染中毒性精神病
- C. 顽固性呃逆
- D. 洋地黄引起的呕吐
- E. 前庭刺激所致晕动症

24. 患者表现平静，客观面对患病现实，关注自身疾病，遵行医嘱所体现的患者角色行为类型为

- A. 角色行为冲突
- B. 角色行为减退
- C. 角色行为缺失
- D. 角色行为异常
- E. 角色行为适应

25. 医学人文道德观的基本内容不包括

- A. 尊重患者的平等医疗保健权
- B. 消除或减轻影响患者健康的危险因素
- C. 对患者尽量使用高新技术
- D. 尊重患者的人格
- E. 尊重患者的生命

26. 根据心身疾病的定义，以下不属于心身疾病的是

- A. 原发性高血压
- B. 腹股沟斜疝
- C. 神经性皮炎
- D. 消化性溃疡
- E. 支气管哮喘

27. 医学伦理学中尊重原则所涵盖的权利不包括

- A. 自主选择权
- B. 社会免责权
- C. 个人隐私权
- D. 知情同意权
- E. 人格尊严权

28. 原发性高血压时细动脉可逆性病理改变是

- A. 血管壁平滑肌萎缩
- B. 血管纤维化
- C. 血管痉挛
- D. 内膜下蛋白性物质沉积
- E. 血管腔狭窄

29. 属于第二级预防措施的是
- A. 遗传咨询
 - B. 疾病筛检
 - C. 病后康复
 - D. 健康促进
 - E. 疫苗接种
30. 医学心理学对于健康和疾病的基本观点不包括
- A. 认知评价的观点
 - B. 个性特征作用的观点
 - C. 情绪因素作用的观点
 - D. 被动适应的观点
 - E. 心身统一的观点
31. 构成传染病流行过程的必备因素有
- A. 宿主, 环境, 病因
 - B. 传染源, 传播途径, 易感人群
 - C. 寄生虫, 中间宿主, 终末宿主
 - D. 社会因素, 自然因素, 遗传因素
 - E. 病原体及机体
32. “水平膳食宝塔”提示, 每日每人大豆类摄入量相当于干豆的 50g, 其目的主要是
- A. 保证膳食纤维摄入
 - B. 保证水苏糖的摄入
 - C. 提高必需脂肪酸的摄入水平
 - D. 提高膳食蛋白质质量
 - E. 补充人体必需氨基酸
33. 确定食物中毒的可疑食物主要是根据
- A. 在同一场所同一时间未发病者未进食的食物
 - B. 潜伏期最短者
 - C. 患者的潜伏期特有的中毒症状
 - D. 患者的潜伏期呕吐物和排泄物
 - E. 发病者的临床症状
34. 有关生物转化作用的描述, 错误的是
- A. 有些物质经过生物转化毒性增强
 - B. 肝是进行生物转化的最重要器官
 - C. 使非极性物质的极性增强
 - D. 生物转化的实质是裂解生物活性物质
 - E. 使疏水性物质水溶性增加
35. 当样本含量固定时, 第一类错误 α 和第二类错误 β 的关系为
- A. α 愈大, β 可能愈大
 - B. $\alpha > \beta$
 - C. $\alpha < \beta$
 - D. α 愈大, β 可能愈小
 - E. $\alpha = \beta$
36. 下列关于酶促反应调节的叙述, 正确的是
- A. 温度越高反应速度越快

- B. 反应速度不受底物浓度的影响
 - C. 底物饱和时，反应速度随酶浓度增加而增加
 - D. 在最适 pH 下，反应速度不受酶浓度影响
 - E. 反应速度不受酶浓度的影响
37. 不属于 HIV 传播途径的是
- A. 母婴传播
 - B. 性接触
 - C. 器官移植
 - D. 呼吸道传播
 - E. 输血
38. 肺癌最常见的转移部位是
- A. 脾
 - B. 脑
 - C. 肠
 - D. 胃
 - E. 肾
39. 医疗机构保存住院病历的最低期限是
- A. 30 年
 - B. 15 年
 - C. 20 年
 - D. 50 年
 - E. 10 年
40. 实施主动安乐死的首要社会条件是
- A. 家属的主动要求
 - B. 安乐死的合法化
 - C. 患者的主动要求
 - D. 能够减轻患者的痛苦
 - E. 维护患者的尊严
41. 对儿童进行乙型肝炎疫苗接种的临床试验研究，为评价其流行病学预防效果，最好选用的指标是
- A. 发病率
 - B. 效果指数
 - C. 感染率
 - D. 死亡率
 - E. 病死率
42. 用阈下刺激即可诱发心肌细胞产生期前收缩的兴奋性周期时相是
- A. 绝对不应期
 - B. 相对不应期
 - C. 低常期
 - D. 局部反应期
 - E. 超常期
43. 不属于血栓结局描述的是
- A. 溶解
 - B. 钙化

- C. 软化
- D. 机化
- E. 硬化

44. 医师在诊疗活动中，不过度医疗所体现的医师行为规范是

- A. 规范行医
- B. 严格权限
- C. 救死扶伤
- D. 重视人文
- E. 规范文书

45. 属于工作相关疾病的是

- A. 职业性肿瘤
- B. 职业有关抑郁症
- C. 职业性铅中毒
- D. 职业性苯中毒
- E. 工伤

46. 卫生计生行政部门可以责令发生医疗事故的医务人员暂停其执业活动的期限是

- A. 1个月以上3个月以下
- B. 6个月以上1年以下
- C. 1年以上3年以下
- D. 3个月以上6个月以下
- E. 1年以上18个月以下

47. 属于人际水平的健康行为改变理论的是

- A. 健康信念模式
- B. 社会认知理论
- C. “知-信-行”理论
- D. 创新扩散理论
- E. 社会组织理论

48. 衰老红细胞难以通过微小血管和孔隙的主要原因是

- A. 渗透脆性增加
- B. 细胞体积增大
- C. 悬浮稳定性下降
- D. 血红蛋白减少
- E. 变形能力减退

49. 不适合接受心理治疗的疾病是

- A. 焦虑症
- B. 恐惧症
- C. 精神分裂症急性发作
- D. 强迫症
- E. 创伤后应激障碍

50. 维系蛋白质二级结构稳定的主要化学键是

- A. 盐键
- B. 氢键
- C. 疏水作用
- D. 肽键

E. 二硫键

51. 人体试验道德的首要原则是

- A. 医学目的原则
- B. 随机对照原则
- C. 信息公开原则
- D. 知情同意原则
- E. 维护受试者利益原则

52. 不属于体内甘油酯类正常生理功能的是

- A. 保持体温
- B. 传递电子
- C. 参与维生素吸收
- D. 构成生物膜
- E. 参与信息传递

53. 筛检的目的是

- A. 对可疑患者进行确诊
- B. 评价筛检试验的敏感度
- C. 验证病因
- D. 评价筛检试验的特异度
- E. 从表面健康的人群中查出某病的可疑患者或某病的高危人群

54. 依照我国《人体器官移植条例》，下列可以为直系血亲捐献肾脏的是

- A. 27 周岁的未婚男性
- B. 35 周岁的严重智力低下患者
- C. 17 周岁的健康中学生
- D. 25 周岁的乙肝患者
- E. 22 周岁的精神病患者

55. 关于真核生物 mRNA 结构的描述，错误的是

- A. 5'端有特殊的内含子
- B. 3'端有特殊的“尾”结构
- C. 3'端存在非翻译序列
- D. 5'端有特殊“帽子”结构
- G. 含有开放阅读框架区

56. 人的社会性需要不包括

- A. 劳动
- B. 求知
- C. 饮食
- D. 交往
- E. 尊重

57. 具有麻醉药品处方权的执业医师被追究法律责任的情形是

- A. 未依照规定进行麻醉药品处方专册登记
- B. 未依照规定保存麻醉药品专用处方
- C. 未依照规定储存麻醉药物
- D. 紧急借用麻醉药品后未备案
- E. 未按照临床应用指导原则使用麻醉药品

58. 食物蛋白质的营养互补作用是指

- A. 蛋白质的营养价值与脂肪酸的作用互补
 - B. 营养必需氨基酸与营养必需微量元素的互补
 - C. 营养必需氨基酸之间的互相补充
 - D. 营养必需氨基酸和非营养必需氨基酸互补
 - E. 营养物质与非营养物质的互补
59. 疾病的三间分布是指
- A. 国家、地区和城乡分布
 - B. 职业、家庭和环境分布
 - C. 短期波动、季节性和周期性分布
 - D. 年龄、性别和种族分布
 - E. 时间地区和人群分布
60. 在环境卫生评价中，剂量-反应关系是指
- A. 随暴露量增加引起个体效应严重程度不同的规律
 - B. 不同的暴露引起不同疾病的规律
 - C. 人群健康效应普遍发生的规律性变化
 - D. 暴露人群分布变化的规律
 - E. 人群发病率随暴露因素的剂量增加而呈规律性变化
61. 不属于免疫缺陷病的疾病是
- A. 慢性肉芽肿病
 - B. 艾滋病
 - C. 遗传性血管神经性水肿
 - D. 系统性红斑狼疮
 - E. X-连锁无丙种球蛋白血症
62. 母婴保健工作人员出具虚假医学证明，即使未造成严重后果，仍应承担一定的法律责任。该法律责任是
- A. 暂停执业
 - B. 行政处分
 - C. 吊销执业证书
 - D. 通报批评
 - E. 注销执业注册
63. 原发性肺结核和继发性肺结核病均可见的病理类型是
- A. 慢性纤维空洞型肺结核
 - B. 浸润性肺结核
 - C. 结核球
 - D. 局灶性肺结核
 - E. 粟粒性肺结核
64. 临床上用于判断肺通气功能的较好指标是
- A. 补吸气量/用力肺活量
 - B. 潮气量/肺活量
 - C. 无效腔量/潮气量
 - D. 用力呼气量/用力肺活量
 - E. 潮气量/功能余气量
65. 在健康信念模式中，促进个体行为改变的关键事件和暗示称为
- A. 对疾病易感性的认识

- B. 自我效能
 - C. 行为能力
 - D. 对疾病严重性的认识
 - E. 行为线索
66. 参与构成视觉细胞内感光物质的维生素是
- A. 维生素 D
 - B. 维生素 A
 - C. 维生素 B₂
 - D. 维生素 B
 - E. 维生素 C
67. 在线粒体中进行的代谢过程是
- A. 脂肪酸合成
 - B. 糖酵解
 - C. 糖原合成
 - D. 氧化磷酸化
 - E. 核糖体循环
68. 与黏膜免疫应答密切相关的免疫球蛋白是
- A. IgG
 - B. IgA
 - C. IgE
 - D. IgD
 - E. IgM
69. 可通过非特异性方式杀伤病毒感染细胞的免疫细胞是
- A. 中性粒细胞
 - B. T 细胞
 - C. B 细胞
 - D. 肥大细胞
 - E. NK 细胞
70. 某心理治疗师婉拒治疗的患者请吃饭的邀请其遵循的原则是
- A. 保密原则
 - B. 真诚原则
 - C. 关系限定原则
 - D. 回避原则
 - E. 客观中立原则
71. 由于 V2 受体缺陷引起的肾性尿崩症，其相关的水孔蛋白是
- A. AQP-4
 - B. AQP-1
 - C. AQP-2
 - D. AQP-5
 - E. AQP-3
72. 疾病检测最重要的目的是
- A. 向卫生行政部门报告某人群中某病的流行状况
 - B. 及时掌握疾病的变化趋势，采取控制措施
 - C. 收集和分析健康资料

- D. 消灭传染源
- E. 确定致病因素

73. 按照临床诊疗道德的最优化原则，医务人员不需要考虑的是

- A. 患者的地位
- B. 医疗安全
- C. 医疗效果
- D. 诊疗费用
- E. 患者的痛苦

74. 最容易发生变异的呼吸道病毒是

- A. 甲型流感病毒
- B. 副流感病毒
- C. 麻疹病毒
- D. 腮腺炎病毒
- E. 呼吸道合胞病毒

75. 最有可能引起副肿瘤综合征的肺癌类型是

- A. 小细胞癌
- B. 鳞状细胞癌
- C. 腺鳞癌
- D. 肉瘤样癌
- E. 乳头状癌

76. 与排卵后基础体温升高有关的激素是

- A. 卵泡刺激素
- B. 缩宫素
- C. 雌激素
- D. 黄体生成素
- E. 孕激素

二、A2型题

77. 男，72岁。乏力、走路不稳3个月。查体：肌张力减低，共济失调，意向性震颤，指鼻试验阳性，该患者最可能的病变部位是

- A. 小脑
- B. 皮层运动区
- C. 脑干
- D. 基底神经节
- E. 脊髓

78. 男，40岁。上腹部不适伴纳差1个月，既往体健。胃镜检查结果为黏膜相关性淋巴样组织淋巴瘤。与该病发生密切相关的病原体是

- A. 军团菌
- B. 粪肠球菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 产气肠杆菌
- E. 大肠埃希菌

79. 若用统计图直观地表示某城市在8年中肝炎的发病率随时间的变化情况，宜选择

- A. 圆图
- B. 直条图

- C. 普通线图
- D. 直方图
- E. 散点图

80. 男, 41 岁。腹泻 1 天。1 天前进食海产品后出现腹泻。大便 30 余次, 为米泔样便。查体: P110 次/分, BP80/50mmHg, 皮肤干皱, 弹性稍差, 眼窝凹陷。血常规: Hb162g/L, WBC $13.7 \times 10^9/L$, N 0.85 PLT $142 \times 10^9/L$ 该患者腹泻的发病机制是,
- A. 肠黏膜细胞内 cAMP 水平升高, 过度分泌及电解质紊乱
 - B. 胆汁分泌减少引起胃肠功能紊乱
 - C. 主要由于结肠乙状结肠肠管麻痹
 - D. 主要由于脏器的实质性损害
 - E. 与致病菌引起的侵袭性病变有关
81. 男, 18 岁。因终末肾脏病行肾脏移植手术, 其母亲为其供肾者, 这种移植类型是
- A. 同基因移植
 - B. 同种异体移植
 - C. 异种移植
 - D. 同系移植
 - E. 自体移植
82. 女, 37 岁。因阵发室上性心动过速行射频消融治疗, 术中患者突然出现胸闷、烦躁、呼吸困难。查体: BP80/70mmHg, 颈静脉怒张, 两肺呼吸音清, 心界向两侧大。心率 120 次/分, 律齐。各瓣膜听诊区未闻及杂音, 奇脉 (+)。导致其临床表现的机制是
- A. 心排血量增加, 静脉压升高
 - B. 心排血量不变, 静脉压升高
 - C. 心排血量下降, 静脉压降低
 - D. 心排血量增加, 静脉压降低
 - E. 心排血量下降, 静脉压升高
83. 某糖尿病患者为了控制血糖, 在医生的建议下准备和营养师一起定制一份饮食计划。她虽然知道饮食控制的好处, 但总认为无法管住自己, 计划难以实施。对于这样患者的干预重点是
- A. 提高自我效能
 - B. 培养行为能力
 - C. 提高结果预期
 - D. 提供社会支持
 - E. 建立支持性环境
84. 一位服用了 60 多片安定的精神病患者被送到医院急救, 患者父母表示无力承担抢救费用。按照急救伦理的要求, 医生应该选择的处理措施是
- A. 在征得患者父母同意和医院领导同意的情况下, 迅速实施抢救
 - B. 在征得患者父母同意的情况下, 放弃治疗
 - C. 放弃治疗, 让患者父母将其接回家
 - D. 向民政部门反映, 争取社会支持, 并由他们决定是否抢救
 - E. 仅给予患者家庭能够承受费用的支持疗法
85. 男, 40 岁。右下肢肿胀、剧痛 3 小时。1 天前用粪便在农田施肥时, 右足被扎伤, 半夜感胀裂样痛, 症状加重, 出现下肢肿胀, 皮肤由紫红变成黑紫、水肿有水疱。查体: 局部皮下有捻发音, 伤口处有恶臭的血性浆液渗出。最可能的致病菌是
- A. 乙型溶血性链球菌

- B. 大肠埃希菌
 - C. 表皮葡萄球菌
 - D. 梭状芽胞杆菌
 - E. 结核杆菌
86. 主治医师邱某经过抗菌药物临床应用知识和规范化管理培训并考核合格后，被授予限制使用级抗菌药物处方权。但不久，邱某因违反《抗菌药物临床应用管理办法》的相关规定，受到医院警告并限制其上述处方权。医院处理邱某的依据是
- A. 多次使用非限制使用级抗菌药物
 - B. 使用价格相对较高的抗菌药物
 - C. 在紧急情况下越级使用抗菌药物
 - D. 无正当理由开具抗菌药物超常处方 3 次以上
 - E. 在门诊使用限制使用级抗菌药物
87. 已知某省山区、丘陵、湖区婴幼儿体格发育有较大的差异，现需制定该省婴幼儿体格发育有关指标的参考值范围，抽样方法最好采取
- A. 分层抽样
 - B. 整群抽样
 - C. 系统抽样
 - D. 机械抽样
 - E. 单纯随机抽样
88. 女，43 岁。发热、咳嗽、少量脓痰 2 周。既往健康。查体未见明显异常。血常规大致正常，ESR45mm/h。胸部 X 线片示右上肺渗出性病変伴不规则空洞，无液平。为明确诊断，宜首选的检查是
- A. 痰细菌培养+药敏
 - B. 经支气管肺活检
 - C. 痰涂片抗酸染色
 - D. 痰涂片革兰染色
 - E. PPD 皮试
89. 某煤矿职工医院欲探讨二、三期矽肺患者胸部平片阴影密度级别（+、++、+++、++++）间是否不同，可选择
- A. 线性回归
 - B. 成组设计比较的秩和检验
 - C. 直线相关
 - D. 两样本 t 检验
 - E. 四个表 χ^2 检验
90. 某人因病住院 20 天，治疗费用共 53000 元，结算费用时被告知其中 50000 元以下的部分由医保支付，另外 3000 元需个人支付，该案例中的 50000 是
- A. 起付线
 - B. 封顶线
 - C. 自付线
 - D. 共同付费
 - E. 封底线
91. 女，70 岁。冠心病、高血压、糖尿病患者。近 1 个月调整用药为阿司匹林、比索洛尔、辛伐他汀、二甲双胍。近 3 天双下肢无力及疼痛，双侧足背动脉搏动一致。实验室检查：血 CK2200U/L，cTnI 0.01ng/ml，血肌酐 368 μ mol/L。出现双下肢无力及疼痛的最可能原因是

- A. 糖尿病足
 - B. 主动脉夹层
 - C. 间歇性跛行
 - D. 横纹肌溶解
 - E. 腰椎间盘突出症
92. 女，50岁。右乳头皮肤脱屑、结痂半年。去除痂皮可见糜烂样创面，刮片细胞学检查：可见大而异型、胞质透明的肿瘤细胞。这种细胞称为
- A. 镜影细胞中
 - B. L&H型细胞
 - C. 陷窝细胞
 - D. Paget细胞
 - E. 多核瘤巨细胞
93. 男45岁，右利手因头痛和言语障碍6月余就诊。头颅MRI显示左侧中央前回底部前方有占位性病变，脑膜瘤可能性大。该患者的言语障碍最可能是
- A. 失写
 - B. 失读
 - C. 感觉性失语
 - D. 传导性失语
 - E. 运动性失语
94. 男，75岁。慢性阻塞性肺疾病急性加重反复出现，抗感染治疗时，为覆盖铜绿假单胞菌，下列抗菌药物中首选的是
- A. 莫西沙星
 - B. 阿米卡星
 - C. 头孢他啶
 - D. 阿奇霉素
 - E. 阿莫西林
95. 糖尿病患者，女，65岁，家庭主妇，初中文化程度。医生给予的饮食建议，容易理解和执行的说法是
- A. “您每天摄入热量不能超过1200kcal。”
 - B. “您必须严格控制饮食，要低盐、低脂、低糖饮食。”
 - C. “每顿饭主食2两，少吃油腻的。”
 - D. “不吃甜食、稀饭、甘蔗、西瓜、甜饮料，少吃肉、油，可吃点粗粮。”
 - E. “您一定要管住自己的嘴，原来爱吃的都不能吃了。”
96. 男，16岁。阵发性心悸1年余，突发突止，发作期间心电图正常，10分钟前再次发作，心电图示快速、规则的QRS波群，形态正常，未见明显P波。急诊医师在患者右胸锁乳突肌内缘平甲状软骨水平按摩数秒钟后，心律突然恢复正常。该治疗手法的作用机制是
- A. 减弱心迷走神经紧张
 - B. 加强心迷走神经冲动
 - C. 加强心交感神经冲动
 - D. 减弱窦神经冲动
 - E. 兴奋颈动脉体
97. 男，25岁。硕士研究生毕业后参加工作。半年来对上级领导布置的任务总感觉不能胜任，屡屡出错，受到多次批评后内心受挫，选择了辞职。这种选择在应激反应中属于
- A. 认知反应

- B. 生理反应
- C. 情绪反应
- D. 行为反应
- E. 防御反应

98. 某医师为评价某新药对流感的治疗效果,共收治了 100 例流感患者,一周后治愈的有 90 例,由此认为该新药对流感疗效显著。针对此实验,正确的观点是
- A. 结论正确,因为治愈率达 90%
 - B. 结论不能肯定,因为未作重复试验
 - C. 结论不能肯定,因为未设对照组
 - D. 结论不能肯定,因为未作统计学处理
 - E. 结论不能肯定,因为实验样本含量较少
99. 男,70 岁。上腹痛一年,进食后加重,大便 10 次/天,可见脂肪滴。查体:上腹中部压痛(+)。腹部 B 超:胰腺多发钙化灶。首选的治疗药物为
- A. 钙通道阻滞剂
 - B. 质子泵抑制剂
 - C. 抗胆碱药物
 - D. 胰酶制剂
 - E. H₂受体拮抗剂
100. 男 36 岁。因上腹痛 1 年来诊。伴有胃胀、食量减少,嗝气,睡眠差。检查 X 线钡餐造影、胃镜未见异常。患者为软件工程师,最近频繁超时工作。考虑为
- A. 慢性浅表性胃炎
 - B. 慢性萎缩性胃炎
 - C. 功能性消化不良
 - D. 胃溃疡
 - E. 胃癌
101. 男,72 岁。反酸、烧心 36 年。近日呼吸困难,乏力 2 个月。间断口服质子泵抑制剂治疗,起初有效,近 2 个月效果不佳。胃镜检查示:食管下段及门区隆起溃疡性病变,质脆、易出血。最有可能的活组织检查为
- A. 淋巴瘤
 - B. 神经内分泌肿瘤
 - C. 胃肠间质瘤
 - D. 鳞癌
 - E. 腺癌
102. 男,48 岁。右季肋区疼痛 3 月。既往有乙型病毒性肝炎病史 10 年。B 超检查见肝右叶巨大肿块。血 AFP 增高。符合该肿瘤病理学特点的是
- A. 肿瘤组织间质较多
 - B. 癌细胞呈腺管状排列
 - C. 癌细胞分泌黏液且血管少
 - D. 细胞与肝细胞类似
 - E. 发生于肝内胆管上皮最多见
103. 男,55 岁,反复活动时胸痛,快步行走及上楼梯可诱发,休息可缓解。冠状动脉造影见前降支阻塞 80%。血管病变的始动环节是
- A. 内皮下泡沫细胞聚集
 - B. 内皮下胶原纤维增生

- C. 内皮下炎症细胞聚集
 - D. 内皮细胞受损及功能失调
 - E. 内皮下脂质沉积
104. 某心外科医生在实施一例先天性心脏手术之前的晚上,在自己脑海中反复想象手术的过程、路径以及手术以外的应对措施等,这种思维方式是
- A. 聚合思维
 - B. 形象思维
 - C. 发散思维
 - D. 抽象思维
 - E. 创造思维
105. 某医师从医院辞职到一家药品生产企业从事营销工作,后因事业不顺,想重回医院工作,但因其中止执业活动已满法定期限被卫生行政部门注销注册。该法定期限是
- A. 2年
 - B. 3年
 - C. 4年
 - D. 1年
 - E. 6个月
106. 男,33岁。消化性溃疡反复发作并出血3年,再出血1周,内科治疗无效,行手术治疗。术中见胃皱襞显著增厚,组织病理学检查发现明显的壁细胞增生。最可能导致上述病理改变的内源性物质是
- A. 转化生长因子- α
 - B. 促胃液素
 - C. 促胰液素
 - D. 生长抑素
 - E. 乙酰胆碱
107. 男,26岁。因人际关系问题而寻求心理治疗。被要求分享体验和自己的经验。这一心理治疗的方法属于
- A. 精神分析法
 - B. 行为疗法
 - C. 以人为中心疗法
 - D. 催眠疗法
 - E. 认知疗法
108. 女,45岁,大学教授。因车祸导致颅脑损伤,智力测验显示其智商为85,同时有一位从未接受过正规教育的老人测得智商也是85分。心理治疗师认为前者的智力出现了问题,而后者正常。这一判断所遵循的原则是
- A. 客观性原则
 - B. 中立性原则
 - C. 操作性原则
 - D. 保密性原则
 - E. 标准化原则
109. 男,68岁。恶心、上腹隐痛、呕吐少许咖啡样液体2天。高血压、血脂异常病史2年、长期口服司匹林100mg/d。胃镜检查可见胃窦黏膜多发糜烂,表面附着血性黏液。最适应的治疗药物是
- A. 多潘立酮

- B. 奥美拉唑
 - C. 枸橼酸铋钾
 - D. 硫糖铝
 - E. 法莫替丁
110. 男, 28 岁。因高位小肠瘘 1 天入院, 入院后经颈内静脉插管滴入肠外营养液, 两周后突然出现寒战、高热, 无咳嗽、咳痰, 腹部无压痛和反跳痛。首先考虑的诊断是查
- A. 肺部感染
 - B. 高渗性非酮症昏迷
 - C. 咽喉部感染
 - D. 气胸
 - E. 导管性脓毒症
111. 男, 32 岁。曾患急性附睾炎, 治疗不彻底, 总感觉阴囊轻度不适, 休息后好转。检查发现附睾局限性增厚及肿大。下列治疗错误的是
- A. 托起阴囊
 - B. 热敷
 - C. 热水坐浴
 - D. 理疗
 - E. 附睾切除
112. 男, 56 岁。因“肺部感染、休克”入监护室治疗。血气分析提示该患者“代谢性酸中毒, I 型呼吸衰竭”为保护患者组织供氧, 此时不宜快速纠正酸中毒, 其主要原因在于酸中毒时
- A. 组织氧摄取能力增加
 - B. 血红蛋白结合氧增加
 - C. 肺部获得更多的氧
 - D. 组织氧耗量减少
 - E. 氧解离曲线右移
113. 某中年男性因突发急症在大街上摔倒并昏迷, 由路人送至附近医院, 被确诊为脑出血, 急需手术, 但医务人员无法联系到其亲属。在此情况下, 可以决定为其急诊手术的人员是
- A. 医院所在地民政部门负责人
 - B. 医院所在地派出所负责人
 - C. 为其接诊医师的上级医师
 - D. 院长或其授权人
 - E. 术者及麻醉师
114. 男 37 岁。右下胸部撞伤 6 小时, 伤后感上腹部疼痛, 头晕。查体: 血压 90/70mmHg, 心率 110 次/分, 面色苍白, 右腹部压痛、反跳痛、肌紧张较明显。X 线透视示肝阴影扩大、右膈抬高。首先应考虑的诊断是
- A. 外伤性血气胸
 - B. 肝破裂
 - C. 右肾破裂
 - D. 结肠肝曲破裂
 - E. 胃十二指肠穿孔
115. 女, 79 岁。咳嗽、咳痰 30 年, 气促 10 年, 加重 5 天, 查体: 桶状胸, 呼气相延长, 血气分析提示: pH7.32, PaO₂55mmHg, PaCO₂54mmHg, 该患者的发病机制不包括
- A. 阻塞性肺通气功能障碍
 - B. 弥散功能障碍

- C. 无效腔增加
- D. 限制性通气功能障碍
- E. 通气/血流比例失衡

116. 女, 18 岁。持续发热 10 天, 于 9 月 2 日来诊, 体温逐日升高, 伴乏力, 纳差。查体: T39.8℃, P80 次/分, 精神差, 腹部可见 6 个充血性皮疹, 腹部胀气, 脾肋下可及。实验室检查: 血 WBC $3.7 \times 10^9/L$, 此患者所患疾病的主要病理特点是

- A. 基本病变是小血管炎
- B. 全身单核-巨噬细胞系统增生性反应
- C. 小肠黏膜苍白、水肿
- D. 主要病变在淋巴结和胸腺
- E. 肠黏膜呈弥漫性纤维蛋白渗出性炎症

三、A3/A4型题

(117~119 题共用题干)

女, 45 岁。体检结果显示: 血压 180/100 mmHg, 体重 68kg, 身高 160cm(BMI=26.6), 甘油三酯 4.5mmol/L, 胆固醇 5.1mmol/L

117. 该女患者营养状况判断为

- A. 肥胖
- B. 严重肥胖
- C. 消瘦
- D. 超重
- E. 正常

118. 对该患者进行非药物治疗, 应告知其饮食要注意严格控制

- A. 高糖类食物摄入
- B. 胆固醇和脂肪摄入
- C. 胆固醇摄入
- D. 总热能和脂肪摄入
- E. 蛋白质摄入

119. 针对该患者开出运动处方中, 不合适的是

- A. 运动频率每周 2 次, 每次 20 分钟
- B. 鼓励参加自行车、游泳等下肢关节承重小的运动
- C. 运动中合理补液
- D. 中等至高等强度运动
- E. 减重同时加强肌肉力量锻炼

(120~121 题共用题干)

女, 27 岁。多食、善饥、大便次数增多, 体重下降 1 个月。经甲巯咪唑治疗 1 个月后。FT3、FT4 正常, TSH0.01umol/ml, 查体: P78 次/分, BP120/60mmHg, 甲状腺肿大, 左侧明显, 气管右偏。

120. 患者拟行甲状腺手术治疗, 术前准备应选择的药物是

- A. 左甲状腺素钠
- B. 普萘洛尔
- C. 糖皮质激素
- D. 丙硫氧嘧啶
- E. 复方碘溶液

121. 甲状腺切除术后半年, 患者出现乏力、便秘、怕冷、体重增加。最可能需要的治疗药物是

- A. 左甲状腺素钠

- B. 普萘洛尔
- C. 糖皮质激素
- D. 丙硫氧嘧啶
- E. 复方碘溶液

(122~124 题共用题干)

某小学组织学生接种乙肝疫苗，有 5 学生因出现头痛、呕吐、四肢乏力而送到医院就诊，首诊医师及时处置并报告医院有关部门，经医护人员解释、安抚后，39 名学生未经治疗症状很快消失，5 名学生仍感恶心，并伴有焦虑。医院组织专家会诊后排除了疫苗和其他躯体疾病所致。

122. 根据《疫苗流通与预防接种管理条例》，该事件所出现的情况属于

- A. 药品不良反应
- B. 群体性心因性反应
- C. 预防接种异常反应
- D. 医疗事故
- E. 突发公共卫生事件

123. 首诊医师及时处置并报告医院有关部门所遵循的伦理要求是

- A. 信息公开
- B. 耐心倾听
- C. 保守医密
- D. 恪尽职责
- E. 知情同意

124. 对上述 5 名未愈学生的焦虑症状，适宜的心理干预方法是掉

- A. 行为塑造
- B. 放松训练
- C. 厌恶疗法
- D. 催眠疗法
- E. 冲击疗法

(125~126 题共用题干)

男，48 岁。双下肢水肿 2 个月，既往体健，查体：BP 140/90mmHg，血 ALB 27g/L，Scr 92 μ mol/L，尿蛋白(+++)，尿潜血(-)。肾活检示：基底膜增厚，嗜银染色有钉突形成。

125. 最可能的诊断是

- A. 膜性肾病.
- B. IgA 肾病
- C. 局灶节段性肾小球硬化
- D. 微小病变型肾病
- E. 系膜毛细血管性肾小球肾炎

126. 应首选的药物治疗方案是合

- A. 硫唑嘌呤+环孢素。
- B. 环孢素
- C. 糖皮质激素+环磷酰胺
- D. 糖皮质激素+硫唑嘌呤
- E. 环磷酰胺

四、B型题

(127~128 题共用备选答案)

- A. 作用于远曲小管近端 Na^+ - Cl^- 共转运子

B. 抑制血管紧张素转换酶活性质

C. 增快心率

D. 阻滞 Ca^{2+} 通道

E. 增强心肌收缩力

127. 卡托普利的作用机制是

128. 氢氯噻嗪的作用机制是

(129~130 题共用备选答案)

A. 10 日

B. 2 日

C. 3 日

D. 5 日

E. 7 日

129. 开具普通处方, 其药物用量一般不超过的日数是

130. 开具急诊处方, 其药物用量一般不超过的日数是

(131~132 题共用备选答案)

A. 荚膜

B. 质粒

C. 普通菌毛

D. 芽胞

E. 鞭毛

131. 与耐药性的获得及转移密切相关的细菌结构是

132. 与肺炎链球菌致病性密切相关的细菌结构是

(133~134 题共用备选答案)

A. 糖原合成

B. 尿酸合成

C. 糖原分解

D. 丙酮酸羧化

E. 酮体生成

133. 与糖尿病患者酸中毒有关的主要代谢途径是

134. 三羧酸循环中的草酰乙酸来源于

(135~136 题共用备选答案)

A. 密码子

B. 增强子

C. 启动子

D. 沉默子

E. 反密码子

135. 结合转录调节因子并抑制基因表达的序列是

136. RNA 聚合酶在转录起始时结合的序列是

(137~138 题共用备选答案)

A. 以浆液渗出为主

B. 以纤维素渗出为主

C. 以淋巴细胞渗出为主

D. 以中性粒细胞渗出为主

E. 以嗜酸性细胞渗出为主

137. 符合小叶性肺炎炎症特点的是

138. 符合大叶性肺炎炎症特点的是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 支气管哮喘
- B. 荨麻疹
- C. 溶血性贫血
- D. 接触性皮炎
- E. 血清病

139. 由III型超敏反应引起的疾病是

140. 由自身抗体诱导的II型超敏反应引起的疾病是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 直径 1.6cm
- B. 直径 1.2cm
- C. 直径 0.8cm
- D. 直径 0.4cm
- E. 直径 2.0cm

141. 符合小胃癌的肿瘤大小是

142. 符合胃微小癌的肿瘤大小是

(143~145 题共用备选答案)

- A. 心交感神经冲动增多
- B. 交感缩血管纤维冲动增多
- C. 心迷走神经冲动增多
- D. 窦神经冲动增多
- E. 交感舒血管纤维冲动增多

143. 体位性低血压恢复正常时, 心率加快的原因是

144. 临床按颈动脉窦治疗阵发性室上性心动过速的直接作用是

145. 颈动脉窦灌注压升高时诱发降压反射的是

(146~148 题共用备选答案)

- A. 彼此信任, 互相协作
- B. 关心、爱护、尊重患者, 保护患者隐私
- C. 努力消除歧视, 促进医疗卫生资源的公平分配
- D. 努力钻研业务, 更新知识, 提高专业技术水平
- E. 提高道德修养水平

146. 医师对患者应承担的责任是

147. 医师应履行的专业责任是

148. 医师之间应守的道德规范是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 硝酸盐
- B. 酸雨
- C. 水体富营养化
- D. 甲基汞
- E. 光化学烟雾

149. 空气中大量 SO₂ 污染产生的二次污染物是

150. 氮氧化物与挥发性有机物在日光下生成的二次污染是

第二单元

一、A1型题

1. 下壁、右心室心肌梗死患者应慎用的治疗是
 - A. 静脉滴注硝酸甘油
 - B. 口服氯吡格雷
 - C. 皮下注射低分子肝素
 - D. 口服阿托伐他汀
 - E. 口服阿司匹林
2. 最有助于提示发生急性心肌梗死的临床情况是
 - A. 心电图提示新出现的完全性左束传导阻滞
 - B. 胸骨后刺痛
 - C. 左下肺湿啰音
 - D. 胸痛持续 5 分钟自行缓解
 - E. 血 CK 水平高, CK-MB/CK $<$ 2%
3. 下列提示糖尿病微血管病变的是
 - A. 眼底出血
 - B. 脑卒中
 - C. 高血压
 - D. 心肌梗死
 - E. 足部溃疡
4. 主动脉瓣狭窄最常见的并发症是
 - A. 体循环栓塞
 - B. 右心衰竭
 - C. 心律失常
 - D. 心脏性猝死
 - E. 感染性心内膜炎
5. 金黄色葡萄球菌所致尿路感染的主要感染途径是
 - A. 上行感染
 - B. 淋巴道感染
 - C. 性接触感染
 - D. 血行感染
 - E. 直接感染
6. 社区获得性肺炎的病原体中, 最常见的革兰阴性杆菌是
 - A. 厌氧菌
 - B. 大肠埃希菌
 - C. 军团菌
 - D. 流感嗜血杆菌
 - E. 肺炎克雷伯杆菌
7. 诊断肾癌最常见的检查方法是

- A. 肾穿刺活检
 - B. IVU
 - C. KUB
 - D. CT (平扫+增强)
 - E. 逆行肾盂造影
8. 以下疾病最常出现尿白细胞管型的
- A. 急性肾盂肾炎
 - B. 微小病变型肾病
 - C. IgA 肾病
 - D. 急性肾小管坏死
 - E. 急性肾小球肾炎
9. 不属于动脉粥样硬化主要危险因素的是
- A. 高胆固醇饮食
 - B. 肥胖
 - C. 饮酒
 - D. 缺乏体力活动
 - E. 吸烟
10. 骨折急救的基本原则不包括
- A. 妥善固定
 - B. 迅速运转
 - C. 彻底清创
 - D. 包扎伤口
 - E. 抢救休克
11. 尿道球部损伤最常见的病因是
- A. 尿道镜检查
 - B. 会阴部刺伤
 - C. 会阴部骑跨伤
 - D. 尿道扩张
 - E. 骨盆骨折
12. 肺癌患者出现声音嘶哑提示
- A. 肿瘤侵犯上腔静脉
 - B. 肿瘤侵犯喉返神经
 - C. 肿瘤侵犯颈交感神经节
 - D. 肿瘤侵犯膈神经
 - E. 肿瘤侵犯隆突
13. α -葡萄糖苷酶抑制剂最常见的不良反应是
- A. 腹胀和腹泻
 - B. 肝功能异常
 - C. 肾功能异常
 - D. 严重低血糖
 - E. 过敏和水肿
14. 不稳定型心绞痛患者应争取在 2 小时内进行介入评估的临床情况是
- A. 发作时间较前延长
 - B. 发作时间出现左心衰

- C. ST 段水平型下移
 - D. 静息心绞痛发作
 - E. ST 段下斜型下移
15. 支气管哮喘急性发作早期的动脉血气特征是
- A. 代谢性酸中毒
 - B. 代谢性碱中毒
 - C. 呼吸性碱中毒
 - D. 呼吸性酸中毒
 - E. 混合性酸碱失衡
16. 对明确支气管扩张咯血患者出血部位最有价值的检查是
- A. 支气管动脉造影
 - B. 胸部 CT
 - C. 肺动脉造影
 - D. 支气管镜
 - E. 胸部 X 线片
17. 股骨干下 1/3 骨折损伤的结构是
- A. 股静脉
 - B. 骨神经
 - C. 股动脉
 - D. 大隐静脉
 - E. 腘动脉
18. 脊柱结核与脊柱肿瘤的鉴别诊断中最有价值的检查是
- A. 穿刺活检
 - B. 脊髓造影
 - C. 血沉
 - D. X 线片
 - E. B 超
19. 开放性气胸是指
- A. 肺裂伤
 - B. 支气管破裂
 - C. 胸部存在伤口
 - D. 胸部伤口与胸膜腔相通
 - E. 胸部伤口深达肌层
20. 对鉴别急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 与心源性肺水肿最有价值的检查是
- A. 肺功能
 - B. 超声心电图
 - C. 动脉血气分析
 - D. 胸部 X 线片
 - E. Swan-Ganz 导管
21. 直肠指检发现下列情况中, 属于前列腺穿刺活检指征的是
- A. 前列腺增大
 - B. 前列腺硬结
 - C. 前列腺触痛
 - D. 前列腺囊性变

- E. 前列腺萎缩
22. 降低肺结核传染最主要的措施是
- A. 合理处理肺结核患者痰液
 - B. 减少接触排菌者的密切程度
 - C. 高危人群预防性化学治疗
 - D. 治愈涂阳肺结核患者
 - E. 接种卡介苗
23. 慢性肾衰竭患者常出现的电解质紊乱是
- A. 高磷血症，低钙血症
 - B. 低磷血症，低钙血症
 - C. 低磷血症，高钙血症
 - D. 低磷血症，高钾血症
 - E. 低钾血症，高钙血症
24. 支气管哮喘患者发作时禁用的药物是
- A. 吗啡
 - B. 氨茶碱
 - C. 沙丁胺醇
 - D. 泼尼松
 - E. 肾上腺素
25. 下列属于甲状旁腺激素作用的是
- A. 抑制肾小管磷的重吸收
 - B. 抑制肾小管钙的重吸收
 - C. 抑制活性维生素 D₃ 的合成
 - D. 抑制肠道钙吸收
 - E. 抑制破骨细胞的活性
26. 早期出现肺门及纵隔多发淋巴结转移的肺癌类型是
- A. 类癌
 - B. 鳞癌
 - C. 腺癌
 - D. 小细胞肺癌
 - E. 大细胞肺癌
27. 前列腺增生患者最早出现的症状是
- A. 肉眼血尿
 - B. 尿频
 - C. 尿潴留
 - D. 进行性排尿困难
 - E. 尿急
28. 能改善稳定型心绞痛患者临床预后的药物是
- A. 速效救心丸
 - B. 硝苯地平
 - C. 单硝酸异山梨酯
 - D. 硝酸甘油
 - E. 阿司匹林
29. 冠心病植入药物洗脱支架者，需要接受阿司匹林及氯吡格雷抗血小板治疗的时间至少为

- A. 12 个月
 - B. 1 个月
 - C. 9 个月
 - D. 6 个月
 - E. 3 个月
30. 诊断肾结核，最可靠的依据是
- A. IVU 见肾盏有破坏性改变
 - B. 尿结核杆菌培养阳性
 - C. 尿中找到抗酸杆菌
 - D. 尿常规检查呈酸性脓尿
 - E. 尿频、尿急、尿痛
31. 诊断脊髓损伤最有价值的检查是
- A. MRI
 - B. ECT
 - C. X 线片
 - D. CT
 - E. B 超
32. 发生肺血栓栓塞时，应首先考虑溶栓的情况是
- A. 严重低氧血症
 - B. 剧烈胸痛
 - C. 持续低血压
 - D. 合并深静脉血栓形成
 - E. 明显咯血
33. 在肾脏产生的激素是
- A. 皮质醇
 - B. 醛固酮
 - C. 肾上腺素
 - D. 去甲肾上腺素
 - E. 肾素
34. 新月体肾炎Ⅲ型患者血液免疫学检查最常出现的异常是
- A. 抗中性粒细胞胞浆抗体阳性
 - B. 单克隆免疫球蛋白增高
 - C. 抗肾小球基底膜抗体阳性
 - D. 循环免疫复合物阳性
 - E. 冷球蛋白阳性
35. 桡骨下段骨折首选的治疗方法是
- A. 切开复位钢板内固定
 - B. 抗炎镇痛
 - C. 中药活血化瘀
 - D. 手法复位外固定
 - E. 直接支具外固定
36. 治疗脆弱拟杆菌感染所致吸入性肺脓肿首选的抗菌药物是
- A. 红霉素
 - B. 青霉素

- C. 万古霉素
 - D. 克林霉素
 - E. 庆大霉素
37. IgA 肾病发展过程中加重肾损害最重要的因素是
- A. 反复发作肉眼血尿
 - B. 水肿
 - C. 高脂血症
 - D. 高血压
 - E. 血清 IgA 水平升高
38. 心脏骤停发生时最常见的心电图表现是
- A. 室性停搏
 - B. 窦性停搏
 - C. 无脉电活动
 - D. 心房颤动
 - E. 心室颤动
39. 提示非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征患者预后不良最有价值的线索是
- A. 最近 48 小时症状反复发作
 - B. 发作时血压下降
 - C. 血肌钙蛋白水平增高
 - D. 发作时间超过 30 分钟
 - E. 有静息胸痛发作
40. 心室颤动时电除颤的能量选择应为
- A. 单相波 120J
 - B. 双相波 100J
 - C. 单相波 360J
 - D. 单相波 300J
 - E. 单相波 200J
41. 急性下壁 ST 段抬高型心肌梗死患者 ST 段抬高的导联为是
- A. I、aVL
 - B. V₇~V₉
 - C. V_{3R}~V_{5R}
 - D. V₁~V₃
 - E. II、III、aVF
42. 肘关节外侧疼痛患者，查体 Mills 征阳性，正确的治疗是
- A. 限制肘关节活动
 - B. 局部注射透明质酸钠
 - C. 局部注射抗生素
 - D. 早期手术治疗
 - E. 限制腕关节活动
43. 属于骨折早期并发症的是
- A. 脂肪栓塞综合征
 - B. 缺血性肌挛缩
 - C. 创伤性关节炎
 - D. 损伤性骨化

E. 急性骨萎缩

44. 膀胱结石患者典型的排尿症状是

A. 排尿疼痛

B. 尿频、尿急、尿痛

C. 血尿

D. 排尿突然中断

E. 排尿困难

二、A2型题

45. 女，63岁。发热伴腰痛3天。既往糖尿病史8年。查体：T38.5℃，右肾区叩击痛(+)。血WBC $11.3 \times 10^9/L$ ，N0.88；尿常规：蛋白(+)，糖(++)，沉渣镜检RBC8~10个/HP，WBC25~30个/HP。对明确诊断最有意义的检查是

A. 肾穿刺活检

B. 尿找病理细胞

C. 清洁中断尿培养+药敏

D. 泌尿系B超

E. 相差显微镜检查

46. 女，42岁。近1个月出现进行性腰部疼痛，夜间加重。1年前因“乳腺癌”行手术治疗。为明确腰痛原因，最有价值的检查是

A. 骨密度

B. X线片

C. CT

D. 核素扫描

E. B超

47. 男，35岁。间断发作腰痛伴右下肢麻木3年。CT提示中央型腰椎间盘突出症，经保守治疗缓解。近1个月症状逐渐加重，2小时前出现大小便障碍。首选的治疗方法是

A. 糖皮质激素硬膜外注射

B. 绝对卧床休息

C. 髓核摘除术

D. 持续牵引

E. 理疗和按摩

48. 男，42岁。发热2周，持续胸痛1天。既往体健，吸烟20年。查体：110/80mmHg，双肺呼吸音清，心率105次/分，律齐。心电图：除aVR导联外的导联ST段呈弓背向下抬高。实验室检查：心肌钙蛋白阴性。该患者胸痛的最可能原因是

A. 急性心包炎

B. 气胸

C. 急性心肌梗死

D. 变异型心绞痛

E. 病毒性心肌炎

49. 男，36岁。搬重物时突然出现腰背部疼痛伴右下肢放射痛2小时。查体：下腰部压痛，右下肢直腿抬高试验(+)，右侧足背外侧感觉减弱，右足趾跖屈肌力减弱，右侧跟腱反射减弱，Babinski征(-)。该患者疾病可能受累的节段是

A. L₄~L₅

B. L₅~S₁

C. L₂~L₃

D. L₁~L₂

D. L₃~L₄

50. 男, 62 岁。劳累时气短进行性加重 3 年。既往无高血压、糖尿病病史, 无吸烟史。查体: 血压 110/70mmHg, 双肺呼吸音清, 心率 79 次/分, 律齐, 胸骨右缘第 2 肋间可闻及 4/6 收缩期喷射样杂音, 向颈部传导。超声心电图提示 LVEF60%。该患者气短的最可能原因是

A. 肺动脉高压

B. 肺血栓栓塞

C. 主动脉瓣狭窄大

D. 主动脉瓣关闭不全

E. 肺动脉瓣关闭不全

51. 男, 62 岁。进食哽噎 1 月余。胃镜检查: 距门齿 30~32cm 处食管后壁肿物, 黏膜表面破溃, 距门齿 38~40cm 处黏膜粗糙、隆起, 两处活检均为高分化鳞癌。心、肺及肝功能正常。未见其他部位转移征象, 最佳治疗方案是

A. 二线药物化疗

B. 静脉营养支持

C. 食管癌放射治疗

D. 食管癌根治术

E. 胃造瘘肠内营养

52. 男, 50 岁。情绪激动后突感头痛, 伴恶心、呕吐和视物模糊 2 小时来诊。高血压病史 10 年。查体: BP230/140mmHg, 双肺未闻及干湿性啰音, 心率 100 次/分, 律不齐, 早搏 2-4 次/分。颈无抵抗、无肢体活动障碍及言语不利。最适宜的治疗措施是

A. 静脉推注利多卡因

B. 静脉推注普罗帕酮

C. 静脉推注地西洋

D. 静脉滴注硝普钠

E. 静脉滴注塞米

53. 男, 24 岁。浸润性肺结核患者。使用“异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇”四联抗结核治疗。治疗过程中患者双手及双足麻木感。首先应采取的措施是

A. 加用维生素 B₆

B. 停用乙酰丁醇

C. 停用利福平

D. 停用吡嗪酰胺

E. 停用异烟肼

54. 男, 62 岁。反复无痛肉眼血尿 3 个月, 偶伴尿频、尿急。查体: 一般状态好, 轻度贫血貌, 双肾未触及。首先应考虑的疾病是

A. 泌尿系感染

B. 前列腺增生

C. 膀胱肿瘤

D. 膀胱结石

E. 慢性前列腺炎

55. 女, 56 岁。反复尿频、尿急伴腰痛 3 年, 夜尿增多 1 年。查体: BP155/80mmHg, 双肾区无叩痛。尿常规: 蛋白微量, 尿沉渣镜检 RBC10~15 个/HP, WBC 30~35 个/HP。Scr76mol/L, 尿渗透压 342mOsm/kg · H₂O。B 超: 左肾 8.3cm×4.9cm。最可能的诊断是

A. 急性膀胱炎

- B. 急性肾盂肾炎
 - C. 慢性肾小球肾炎
 - D. 慢性肾盂肾炎
 - E. 泌尿系结核
56. 男, 35 岁。反复右腰部绞痛伴血尿、KUB 见右肾结石, 长径 1.8cm, IVU 见右肾轻度积水, 输尿管显影正常。首选的治疗方法是
- A. 经皮肾镜碎石取石
 - B. 输尿管镜碎石取石
 - C. 体外冲击波碎石
 - D. 药物排石
 - E. 抗炎治疗
57. 男, 50 岁。干咳 2 周。既往吸烟史 20 余年, 20 支/天。胸部 X 线片检查示右上肺近胸膜处可见直径 1.5cm 的类圆形结节。为协助诊断, 应首先采取的检查是
- A. 支气管镜
 - B. 血清肿瘤标志物
 - C. 胸部 CT
 - D. 痰细胞学检查
 - E. 胸部 MRI
58. 男, 18 岁。左大腿肿胀, 疼痛 3 周, 呈持续性, 逐渐加剧, 夜间尤重。查体: 左大腿局部压痛, 皮温高, 静脉怒张。X 线片显示左股骨下端骨质破坏, 可见 Codman 三角。应首先考虑的诊断是
- A. 骨肉瘤
 - B. 转移性骨肿瘤
 - C. 骨软骨瘤
 - D. 骨纤维发育不良
 - E. 骨巨细胞瘤
59. 男, 73 岁。右上肺癌根治术后第 5 天突发高热, 胸腔闭式引流管内持续大量气体溢出。胸部 X 线片示: 右侧液气胸。最可能的原因是
- A. 食管破裂
 - B. 支气管胸膜瘘
 - C. 肺边缘漏气
 - D. 自发性气胸
 - E. 肺大泡破裂
60. 男, 62 岁。咳嗽、胸闷、气促 2 周。高血压病史 10 年。查体: BP150/90mmHg, 气管左移, 右胸叩诊实音, 右肺呼吸音消失。该患者最可能的诊断是
- A. 冠心病
 - B. 胸腔积液
 - C. 肺炎
 - D. 心力衰竭
 - E. 肺血栓栓塞
61. 男, 35 岁。间断血压增高伴心悸 3 个月。查体: 正力体型, 双上肢血压 180/110mmHg, 双肺呼吸音清, 心率 78 次/分, 律齐, 腹软, 腹部未闻及杂音。血压增高时测血游离肾上腺素、

去甲肾上腺素和尿儿茶酚胺显著增高。血钾和肌酐正常，尿常规正常。CT示双肾、肾上腺和肾动脉未见异常。该患者需首先考虑的疾病是

- A. 肾动脉狭窄
 - B. 嗜铬细胞瘤
 - C. 皮质醇增多症
 - D. 原发性醛固酮增多症
 - E. 肾上腺皮质功能减退症
62. 男，18岁，运动员。常规体检发现心跳慢，无自觉不适，平素体健。查体：BP120/80mmHg，心率50次/分。心电图：窦性心动过缓，为初步判断其窦性心动过缓是否为生理性，再次测量患者心率之前应嘱咐其
- A. 安静休息
 - B. 运动
 - C. Valsalva动作
 - D. 深呼气
 - E. 深吸气
63. 男，87岁。高血压病史10余年，长期服用钙通道阻滞剂、1个月前因血压控制不满意加用美托洛尔25mg bid，近1周乏力、倦怠、间断黑矇。查体：BP110/70mmHg，心率50次/分，心律不齐，各瓣膜区未闻及杂音。心电图示“PR间期逐渐延长直至QRS波群脱落”。最恰当的处理是
- A. 植入永久起搏器
 - B. 停用美托洛尔
 - C. 将美托洛尔更换为地尔硫草300mg tid
 - D. 将美托洛尔调整为12.55mg bid
 - E. 将美托洛尔调整为25mg qd
64. 男，62岁。进行性排尿困难1年。直肠指检前列腺稍增大，左侧叶有1枚黄豆大小硬结。PSA15ng/ml。MRI见前列腺增大，边界清，左侧外周带有低信号病灶，精囊形态正常。前列腺穿刺诊断为前列腺癌，Gleason分级评分3+4=7。其余检查未见异常。首选的治疗方法是
- A. 根治性前列腺切除术
 - B. 全身化疗
 - C. 经尿道前列腺切除术
 - D. 前列腺冷冻治疗
 - E. 内分泌治疗
65. 女，24岁。咽痛3周，肉眼血尿伴水肿4天。查体：BP140/95mmHg，咽稍充血，扁桃体无肿大，双下肢凹陷性水肿。尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检红细胞满视野，白细胞3~5个/HP。抗链球菌溶血素“O”升高。该患者最主要治疗措施是
- A. 应用中药
 - B. 应用糖皮质激素
 - C. 休息、对症治疗
 - D. 应用免疫抑制剂
 - E. 低蛋白饮食
66. 女，42岁。双下肢水肿1月余，进行性呼吸困难半个月。2个月前因腰椎间盘突出休息。查体：BP120/80mmHg，双肺呼吸音清，心率93次/分，P₂>A₂。超声心动图提示肺动脉高压。该患者呼吸困难的最可能原因是

- A. 左心衰竭
 - B. 慢性阻塞性肺疾病
 - C. 肺血栓栓塞
 - D. 全心衰竭
 - E. 冠心病
67. 女, 36 岁。喘憋、咯血 3 小时。查体: BP130/70mmHg, 双肺布满湿啰音和哮鸣音, 心率 102 次/分, 心律齐, P₂ 亢进, 心尖部可闻及舒张期杂音。该患者最适宜的治疗是
- A. 静脉滴注多巴胺
 - B. 口服凝血酶
 - C. 静脉滴注垂体后叶素
 - D. 静脉推注呋塞米
 - E. 静脉推注毛花苷丙
68. 男, 42 岁。风湿性心脏病二尖瓣狭窄合并房颤半年余。现口服地高辛 0.25mg/天, 活动后心悸。心电图示: 心室率约 130 次/分。控制心律失常最宜采取的措施是
- A. 加用胺碘酮
 - B. 地高辛加量至 0.5mg/天
 - C. 加用索他洛尔
 - D. 加用普罗帕酮
 - E. 加用美托洛尔
69. 男, 35 岁。井下作业时塌方被砸伤。查体: 会阴部瘀斑, 骨盆分离和挤压试验阳性。为进一步明确诊断, 除普通 X 线片检查外, 还应做的检查首选是
- A. 肌电图
 - B. CT
 - C. B 超
 - D. 血管造影
 - E. ECT
70. 男, 35 岁。高热、寒战、咳嗽 3 天。1 周前曾因面部疖挤压排脓。查体: 双肺呼吸音增强。血常规 WBC $18 \times 10^9/L$, N 0.91。胸部 X 线片示两肺多发性圆形密度增高阴影。该患者最可能的诊断是
- A. 吸入性肺脓肿
 - B. 肺淋巴瘤
 - C. 血源性肺脓肿
 - D. 肺血管炎
 - E. 肺真菌病
71. 男、42 岁。间断水肿 2 年, 乏力 2 个月。查体 BP155/100mmHg, 心肺腹未见异常, 双下肢凹陷性水肿。实验室检查: 尿 RBC20~25 个/HP, 为异形红细胞, 尿蛋白定量 1.9g/d, 血 Hb98g/L, Ser202 μ mol/L。B 超示双肾稍萎缩。最可能的诊断是
- A. 肾病综合征
 - B. IgA 肾病
 - C. 高血压肾损害
 - D. 慢性间质性肾炎
 - E. 慢性肾小球肾炎
72. 女, 17 岁。反复发作咳嗽、咳痰 10 年。近 3 年反复咯血, 最多一次量约 200ml。现胸部 CT 示左下叶肺萎缩, 可见囊柱状支气管扩张影像。最佳治疗方案是

- A. 吸氧、止血治疗
 - B. 抗炎治疗
 - C. 解痉、化痰
 - D. 左肺下叶切除
 - E. 体位排除
73. 男, 62 岁。反复咳嗽、咳痰 15 年, 活动后气促 5 年, 加重 1 周入院。入院时神志清楚, 动脉血气分析 $\text{PaCO}_2 50\text{mmHg}$, $\text{PaO}_2 45\text{mmHg}$, 面罩吸氧后, 患者呼之不应, 查动脉血气分析示 $\text{PaCO}_2 90\text{mmHg}$, $\text{PaO}_2 75\text{mmHg}$ 。患者出现意识障碍的主要原因是
- A. 电解质紊乱
 - B. 脑血管病
 - C. 氧中毒
 - D. 肺性脑病
 - E. 感染中毒性脑病
74. 男, 62 岁。左胸痛 5 天, 胸闷、气促 2 天。查体双下肺呼吸音粗, 心率 108 次/分, $\text{P2} > \text{A2}$ 胸部 X 线片示左下肺透亮度增加。对明确诊断最有价值的检查是
- A. CT 肺动脉造影 (CTPA)
 - B. 胸部高分辨 CT
 - C. 心电图
 - D. 血 D-二聚体
 - E. 超声心动图
75. 男、50 岁。常规体检胸部 X 线片示双肺纹理增粗块, 紊乱。既往体健, 吸烟 20 余年。行肺功能检查示变薄 $\text{FEV}_1/\text{FVC} 68.5\%$, FEV_1 占预计值的 68% 。支气管舒张试验 FEV_1 改善 2.5% (30ml)。该患者首先考虑的诊断是
- A. 支气管扩张
 - B. 慢性阻塞性肺疾病
 - C. 阻塞性肺气肿
 - D. 支气管哮喘
 - E. 慢性支气管炎
76. 男, 45 岁。地震中受挤压 10 小时后获救, 出现酱油色尿。查体: $\text{BP} 105/60\text{mmHg}$, 左下肢肿胀、压痛。 $\text{Ser} 280\mu\text{mol/L}$, $\text{K}^+ 7.5\text{mmol/L}$, 肌酸激酶 3500U/L (正常值 $0 \sim 20\text{IU/L}$)。首要的急救治疗是
- A. 大量补液
 - B. 利尿
 - C. 血液透析
 - D. 抗感染
 - E. 肿胀患肢切开减压
77. 女, 62 岁。反复咳嗽、喘息 15 年, 1 个月前搬入新居后再发加重。口服“茶碱类”药物有所缓解。查体: 双肺呼吸音低, 呼气相延长。胸部 X 线片未见明显异常, 肺功能检查示 $\text{FEV}_1/\text{FVC} 56\%$, 舒张试验示 FEV_1 改善率 12% 。该患者应首选考虑的诊断是
- A. 慢性阻塞性肺疾病
 - B. 支气管哮喘
 - C. 慢性充血性心力衰竭
 - D. 过敏性肺炎
 - E. 嗜酸性粒细胞性支气管炎

78. 女, 41 岁。1 周前受凉后干咳、胸闷, 接触冷空气后明显。无发热, 自服“阿奇霉素”无效。既往皮肤常出现瘙痒并起风团, 服用“扑尔敏”症状可好转。查体: 双肺呼吸音清。胸部 X 线未见异常。为明确诊断首选的检查是
- A. 血 IgE
 - B. 肺功能
 - C. 皮肤过敏原试验
 - D. 胸部 CT
 - E. 痰涂片嗜酸性粒细胞计数
79. 男, 12 岁。反复左腰部胀痛 2 年。查体左腰部包块, 质软, 呈囊性感。B 超提示左肾积水, 肾皮质变薄。为了解左肾实质损害程度及分侧肾功能, 首选的检查是
- A. KUB
 - B. 血 BUN、Cr
 - C. CT 平扫
 - D. 放射性核素肾显像
 - E. 逆行尿路造影
80. 女, 70 岁。间断咳嗽、咳痰 10 年, 活动后气短半年。查体: 双肺呼吸音减弱, 心率 80 次/分, 律齐。胸部 X 线未见明显异常。为明确诊断, 首选的检查是
- A. 肺功能
 - B. 胸部 X 线
 - C. 胸部 MRI
 - D. 胸部 CT
 - E. 心电图
81. 男, 26 岁, 发热咳嗽 3 天。胸部 X 线片右下肺炎, 右侧少量胸腔积液。血 WBC $14.5 \times 10^9/L$, N0.85。给予静脉点滴头孢曲松抗感染 3 天, 体温无明显变化。查体示右肩胛线第 8 肋以下语颤减弱, 叩诊呈实音。此时应采取的措施为
- A. 继续目前治疗
 - B. 胸腔穿刺抽液检查
 - C. 痰培养+药敏
 - D. 换用阿奇霉素
 - E. 换用喹诺酮类药物
82. 男, 35 岁。活动后气短 2 年, 加重伴双下肢水肿 2 个月。查体: 颈静脉怒张, 双肺底可闻及少量湿性啰音。心界扩大, 心率 100 次/分, 律齐, 可闻及 S3, 心尖部可闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音。肝肋下 4cm。超声心动图示全心扩大, 室壁运动呈弥漫性减弱。实验室检查: 尿蛋白 (+)。该患者最可能的诊断是
- A. 缩窄性心包炎
 - B. 肝硬化
 - C. 心包积液
 - D. 慢性肾炎
 - E. 扩张型心肌病
83. 男, 50 岁。突发心悸 1 小时。20 年前曾诊断为“预激综合征”。查体: BP70/50 mmHg, 心率 190 次/分, 心律绝对不齐。心电图示 QRS 波宽大畸形。该患者最佳治疗措施是
- A. 静脉推注维拉帕米
 - B. 颈动脉窦按摩
 - C. 同步直流电复律

D. 静脉推注毛花苷丙

E. Valsalva 动作

84. 男, 50 岁。半小时前自高处坠落, 上下肢完全不能活动, 双侧腹股沟水平以下感觉障碍, 大小便失禁, CT 显示椎体爆裂骨折, 椎管内可见骨折块目前应选用的治疗方法是

A. 药物治疗

B. 石膏固定

C. 平卧硬板床

D. 手术治疗

E. 牵引治疗

85. 男, 35 岁。面容变丑 10 年, 鞋子号码从 42 增加到 44, 近半年明显出汗和体力欠佳, 并有明显口渴、多饮、勃起功能障碍。查体: BP160/100mmHg 为明确诊断首选的检查是

A. T₃、T₄、TSH

B. FSH、LH

C. 胰岛素低血糖兴奋试验

D. 葡萄糖生长激素抑制试验

E. OGTT 试验

86. 男, 50 岁。3 周来反复出现上 3 层楼时胸痛, 为闷痛, 休息 3 分钟能缓解, 不剧烈运动则无症状。诊断绞痛。该患者最可能的心绞痛临床类型是

A. 初发劳动性

B. 恶化劳动性

C. 自发型

D. 变异型

E. 稳定型

87. 女, 74 岁。5 天前诊断为“急性前壁心肌梗死”。今日再感胸痛, 随即意识丧失。心电监护和生命体征原示无脉电活动。该患者意识丧失的最可能原因是

A. 心脏破裂

B. 心源性休克

C. 乳头肌断裂

D. 再发心肌梗死

E. 室内隔穿孔

88. 男, 50 岁。散步时突然倒地。查体: 意识丧失, 大动的搏动消失, 抽泣样呼吸, 随即消失。应首先采是

A. 舌下含服硝酸甘油

B. 开放气道

C. 人工呼吸

D. 按压人中

E. 胸外按压

89. 男, 62 岁。近 1 年来劳累时胸痛, 休息或含服硝酸甘油后数分钟即可缓解。既往高血压病史 10 余年, 药物控制满意。实验室检查: 血 LDL-C 2.16mmol/L 改善患者预后的药物不包括

A. 硝酸异山梨酯

B. 辛伐他汀

C. 福辛普利

D. 美托洛尔

E. 阿司匹林

90. 女, 12 岁。右上臂隐痛 1 个月。查体: 右上臂局部轻度压痛, 无红肿。X 线检查示右肱骨上段干骺端椭圆形, 边界清楚的溶骨性病灶, 骨皮质膨胀变薄, 无硬化性边缘。首先考虑的诊断是

- A. 骨软骨瘤
- B. 转移性骨肿瘤
- C. 骨巨细胞瘤
- D. 骨肉瘤
- E. 骨囊肿

91. 男, 50 岁。多饮、多尿、体重减轻 1 个月, 颈后痛 2 周。查体: T38.6℃, BMI27.5kg/m², 神志清楚, 颈后 4cm×3cm 溃疡, 表面有脓性分泌物, 空腹血糖 9.2mmol/L, 尿糖(++) , 尿酮体(-)。外科清创换药和抗生素治疗的同时, 为控制血糖最应采取的治疗措施是

- A. 应用胰岛素
- B. 应用磺脲类降糖药
- C. 应用双胍类降糖药
- D. 应用 α-葡萄糖苷酶抑制剂
- E. 单纯饮食控制

92. 男, 62 岁。左胸痛 4 天, 胸闷、气促 2 天。查体: 左下肺呼吸音消失, 心率 100 次/分, 律齐。为明确诊断首选的检查是

- A. 超声心电图
- B. 血心肌坏死标志物
- C. 胸部 X 线片
- D. 血 D-二聚体
- E. 胸部 B 超

93. 男, 42 岁。阵发性心悸 1 年, 加重 1 周。既往有高血压、糖尿病病史。查体: 心率 120 次/分, 律不齐, 第一心音强弱不等, 心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音。超声心动图示左房内径 60mm。该患者最适宜的抗栓治疗药物是

- A. 普通肝素
- B. 潘生丁
- C. 氯吡格雷
- D. 阿司匹林
- E. 华法林

94. 男, 35 岁。体检发现血压 150/120mmHg, 血钾 2.8mmol/L。腹部 CT 检查发现右肾上腺 1.0cm 的低密度占位病变, 拟手术治疗。术前准备首选的药物是

- A. 托拉塞米
- B. 呋塞米
- C. 氨苯蝶啶
- D. 螺内酯
- E. 氢氯噻嗪

95. 男, 76 岁。慢性阻塞性肺疾病病史 30 年。3 天前受凉后出现寒战、高热、咳嗽、咳胶冻状血痰, 伴右侧胸痛。查体: T39.5℃, R28 次/分, 口唇发绀, 双肺呼吸音减弱, 右上肺可闻及湿啰音。胸部 X 线片示右上肺大片状模糊影。该患者最可能的诊断是

- A. 真菌性肺炎
- B. 肺炎克雷伯杆菌肺炎

- C. 干酪性肺炎
D. 葡萄球菌肺炎
E. 肺炎链球菌肺炎
96. 男, 42 岁。寒战、高热、尿频、尿急、尿痛、排尿困难、会阴部胀痛 1 天。查体: 尿道口无分泌物和红肿。首先考虑的疾病是
- A. 膀胱结石
B. 急性前列腺炎
C. 急性尿道炎
D. 急性膀胱炎
E. 急性附睾炎
97. 男, 50 岁。自幼起常咳嗽、咳痰, 近 2 年来症状加重, 1 周前咯鲜血 1 次, 量约 100ml。查体: 左下肺可闻及湿啰音。胸部 X 线片示左下肺纹理粗乱。为明确诊断首选的检查是
- A. 肺功能
B. 支气管镜
C. 胸部高分辨 CT
D. 支气管动脉造影
E. 支气管碘油造影
98. 男, 62 岁。持续胸痛 4 小时。查体: BP90/60mmHg, 心率 36 次/分, 律齐。心电图示: II、III、aVF 导联 ST 段抬高。该患者心率慢的最可能原因是
- A. 右束支传导阻滞
B. 左束支传导阻滞
C. 三度房室传导阻滞
D. 心房颤动
E. 二度型房室传导阻滞
99. 男, 50 岁。进行性呼吸困难 1 年余。查体: BP125/80mmHg, P2>A2, 未闻及杂音, 双下肢无水肿。胸部 X 线片示肺动脉段膨隆。CTPA 示双肺动脉分支可见多处充盈缺损。最可能的诊断是
- A. 慢性肺血栓栓塞
B. 结节性多动脉炎
C. 大动脉炎
D. 特发性肺动脉高压
E. 原发性系统性血管炎
100. 男, 62 岁。双下肢水肿 2 个月。年轻时曾有尿常规异常, 高血压 10 年, 糖尿病 5 年。查体 BP175/100mmHg, 双下肢中度水肿。尿沉渣镜检 RBC30~40 个/HP, 80% 为变形红细胞, 尿蛋白 2.3g/d, Ser125 μ mol/L, 血糖 7.2mmol/L, 抗中性粒细胞胞浆抗体 (-)。眼科检查示视网膜动脉硬化。最有可能的临床诊断是
- A. 原发性小血管炎肾损伤
B. 肾淀粉样变性病
C. 高血压肾损伤
D. 慢性肾小球肾炎
E. 糖尿病肾病
101. 女, 24 岁。发热 4 天, 体温波动于 38.2~39.5 $^{\circ}$ C。化验血: Hb134g/L, WBC 14.5 $\times 10^9$ /L, N0.85, 胸部 X 线片提示左侧胸腔积液。胸水常规: 有核细胞 6000 $\times 10^9$ /L, 多核 0.89。胸

水生化: pH6.9, LDH1400U/L, 葡萄糖 0.8mm/L, ADA 48U/L。该患者除抗感染治疗外, 还应采取的重要处理措施是

- A. 胸腔闭式引流
- B. 抗结核治疗
- C. 胸膜活检
- D. 胸腔镜检查
- E. 胸腔内注射抗生素

102. 男, 35 岁。右上臂外伤 6 小时。查体: 局部肿胀、压痛、畸形, 伴异常活动, 垂腕、垂指。最可能的诊断是

- A. 肱骨外科颈骨折合并腋神经损伤
- B. 肱骨外科颈骨折合并肌皮神经损伤
- C. 肱骨干骨折合并桡神经损伤
- D. 肱骨干骨折合并尺神经损伤
- E. 肱骨干骨折合并正中神经损伤

103. 男, 4 岁。母亲拉其右手上楼梯时突然出现哭闹, 右上肢不敢活动。查体: 右前臂半屈及旋前位, 活动受限, 未见明显畸形。X 线片未见明显异常。最可能的诊断是

- A. 肱骨外上髁炎
- B. 肘关节脱位
- C. 肩关节脱位
- D. 桡骨头半脱位
- E. 尺骨青枝骨折

104. 女, 42 岁。发热 2 个月, 体温 38℃左右, 发现左腹股沟可触及 5cm×5cm 质软肿物, 按压痛。B 超显示其为低回声。腰椎正位片示腰大肌阴影增宽, L1、L2 椎体边缘骨质破坏, 椎间隙狭窄首先应考虑的诊断是

- A. 骨髓炎
- B. 腰椎结核
- C. 骨巨细胞瘤
- D. 转移性骨肿瘤
- E. 类风湿关节炎

105. 女, 42 岁。半小时前车祸受伤, 右髋部疼痛剧烈, 活动受限。查体: 右髋部弹性固定, 呈屈曲、内收、内旋畸形。最可能的诊断是

- A. 股骨颈骨折
- B. 髋关节中心脱位
- C. 髋关节后脱位
- D. 股骨转子间骨折
- E. 髋关节前脱位

106. 女, 24 岁。近 2 个月出现四肢关节疼痛伴皮肤结节、红斑。10 天前发热, 最高体温 38℃, 咳嗽, 咳少量痰, 胸部 X 线片示右上肺斑片状影伴空洞形成。该患者最可能的诊断是

- A. 肺脓肿
- B. 肺结核
- C. 肺囊肿继发感染
- D. 细菌性肺炎
- E. 支气管肺炎

107. 男, 42 岁。平素无不适, 体检时发现血压 120/80mmHg, 心率 80 次/分, 律不齐。心电图示偶发室性期前收缩。超声心电图示心脏结构功能正常。目前该患者最适宜的处置是

- A. 口服索他洛尔
- B. 暂不治疗, 随诊
- C. 射频消融术
- D. 口服美托洛尔
- E. 口服胺碘酮

108. 男, 50 岁。乏力、口干、多饮、多尿 4 个月。BP 140/94mmHg, 身高 168cm, 体重 88kg。运动和饮食控制并口服二甲双胍, 空腹血糖 6.6mmol/L, 餐后 2 小时血糖 12.6mmol/L。首选的治疗药物为

- A. 噻唑烷二酮类
- B. 磺脲类降糖药
- C. 餐时胰岛素
- D. α -葡萄糖苷酶抑制剂
- E. 基础胰岛素

三、A3/A4型题

(109~110 题共用题干)

男, 35 岁。2 小时前从 3 米高处跌落, 右腰部撞击到硬物上, 当即感到腰部剧烈疼痛, 随后出现肉眼血尿, 查体: P120/分, BP80/50mmHg, 右腰部淤血, 触痛明显, 血 Hb86g/L。B 超显示右肾影增大。

109. 右肾损伤的病理类型是

- A. 肾盂裂伤
- B. 肾裂伤
- C. 肾挫伤
- D. 肾蒂损伤
- E. 肾包膜下血肿

110. 正确处理方法是

- A. 输液、输血稳定血压
- B. 继续观察血压、脉搏
- C. 卧床休息
- D. 抗炎治疗
- E. 抗休克治疗+手术探查

(111~112 题共用题干)

男, 66 岁。腰痛、消瘦半年、双下肢水肿 3 个月。既往有高血压病史 5 年。查体: BP 120/80mmHg。贫血貌, 双下肢中度凹陷性水肿。尿常规: RBC 0-2 个/HP, 尿蛋白(++++), 尿蛋白定量 3.6g/d, 血 Hb78g/L, Ser88 μ mol/L, TP 86g/L, ALB 28g/L。B 超示双侧肾大小形态正常。

111. 该患者目前最可明确的诊断是

- A. 肾病综合征
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 无症状性蛋白尿

112. 对明确诊断最有价值的检查是

- A. 血肿瘤标志物及胸、腹 CT

- B. 血抗肾小球基底膜抗体及抗中性粒细胞胞浆抗体 (ANCA)
- C. 血抗核抗体、抗双链 DNA 抗体及补体
- D. 血、尿免疫固定电泳及骨髓穿刺
- E. 血乙肝病毒标志物

(113~114 题共用题干)

男, 72 岁。间断咳嗽、咳痰 20 余年, 加重伴喘憋 1 周。近 2 天出现嗜睡。查体: 意识模糊, 口唇发绀, 球结膜水肿, 双肺满布哮鸣音, 双下肢水肿。

113. 该患者出现意识障碍最主要机制是

- A. 感染中毒性脑病
- B. 组织缺氧
- C. 电解质紊乱
- D. CO₂ 潴留
- E. 脑出血

114. 患者经吸氧后呼吸困难进一步加重, 血气分析示 pH 7.10, PaO₂65mmHg, PaCO₂102mmHg。

查体: 昏睡, 口唇发绀, 双肺散在干湿啰音。此时, 应首选的治疗措施是

- A. 糖皮质激素静脉滴注
- B. 机械通气
- C. 呼吸兴奋剂静脉滴注
- D. 静脉应用广谱抗生素
- E. 大剂量塞米静脉滴注

(115~117 题共用题干)

女, 76 岁。跌倒后左髋部疼痛, 不能站立行走。既往高血压、肺心病、糖尿病 20 余年, 一般状态差。查体: BP190/110mmHg, 左髋部压痛, 左下肢呈短缩及外旋畸形。X 线检查示股骨头下骨折, Pauwells 角 55°, GarderIII 型。

115. 首先应采取的治疗措施是

- A. 外固定架固定
- B. 切开复位钢板固定
- C. 人工全髋关节置换术
- D. 下肢中立位皮牵引
- E. 切开复位髓内钉固定

116. 如果该患者后期出现股骨头坏死, 最主要的原因是

- A. 股深动脉损伤
- B. 旋股内侧动脉损伤
- C. 小凹动脉损伤
- D. 闭孔动脉损伤
- E. 旋股外侧动脉损伤

117. 如果该患者经治疗后心肺功能良好, 血压控制在 130/80mmHg, 空腹血糖控制在 7~8mmol/L, 最佳治疗方案是

- A. 人工髋关节置换术
- B. 下肢中立位皮牵引
- C. 切开复位髓内钉固定
- D. 切开复位钢板固定
- E. 切开复位克氏针固定

(118~119 题共用题干)

女，63岁。夜尿增多伴血压升高2年，乏力纳差1个月。既往间断服用“龙胆泻肝丸”多年。查体：BP150/95mmHg 双下肢无水肿。实验室检查：Hb82g/L，SCr238μmol/L，GLu5.4mmol/L，尿常规：RBC(-)，蛋白(+)，糖(+)。放射性核素肾动态显像示左肾 GFR10.2ml/min，右肾 GFR11.5ml/min。

118. 该患者的肾功能分期

- A. 慢性肾脏病 3 期
- B. 慢性肾脏病 4 期
- C. 慢性肾脏病 1 期
- D. 慢性肾脏病 2 期
- E. 慢性肾脏病 5 期

119. 患者肾功能减退最可能的病因是

- A. 糖尿病肾病
- B. 高血压性良性小动脉性肾硬化
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 慢性间质性肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

(120~122 题共用题干)

男，70岁。急性前壁心肌梗死7小时，急诊时突然心悸，无头晕。查体：BP100/70mmHg，双肺呼吸音清，心率88次/分，律不齐。心电监测示：频发室性期前收缩。

120. 控制该患者心律失常最适宜的治疗措施是

- A. 静脉注射胺碘酮
- B. 静脉注射肾上腺素
- C. 静脉推注普罗帕酮
- D. 皮下注射阿托品
- E. 静脉推注毛花苷丙

121. 患者心悸进行性加重，伴喘憋，不能平卧。查体：高 BP90/60mmHg。端坐位，急性病容，双下肺可闻1及湿性罗音，心率105次/分，律不齐。心电监测提示频发室性期前收缩。该患者喘憋的最可能原因是

- A. 急性肺部感染
- B. 急性左心衰
- C. 急性肺栓塞
- D. 气胸
- E. 支气管哮喘

122. 患者喘憋进行性加重，意识模糊。查体：BP70/40mmHg，心电检测提示室性心动过速。该患者最适宜的治疗措施是

- A. 静脉推注胺碘酮
- B. 同步直流电除颤
- C. 非同步直流电除颤
- D. 静脉推注利多卡因
- E. 非同步交流电复律

(123~124 题共用题干)

女，55岁。反复咳嗽、咳痰、气促30年，加重伴低热1周。既往高血压病史10年，血压控制满意。查体：T38℃，P110次/分，R24次/分，BP160/90mmHg。口唇发绀，颈静脉怒张，双肺

可闻及哮鸣音和湿音，心率 110 次/分，律齐， $P_2 > A_2$ ，剑突下可闻及 3/6 级收缩期杂音。腹膨隆，肝肋下 4cm，压痛（+），肝颈静脉回流征阳性，双下肢水肿。

123. 该患者最可能的诊断是

- A. 冠心病
- B. 心肌病
- C. 肺血栓栓塞
- D. 肺心病
- E. 风湿性心脏瓣膜病

124. 对明确诊断最有价值的检查是

- A. 胸部 X 线片
- B. 超声心动图
- C. 血气分析
- D. 心电图
- E. 血 D-二聚体

（125~126 题共用题干）

男，46 岁。突发剧烈疼痛，呈撕裂状，累及胸骨后及上腹部，伴大汗，持续 1 小时不缓解。既往高血压病史 5 年。查体：BP200/110mmHg，双肺呼吸音清，心率 100 次/分，心律齐，心脏各瓣膜区听诊未闻及杂音，心电图：左室高电压伴 $V_4 \sim V_6$ 导联 ST 段压低 0.1mV。

125. 最有助于明确诊断的检查是

- A. 超声心动图
- B. CT 大动脉血管造影
- C. 心肌损伤标志物
- D. 胸部 X 线片
- E. 动态心电图

126. 该患者最可能的诊断是

- A. 张力性气胸
- B. 不稳定型心绞痛
- C. 急性心肌梗死
- D. 肺动脉栓塞
- E. 主动脉夹层

（127~128 题共用题干）

女，42 岁。乏力、面色苍白 20 年。感冒后出现恶心、呕吐 1 周，意识模糊 1 天。查体：BP 90/60mmHg 血钠 125mmol/L，血钾 4.0mmol/L。眉毛外 1/3、阴毛、腋毛脱落。

127. 需要重点追问的病史是

- A. 家族史
- B. 毒物接触史
- C. 分娩哺乳史
- D. 药物治疗史
- E. 不洁饮食

128. 有助于明确诊断的实验室检查不包括

- A. GH、PRL
- B. E_2 、FSH 和 LH
- C. ADH
- D. ACTH 和皮质醇

E. T₃、T₄ 和 TSH

(129~130 题共用题干)

女, 28 岁。脸部变圆伴血压升高 6 个月, 闭经 2 个月, 无高血压家族史。查体: BP160/100mmHg, 向心性肥胖, 满月脸, 水牛背, 腹部见宽大紫纹, 双下肢水肿。实验室检查: 血钠 149mmol/L, 血钾 3.2mmol/L。

129. 该患者最可能的诊断是

- A. 单纯性肥胖
- B. 原发性醛固酮增多症
- C. 库欣综合征
- D. 妊娠
- E. 嗜铬细胞瘤

130. 为明确诊断, 该患者首先要做的检查是

- A. 肾素、醛固酮
- B. 泌乳素
- C. 尿绒毛膜促性腺激素
- D. 促肾上腺皮质激素、皮质醇
- E. 肾上腺素

(131~132 题共用题干)

男, 62 岁。2 型糖尿病病史 10 年, 口服二甲双胍 0.5tid, 格列美脲 4mg qd, 空腹血糖 7~9mmol/L, 餐后血糖未监测。2 周前感冒后自行停药, 逐渐出现疲乏无力、口渴、多饮。近 3 天出现明显乏力、烦躁不安、胡言乱语等症状。1 天来食欲不振、恶心, 无呕吐, 未进食。查体: BP140/90mmHg, 体型偏胖, 谵妄状态, 心率 100 次/分, 双肺呼吸音粗糙。尿糖 (++++), 酮体 (+), 血钠 150mmol/L。

131. 该患者的状态首先应考虑为

- A. 糖尿病酮症酸中毒昏迷
- B. 低血糖昏迷
- C. 糖尿病高渗高血糖综合征
- D. 重症肺炎
- E. 脑卒中

132. 该患者处理的重点是

- A. 补充碳酸氢钠
- B. 恢复原降糖治疗
- C. 补充电解质
- D. 静脉输注生理盐水
- E. 静脉输注葡萄糖

(133~134 题共用题干)

男, 30 岁。车祸 2 小时后来院, 一般情况尚好, 右小腿中上段皮裂伤 14cm, 软组织挫伤较重, 胫骨折端有外露, 出血不多。

133. 在进行 X 线片检查前, 应该进行的处理

- A. 行简单的外固定及局部包扎
- B. 行气压止血带止血
- C. 急送手术室
- D. 石膏固定
- E. 跟骨结节牵引

134. 此时最佳的处理方法是

- A. 清创术, 骨折复位, 外固定支架固定
- B. 清创术, 骨折复位, 钢板内固定
- C. 清创术, 骨折复位, 髓针内固定
- D. 清创术, 夹板固定
- E. 清创术, 石膏管型固定

(135~136 题共用题干)

男, 28 岁。心悸、无力、手颤抖 3 个月, 大便每日 2~3 次, 不成形, 体重下降 5kg。1 周前诊断为甲状腺功能亢进症, 尚未治疗。昨晚饮白酒半斤, 呕吐一次, 晨起醒来发现双下肢不能活动。

135. 为明确下肢不能活动的原因首先应测定

- A. 血钠
- B. 血镁
- C. 血糖
- D. 血钾
- E. 血钙

136. 为避免再次出现下肢不能活动, 甲亢治疗应采用

- A. 抗甲状腺药物
- B. 放射性碘
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 立即行甲状腺手术
- E. 复方碘溶液

(137~138 题共用题干)

患儿, 4 岁。发热 3 天伴流涕、咳嗽、流泪就诊。查: T40°C, 球结膜充血, 心肺检查阴性, 耳后发际处可见少许红色斑丘疹。

137. 该患儿应考虑为何病

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 幼儿急疹
- D. 猩红热
- E. 水痘

138. 为明确诊断, 应立即做哪项检查

- A. 血常规
- B. 用免疫荧光法检查血、尿或鼻咽分泌物中的病原体
- C. 粪便常规
- D. 血清抗体检查
- E. 皮疹印片

四、B型题

(139~140 题共用备选答案)

- A. 支原体肺炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 慢性支气管炎急性发作期
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管扩张症

139. 病变肺部叩诊浊音, 语颤增强, 闻及支气管呼吸音, 常见于

140. 发作时两肺广泛哮鸣音，缓解后哮鸣音消失，常见于

(141~142 题共用备选答案)

- A. 肛裂
- B. 内痔
- C. 直肠息肉
- D. 肛瘘
- E. 直肠癌

141. 肛诊检查触及不规则肿块、质硬、固定最可能是

142. 肛诊检查触及到条索状肿物、质地稍硬、固定最可能是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 肾前性氮质血症
- B. 急性肾小管坏死
- C. 急进性肾炎
- D. 急性间质性肾炎
- E. 肾后性急性肾衰竭

143. 充血性心力衰竭加重期出现少尿，血 BUN/Cr>20，尿比重 1.025，最可能诊断

144. 老年糖尿病肾病患者腹部增强 CT 检查出现少尿，尿钠 54mmol/L，最可能诊断

(145~146 题共用备选答案)

- A. 人工破膜
- B. 剖宫产
- C. 静脉点滴缩宫素引产
- D. 会阴侧切
- E. 低位产钳术

145. 孕 35 周，子痫，抽搐控制 6 小时，此时应采取的措施是

146. 轻度子痫前期初产妇，孕 39 周，临产，宫口开全 1 小时，LOA，S+3，胎心 110 次/min，羊水轻度胎粪污染。此时应采取的措施是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 肺炎支原体
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 铜绿假单胞菌肺炎
- E. 肺炎克雷伯杆菌肺炎

147. 男，24 岁。急性起病，高热、寒战、咳嗽，咳褐色痰，胸部 X 线片示右上肺大片实变。最可能的诊断是

148. 男，18 岁。缓慢起病，头痛、乏力、肌痛，胸部 X 线片示双下肺间质性肺炎。最可能的诊断是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 室间隔缺损
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 心包积液
- E. 主动脉瓣关闭不全

149. 胸部 X 线片示呈靴形的心脏异常是

150. 胸部 X 线片示呈梨形的异常是

第三单元

一、A1型题

1. 继发性腹膜炎突出的腹痛特点是
 - A. 疼痛程度随时间变化
 - B. 腹痛范围有大小变化
 - C. 原发病灶处疼痛最显著
 - D. 疼痛呈阵发性加剧
 - E. 肛门排气、排便后腹痛可缓解
2. 下列属于特异性感染的是
 - A. 疝
 - B. 疖病
 - C. 急性淋巴结炎
 - D. 急性乳腺炎
 - E. 淋巴结结核
3. 确诊伤寒最常用的检测方法是
 - A. 粪便培养
 - B. 血培养
 - C. 尿培养
 - D. 骨髓培养
 - E. 胆汁培养
4. 最易诱发中毒性巨结肠的电解质紊乱是
 - A. 低钾血症
 - B. 高钙血症
 - C. 低钠血症
 - D. 低钙血症
 - E. 低磷血症
5. 艾滋病患者机会性感染最常见的疾病是
 - A. 巨细胞病毒性视网膜炎
 - B. 脑弓形虫病
 - C. 肺孢子菌肺炎
 - D. 卡波西肉瘤
 - E. 口腔念珠菌病
6. 腹部闭合损伤时，最常受到损伤的空腔脏器是
 - A. 乙状结肠
 - B. 胃
 - C. 十二指肠
 - D. 升结肠
 - E. 小肠
7. 幽门梗阻患者，下列术前准备最重要的是
 - A. 纠正碱中毒

- B. 低渗盐水洗胃
- C. 生理盐水洗胃
- D. 口服抗菌药物
- E. 高渗盐水洗胃

8. 胆碱酯酶复能药的药理作用中不包括

- A. 提高全血胆碱酯酶活性
- B. 恢复被抑制的胆碱酯酶活性
- C. 恢复已经老化的胆碱酯酶活性
- D. 与磷酸化胆碱酯酶中的磷形成络合物
- E. 减轻烟碱样症状

9. 决定急性肠梗阻手术探查的最主要依据是

- A. 是否为绞窄性梗阻
- B. 近端肠管扩张程度
- C. 梗阻部位
- D. 是否为完全性梗阻
- E. 梗阻持续时间

10. 普通型流行性脑脊髓膜炎临床分期不包括

- A. 恢复期
- B. 败血症期
- C. 前驱期
- D. 脑膜炎期
- E. 发热期

11. 血吸虫病病原治疗首选的药物是

- A. 氯喹
- B. 甲苯达唑
- C. 酒石酸钠
- D. 甲硝唑
- E. 吡喹酮

12. 确定直肠癌能否保留肛门的重要因素是

- A. 肿瘤下缘距齿状线的距离
- B. 肿瘤的大小
- C. 是否合并肠周淋巴结转移
- D. 是否合并有肝转移
- E. 肿瘤浸润直肠壁的深度

13. 纠正休克所致组织低灌注和缺氧的关键措施是

- A. 应用血管活性药物
- B. 补充血容量
- C. 积极处理原发病
- D. 高浓度吸氧
- E. 纠正酸中毒

14. 下肢浅静脉曲张最主要的原因是

- A. 盆腔内占位病变
- B. 长时间站立活动
- C. 静脉壁薄弱

- D. 妊娠后期子宫压迫
 - E. 髂股静脉血栓形成
15. 溃疡性结肠炎患者类型的粪便特征是
- A. 柏油样便
 - B. 陶土样便
 - B. 鲜血便
 - D. 稀水样便
 - E. 黏液脓血便
16. 下列情况中, 血浆 D-二聚体测定结果正常的是
- A. 原发性纤溶亢进症
 - B. 急性肺梗死
 - C. 下肢深静脉血栓形成
 - D. 急性心肌梗死
 - E. 弥散性血管内凝血
17. 病原体的侵袭力是指
- A. 病原体的繁殖力
 - B. 病原体产生毒素的能力
 - C. 病原体的数量
 - D. 病原体的毒力
 - E. 病原体侵入机体并在机体内生长、繁殖的能力
18. 直肠癌术后, 最常用于监测复发的肿瘤标志物是
- A. CA19-9
 - B. CA15-3
 - C. AFP
 - D. CA242
 - E. CEA
19. 对明确直肠癌局部浸润状况最有意义的检查是
- A. 结肠镜
 - B. 全消化道 X 线钡剂造影
 - C. 结肠 X 线钡剂造影
 - D. 腹部 B 超
 - E. 盆腹部增强 CT
20. 下列疾病治疗后最易继发肛瘘的是
- A. 肛周脓肿
 - B. 肛裂
 - C. 外痔
 - D. 混合痔
 - E. 内痔
21. 急性梗阻性化脓胆管炎最主要的治疗措施是
- A. 早期足量应用广谱抗生素
 - B. 扩容补液, 预防休克
 - C. 保护肝功能, 降低血清总胆红素
 - D. 解除胆道梗阻, 通畅引流
 - E. 纠正水、电解质紊乱

22. 主要由于免疫因素异常引起溶血性贫血的情况是
- A. 大面积烧伤
 - B. 疟疾
 - C. 血型不合的输血
 - D. 人工心脏瓣膜置换术后
 - E. 毒蛇咬伤
23. 治疗肝性脑病时，可以促进氨代谢的药物是
- A. 新霉素
 - B. 碳酸氢钠
 - C. 乳果糖
 - D. 氟马西尼
 - E. L-鸟氨酸-L-天冬氨酸
24. 对有心脑血管疾病的患者，以下关于术前准备的说法错误的是
- A. 纠正水、电解质代谢紊乱
 - B. 脑卒中者择期手术至少推迟 2 周后
 - C. 高血压患者术前继续服药
 - D. 心肌梗死发病后 2 个月安排择期手术
 - E. 不要求血压降至正常后手术
25. 甲状腺功能亢进症行甲状腺次全切除术后出现呼吸困难最常见的原因是
- A. 伤口血肿
 - B. 甲状腺危象
 - C. 双侧喉上神经损伤
 - D. 甲状腺功能低下
 - E. 气管塌陷
26. 关于感染过程中潜伏性感染特点的叙述正确的是
- A. 迅速引起显性感染
 - B. 一旦免疫功能下降可引起显性感染
 - C. 病原体侵入人体后，潜伏在各个部位
 - D. 每种感染性疾病均有潜伏性感染
 - E. 病原体不断排出体外
27. 下列不属于巨幼细胞贫血实验室检查结果的是
- A. 外周血中性粒细胞呈多分叶
 - B. 骨髓可见巨中、晚幼粒细胞
 - C. 外周血红细胞 MCV 增大
 - D. 骨髓巨核细胞胞体增大，分叶过多
 - E. 骨髓有核红细胞呈“幼浆老核”现象
28. 治疗类风湿关节炎首选的改变病情抗风湿药物是
- A. 甲氨蝶呤
 - B. 糖皮质激素
 - C. 非甾体抗炎药
 - D. 环磷酰胺
 - E. 羟氯喹
29. 腹膜炎患者应进行手术探查的情况是
- A. 体温超过 38℃

- B. 年龄超过 60 岁
 - C. 出现休克症状
 - D. 发病时间大于 6 小时
 - E. 血 WBC 超过 $10 \times 10^9/L$
30. 肛裂的典型临床表现是
- A. 排便不尽
 - B. 里急后重
 - C. 黑便
 - D. 脓血便
 - E. 排便后肛门疼痛
31. 胆囊切除术中需探查胆总管的指征是
- A. 胆囊壁明显增厚
 - B. 胆囊增大
 - C. 胆总管直径 $> 1\text{cm}$
 - D. 胆囊结石超过 2cm
 - E. 胆囊结石伴有胆囊息肉
32. 新生儿沙眼衣原体感染的主要途径是
- A. 呼吸道感染
 - B. 宫内感染
 - C. 乳汁感染
 - D. 产道感染
 - E. 唾液感染
33. 反映肝纤维化的血清学指标是
- A. 直接胆红素
 - B. 白蛋白
 - C. 胆碱酯酶
 - D. 丙氨酸氨基转移酶
 - E. IV 型胶原
34. 腹股沟管深环的体表投影位于腹股沟韧带中点
- A. 下方 3cm
 - B. 上方 3cm
 - C. 上方 1cm
 - D. 上方 2cm
 - E. 下方 2cm
35. 消化性溃疡穿孔的早期临床表现中不包括
- A. 寒战、高热
 - B. 恶心、呕吐
 - C. 有局限性压痛和反跳痛
 - D. 腹肌紧张
 - E. 肠鸣音减弱或消失
36. 提示结肠诊断的最重要的报警症状是
- A. 腹胀
 - B. 腹痛
 - C. 腹泻

D. 便秘

E. 便血

37. 肝硬化合并自发性细菌性腹膜炎时选择抗生素的原则是

A. 针对 G⁻杆菌，兼顾 G⁺球菌

B. 针对 G⁺球菌，兼顾厌氧菌

C. 针对 C⁺杆菌，联合抗真菌药物

D. 针对 G⁻球菌，兼顾厌氧菌

E. 针对 G⁻杆菌，联合抗真菌药物

38. 关于铁吸收的叙述，正确的是

A. 胃大部切除术后胃内铁吸收减少

B. 植物食品铁较动物食品铁易吸收

C. 大量饮茶可增加食物中铁的吸收

D. 二价铁较三价铁易吸收

E. 维生素 C 不利于食物中铁的吸收

39. 切口“乙级愈合”的表现不包括

A. 积液

B. 红肿

C. 血肿

D. 硬结

E. 化脓

40. 以下不属于消化性溃疡手术治疗指征的是

A. 内科治疗无效

B. 常于夜间发作腹痛

C. 十二指肠溃疡合并幽门梗阻

D. 饱餐后胃溃疡穿孔

E. 胃巨大溃疡

41. 与幽门螺杆菌感染关系密切的疾病是

A. 克罗恩病

B. 十二指肠溃疡

C. 胃食管反流病

D. 功能性消化不良

E. 溃疡性结肠炎

42. 对诊断甲状腺癌最有意义的临床表现除甲状腺肿物外，还伴有

A. 吞咽困难

B. 声音嘶哑

C. 体重减轻

D. 明显疼痛

E. 明显憋气

43. 按手术期限，下列属于限期手术的是

A. 慢性阑尾炎切除术

B. 直肠根治术

C. 完全性肠梗阻造瘘术

D. 可复性股疝修补术

E. 急性上消化道穿孔修补术

44. 手术后猝死最常见的病因是
- A. 气胸
 - B. ARDS
 - C. 急性左心衰
 - D. 肺栓塞
 - E. 重症肺炎
45. 引起手术切口血肿最主要的原因是
- A. 伤口裂开
 - B. 术前服用阿司匹林
 - C. 高血压控制不满意
 - D. 术中止血不彻底
 - E. 伤口感染继发出血
46. 腹股沟直疝最有诊断意义的临床表现是
- A. 按压深环疝仍复出
 - B. 容易发生嵌顿
 - C. 疝囊颈位于腹壁下动脉外侧
 - D. 疝包块呈梨形
 - E. 最常见中年人
47. 发生哺乳期急性乳腺炎的主要病因是
- A. 乳晕皮肤皲裂
 - B. 乳汁淤积细菌侵入
 - C. 乳腺组织发育不良
 - D. 乳汁分泌障碍
 - E. 乳腺囊性增生病
48. 与系统性红斑狼疮患者发生雷诺现象相关的自身抗体是
- A. 抗 Sm 抗体
 - B. 抗 RNP 抗体
 - C. 抗 dsDNA 抗体
 - D. 抗 SSA 抗体
 - E. ANA

二、A2型选择题（49~107题）

49. 男、25岁。发热、乏力2周。查体：T38.1℃，贫血貌，牙龈肿胀，胸骨下段压痛（+），脾肋下2cm 血常规：Hb71g/L，WBC31.4×10⁹/L，骨髓细胞学检查见原始细胞占0.68.少数细胞胞浆中可见Aure小体，MPO染色为弱阳性。最有可能的诊断是
- A. 急性单核细胞白血病
 - B. 急性红白血病
 - C. 急性淋巴细胞白血病
 - D. 急性巨核细胞白血病
 - E. 急性早幼粒细胞白血病
50. 男，45岁。持续性右上腹痛伴寒战、高热、恶心、呕吐10天。查体：皮肤、巩膜无黄染，右季肋部饱满，肝肋下4cm，边缘钝，有压痛，无结节，右侧第7、8肋间腋中线皮肤水肿和压痛。血WBC18.5×10⁹/L，N0.91；腹部B超示肝右叶内8cm×6cm液性暗区；X线示右膈肌升高，运动受限。最有可能的诊断是
- A. 细菌性肝脓肿

- B. 胆囊结石伴感染
- C. 肝癌伴感染
- D. 右膈下脓肿
- E. 肝囊肿

51. 女, 25 岁。6 月下旬就诊: 腹泻、呕吐伴轻度腹痛 1 天。共腹泻 6 次, 开始为黄稀便, 继之水样便。呕吐 1 次, 为胃内容物。无发热。粪便检查动力试验 (+)。碱性蛋白胨水培养有细菌生长。最有可能的诊断是

- A. 变形杆菌肠炎
- B. 霍乱
- C. 空肠弯曲菌肠炎
- D. 沙门菌食物中毒
- E. 细菌性痢疾

52. 男, 56 岁。诊断乙肝肝硬化 4 年, 黑便 2 天, 不认家人、吵闹 2 小时。下列治疗中不恰当的是

- A. 静脉应用奥美拉唑
- B. 口服地西洋
- C. 静脉应用生长激素
- D. 口服乳糖果
- E. 口服利福昔明

53. 男, 45 岁, 农民。发热伴发冷、头痛、全身痛、乏力 4 天, 咳嗽、血痰及咯血 1 天于 8 月 25 日来诊。当地正值洪水灾害, 有数十人发病。查体: $T39^{\circ}\text{C}$, 神志清, 球结膜充血, 腓肠肌压痛, 腹股沟淋巴结蚕豆大。最有可能的诊断是

- A. 肾综合征出血热
- B. 败血症
- C. 钩端螺旋体病
- D. 大叶性肺炎
- E. 流感

54. 女, 30 岁。反复便秘、腹痛 10 年。便前腹痛、腹部不适, 便后缓解; 工作紧张时症状加重。无便血及消瘦。睡眠差。最有可能的诊断是

- A. 肠易激综合征
- B. 克罗恩病
- C. 肠结核
- D. 结肠癌
- E. 溃疡性结肠癌

55. 男, 45 岁。发热 4 天于 1 月 20 日来诊。体温波动于 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$, 伴发冷、乏力、全身不适, 服感冒药无效。居住地有鼠。查体: $T36^{\circ}\text{C}$, P120 次/分, BP70/50mmHg。急性病容, 精神萎靡, 皮肤充血, 面部水肿, 腋下有出血点, 腹软, 肝脾肋下未触及。实验室检查: 血 WBC $20 \times 10^9/\text{L}$, N0.6, L0.24, 异型 L0.16, PLT $80 \times 10^9/\text{L}$ 。尿常规: 尿蛋白 (+++), 镜检有少数红细胞。最有可能的诊断是

- A. 斑疹伤寒
- B. 肾综合征出血热
- C. 伤寒
- D. 钩端螺旋体病
- E. 上呼吸道感染

56. 男, 45 岁。发热、血 ALT 升高 (ALT42~ 78U/L) 1 个月。身高 170cm, 体重 90kg。各项病毒学指标及自身免疫抗体均阴性。腹部 B 超: 肝脏回声增强, 后部衰减。最佳的治疗措施是
- A. 应用降脂药
 - B. 休息并减少体力活动
 - C. 应用保肝药物
 - D. 抗肝纤维化治疗
 - E. 调整生活方式并减轻体重
57. 女, 30 岁。肛周疼痛 3 天, 排便时加重。查体: 肛门左侧局部压痛, 有波动感。血 WBC $11.9 \times 10^9/L$, 首选的治疗方法是
- A. 广谱抗生素静脉滴注
 - B. 高锰酸钾坐浴
 - C. 对症止痛、镇静
 - D. 手术切开引流
 - E. 肛门应用消炎痛栓
58. 男, 64 岁。巩膜黄染、尿色深黄 2 周。无腹痛、发热。查体: 右上腹可触及肿大胆囊, 无压痛。血总胆红素 $156\mu\text{mol/L}$ 。最可能的诊断是
- A. 急性肝炎
 - B. 壶腹周围癌
 - C. 胆总管结石
 - D. 慢性胰腺炎
 - E. 胆囊结石
59. 男, 19 岁。在烈日下打篮球 1 小时, 大汗后出现头痛、头晕、胸闷、心悸, 恶心, 并有腹肌疼痛。T 38.3°C , P108 次/分, BP90/60mmHg。神志清楚, 面色潮红, 双肺未闻及干湿性啰音, 心律齐。最可能的诊断是
- A. 热痉挛
 - B. 热衰竭
 - C. 低血糖
 - D. 热射病
 - E. 脱水
60. 男, 19 岁。右上腹被汽车撞伤 2 小时, 查体: P138 次分, BP80/60mmHg, 面色苍白, 四肢厥冷, 腹肌紧张, 压痛及反跳痛阳性, 肠鸣音减弱。实验室检查: Hb 85g/L , WBC $2.8 \times 10^9/L$ 。最有可能的诊断是
- A. 小肠破裂
 - B. 胃破裂
 - C. 结肠损伤
 - D. 肝破裂
 - E. 十二指肠和胰损伤
61. 男, 76 岁。无排便 7 天, 腹痛、呕吐 2 天。平素便秘。查体: 肠鸣音亢进, 最有可能的诊断是
- A. 急性胃炎
 - B. 急性腹膜炎
 - C. 急性阑尾炎
 - D. 急性胰腺炎

E. 急性肠梗阻

62. 男, 19 岁。发热、头痛 3 天, 神志不清半天于 8 月 5 日来诊。体温 39℃, 服用感冒药无效。头痛剧烈难忍, 伴呕吐, 来诊当日出现神志不清。居住地蚊子多。查体: T40℃, P120 次/分, BP130/90mmHg, 意识模糊, 躁动, 皮肤无皮疹, 双侧瞳孔等大等圆。颈抵抗(+), 克氏征、布氏征、巴氏征(+)。实验室检查: 血 WBC $16.5 \times 10^9/L$, N0.8。为明确诊断最重要的检查是
- A. 头颅 CT
 - B. 血培养
 - C. 脑脊液检查
 - D. 血涂片查疟原虫
 - E. 特异性 gM 抗体
63. 女, 50 岁。反复癫痫发作 1 周。查体: BP130/86mmHg, 一般情况好, 上肢皮下可触及数个黄豆大小结节, 无压痛, 心肺查体无异常, 腹软无压痛。为明确病因诊断, 应做的检查是
- A. 抗核抗体检查
 - B. 脑电图
 - C. 头颅 CT
 - D. 包虫皮试
 - E. 皮下结节活检
64. 男, 64 岁。上腹饱胀不适 4 个月, 皮肤进行性黄染 3 个月。查体: 皮肤、巩膜明显黄染。右上腹肋边缘下可触及囊性包块, 无触痛。为明确是否可行手术根治切除病灶, 首选的检查是
- A. 上消化道 X 线钡剂造影
 - B. 腹部 B 超
 - C. PET-CT
 - D. 胃镜
 - E. 腹部 CT
65. 女, 25 岁。5 天前突然寒战, 继之高热伴头痛, 自服退热药后热退出汗, 2 日后再次寒战、高热, 持续数小时, 出汗后退热, 乏力, 精神差。1 周前由云南到北方旅游。实验室检查: 血 WBC $6.5 \times 10^9/L$, L0.40。最可能的诊断是
- A. 流行性乙型脑炎
 - B. 流行性感冒
 - C. 钩端螺旋体病
 - D. 败血症
 - E. 疟疾
66. 女, 30 岁, 平素体健。甲状腺腺瘤切除术后换药, 切口无红肿。手术切口拆线时间段应是术后
- A. 6~7 天
 - B. 2~3 天
 - C. 10~12 天
 - D. 7~9 天
 - E. 4~5 天
67. 男, 25 岁。腰痛 2 年。有过 2 次左眼虹膜炎发作。查体: 左足跟轻度肿胀及压痛(+), 右膝肿胀及压痛(+), 浮髌试验(+). 实验室检查: LA-B27(+), 血沉 32mm/h。最可能的诊断是

- A. 强直性脊柱炎
 - B. 白塞病
 - C. 类风湿关节炎
 - D. 痛风关节炎
 - E. 感染性关节炎
68. 男，76岁。左下肢间歇性跛行3年，加重1个月。既往史：高血压病史8年，冠心病病史5年，曾行冠脉支架植入术。查体：BP150/90mmHg，左足苍白，左足及左下肢皮温明显降低，左足背动脉、腘动脉搏动消失，左股动脉可触及搏动，最可能的诊断是左下肢
- A. 急性动脉栓塞
 - B. 深静脉血栓形成
 - C. 动脉硬化性闭塞症
 - D. 血栓性浅静脉炎
 - E. 血栓闭塞性脉管炎
69. 女，25岁，初孕妇。妊娠12周，尿频、尿急尿痛伴阴道分泌物增多4天。查体：尿道口及宫颈口均见脓性分泌物。为确诊，首选的辅助检查是
- A. 羊水培养
 - B. 血培养
 - C. 宫颈管分泌物培养
 - D. 血清学检查
 - E. 尿培养
70. 女，64岁。大量呕血1天。给予禁食、外周补液治疗。查体：P100次/分，BP90/60mmHg，CVP5cmH₂O。10分钟内静脉输入等渗盐水250ml后，测得BP110/70mmHg，CVP5cmH₂O。提示病情最可能的情况是
- A. 创伤反应
 - B. 心力衰竭
 - C. 血容量不足
 - D. 血容量相对过多
 - E. 容量血管过度收缩
71. 男，25岁。牙龈出血1周，骨髓细胞学检查：增生极度活跃，原始淋巴细胞占0.72。行VDIP方案化疗14天后体温37.4℃，复查血常规：Hb70g/L，WBC $1.4 \times 10^9/L$ ，分类N0.10，L0.90，PLT $30 \times 10^9/L$ 。目前首选的治疗是
- A. 输注悬浮红细胞
 - B. 应用抗生素控制感染
 - C. 输注新鲜血浆
 - D. 输入浓缩血小板
 - E. 皮下注射G-CSF
72. 女，50岁。车祸致腹部损伤3小时。伤后腹痛、腹胀。在急诊室非手术治疗观察期间，最重要的措施是
- A. 实验室检查的动态监测
 - B. 全面了解损伤经过
 - C. 腹部X线检查
 - D. 腹部B超的动态检查
 - E. 观察腹部体征的变化

73. 男 64 岁。上腹部不适、隐痛 2 个月，逐渐加重，有胀满感，食欲下降，曾服多种药物治疗无好转。无胃病史。查体：略消瘦，腹部未见阳性体征。化验血 Hb100g/L，粪隐血（+）。首先考虑的诊断是
- A. 慢性胃炎
 - B. 胃溃疡
 - C. 胃黏膜脱垂
 - D. 胃癌
 - E. 急性胃黏膜病变
74. 男，45 岁。左下肢疼痛发凉半年。既往有左下肢血栓性浅静脉炎病史，无高血压、糖尿病病史。吸烟 20 年，20 支/天。查体：右下肢正常；左足苍白，皮温明显降低，左足背动脉搏动消失，左股、腰动脉可触及搏动。Buerger 试验阳性。最有可能的诊断是左下肢
- A. 急性动脉栓塞
 - B. 血栓闭塞性脉管炎
 - C. 原发性下肢静脉曲张
 - D. 动脉硬化性闭塞症
 - E. 深静脉血栓形成
75. 女，30 岁。4 年前血小板减少，2 年前间断面部红斑伴低热。实验室检查：抗核抗体（+），抗心磷脂抗体（+），诊断系统性红斑狼疮。此次妊娠 6 个月，胎死宫内，同时出现左下肢深静脉血栓。考虑合并的疾病是
- A. 妊娠期高血压疾病
 - B. 干燥综合征
 - C. 弥散性血管内凝血
 - D. 抗磷脂综合征
 - E. 血管闭塞性脉管炎
76. 男，45 岁。腹部撞伤后脐周 2 小时，呈持续性，伴恶心，无呕吐，腹部范围迅速扩大。查体：P126 次/分，BP146/90mmHg，全腹肌紧张，压痛和反跳痛阳性，肠鸣音消失。准备剖腹探查。手术治疗的原则不包括
- A. 尽量分离粘连组织
 - B. 处理原发病灶
 - C. 关腹前用生理盐水反复冲洗腹腔
 - D. 留置引流术，保证引流通畅
 - E. 术后进食并胃肠减压
77. 男，19 岁。被人踢伤腹部，腹痛 8 小时，尿少 2 小时。查体：BP68/50mmHg，意识模糊，面色苍白，四肢冷，脉搏细速，全腹压痛，腹肌紧张，反跳痛（+），移动性浊音（+）。该患者目前的病情为
- A. 神经源性休克
 - B. 心源性休克
 - C. 过敏性休克
 - D. 感染性休克
 - E. 低血容量性休克
78. 男，56 岁。乙型肝炎病史 15 年，肝区隐痛 2 个月。腹部 B 超提示肝后叶直径约 2cm 的低回声结节。对诊断最有意义的实验室检查是
- A. 碱性磷酸酶
 - B. 癌胚抗原

- C. γ -谷氨酰转移酶
- D. 甲胎蛋白
- E. CA19-9

79. 女, 30 岁。饮酒后突发上腹痛 4 小时, 无发热。血常规: Hb120g/L, WBC $8.5 \times 10^9/L$, PLT $125 \times 10^9/L$, 血淀粉酶 1032U/L。腹部 B 超提示: 胰腺略饱满。首要的治疗措施是

- A. 应用 5-氟尿嘧啶
- B. 应用广谱抗生素
- C. 禁食、胃肠减压
- D. 胆管引流
- E. 剖腹探查

80. 男, 70 岁。突发剧烈头痛、呕吐、左侧肢体活动障碍 6 小时, 昏迷 5 小时。1 小时前呕暗红色血液 1 次。应首先考虑的呕血原因是

- A. 急性胃黏膜病变
- B. Dieulafoy 病变
- C. 胃癌
- D. 肝硬化食管胃底静脉曲张破裂
- F. 十二指肠溃疡

81. 女, 50 岁。甲状腺多发结节 3 年。颈部超声提示: 甲状腺双侧叶多发囊性、实性结节。实验室检查: T_3 、 T_4 、TSH 正常。在随访过程中, 手术治疗指征中不包括

- A. 甲状腺结节增大伴憋气
- B. 甲状腺结节的数量增加
- C. 出现甲状腺功能亢进
- D. 出现胸骨后甲状腺肿
- E. 结节边界不清并细小钙化

82. 女, 30 岁。面色苍白半年, 2 个月前诊断为系统性红斑狼疮。查体: 贫血貌, 皮肤巩膜轻度黄染, 脾肋下 2cm。血常规: Hb78g/L, WBC $4.4 \times 10^9/L$, PLT $72 \times 10^9/L$, Ret0.14。最可能出现结果异常的实验室检查是

- A. Ham 试验
- B. Coombs 试验
- C. 尿 Rous 试验
- D. 红细胞渗透脆性试验
- E. 异丙醇试验

83. 男, 45 岁。左右腿车轮碾压伤 2 小时。查体: $T37.2^\circ C$, P145 次/分, R28 次/分, BP89/55mmHg 神情淡漠, 面色苍白, 口唇干燥。两肺呼吸音清。腹软, 无压痛。左小腿中部开放性外伤, 伤口近端在院外已用止血带缚扎 30 分钟, 伤口无明显渗血。足背动脉搏动弱。此时该患者处理措施中错误的是

- A. 补充血容量
- B. 放开止血带, 以免远端肢体缺血
- C. 做好术前准备, 急诊手术
- D. 备血
- E. 中心静脉置管

84. 女, 25 岁。右上腹刀刺伤 1 小时, 烦躁、恶心、呕吐。查体: P105 次/分, BP110/80mmHg。腹肌紧张, 有局限压痛和反跳痛。CVP4cmH₂O, Hb100g/L, 血细胞比容 0.35。首先应进行的处理是

- A. 镇静、止痛
 - B. 肠胃减压
 - C. 抗生素静滴
 - D. 快速输平衡盐溶液
 - E. 快速输全血
85. 女，70岁。胃癌根治术后7天。因肺部感染，突发剧烈咳嗽后出现腹部手术切口疼痛，有大量淡红色溢出液。该患者可能发生的并发症是
- A. 切口感染
 - B. 腹部切口疝
 - C. 切口内血肿
 - D. 切口脂肪液化
 - E. 切口裂开
86. 女，70岁。家中浴室洗澡2小时后，被发现昏迷在浴室内，室内燃气炉取暖，门窗紧闭。查体：昏迷，呼吸不规则，BP110/70mmHg。现场急救的首要措施是
- A. 搬离现场
 - B. 吸入高浓度氧气
 - C. 给予气管插管呼吸机辅助呼吸
 - D. 口对口人工呼吸
 - E. 保持呼吸道通畅
87. 男，64岁。乏力、消瘦，伴大便次数增多4个月。查体：面色苍白，腹平软，右侧腹部可触及直径约5cm包块。实验室检查：Hb80g/L，粪隐血(+)。最可能的诊断是
- A. 十二指肠癌
 - B. 胆囊癌
 - C. 阑尾类癌
 - D. 升结肠癌
 - E. 胰头癌
88. 女，70岁。突发上腹痛12小时，伴寒战、发热。既往因十二指肠溃疡行胃大部切除毕Ⅱ式吻合术。查体：T39.5℃，P110次/分，BP80/50mmHg，皮肤、巩膜黄染。右上腹及剑突下肌紧张，压痛、反跳痛(+)。血WBC $16 \times 10^9/L$ 。腹部B超示：胆总管扩张，下段受肠气影响观察不清。该患者首选的手术方式是
- A. 胆肠吻合术
 - B. 胆囊切除术
 - C. 胆总管切开引流术
 - D. 胆囊造瘘术
 - E. 经内镜十二指肠乳头切开术
89. 男，45岁。胃镜检查提示十二指肠球部溃疡，经药物治疗3个月仍反复发作。行胃大部切除毕Ⅱ式吻合术。术后并发症属于远期并发症的是
- A. 输入袢梗阻
 - B. 早期倾倒综合征
 - C. 输出袢梗阻
 - D. 胃排空障碍
 - E. 十二指肠残端破裂

90. 男, 25 岁。腹痛、脓血便、发热 2 个月。大便 10 次/日, 体温 39℃。粪镜检及培养未见病原体。结肠镜检查示结肠弥漫分布的糜烂及残溃疡。病理学提示重度慢性炎症。左氧氟沙星联合甲硝唑治疗 1 周症状无缓解。最适宜的治疗药物是
- A. 泼尼松
 - B. 柳氮磺吡啶
 - C. 硫唑嘌呤
 - D. 美沙拉嗪
 - E. 美沙拉嗪联合美沙拉嗪栓
91. 男, 64 岁。突发上腹痛 3 小时, 持续性, 由上腹扩展到全腹, 伴恶心、呕吐。查体: P110 次/分, BP138/96mmHg。呼吸浅快, 腹胀, 腹肌紧张, 压痛和反跳痛阳性, 肝浊音界消失, 肠鸣音消失。下列术前处理措施中最重要的是
- A. 补液
 - B. 胃肠减压
 - C. 应用抗生素
 - D. 半卧位
 - E. 吸氧
92. 女, 30 岁。腹胀、便秘、发热、乏力 7 个月。1 周来症状加重。查体: T37.7℃, 右下腹触及 4cm×5cm 肿块, 质中等, 边界不清, 轻触痛。粪常规 (-) 结肠镜发现回盲部环形溃疡。最可能的诊断是
- A. 阑尾周围脓肿
 - B. 克罗恩病
 - C. 右卵巢囊肿
 - D. 肠结核
 - E. 结肠癌
93. 女, 50 岁。皮肤、巩膜黄染 2 个月。进行性加重, 伴厌食、乏力。大便灰白, 体重减轻 3kg。查体: 巩膜、皮肤黄染, 肝肋下 3cm, 边缘钝, 无结节, 可触及肿大胆囊, Murphy 征 (-)。血清总胆固醇结合胆红素、ALP、 γ -GT 均显著升高, CA19-9 升高。首选的影像学检查是
- A. 核素扫描
 - B. 腹部 CT
 - C. MRCP
 - D. 腹部 MRI
 - E. 腹部 B 超
94. 男, 45 岁。反复上腹痛 2 年, 黑便 2 天, 呕血伴头晕 4 小时, 最适宜的止血治疗方式是
- A. 急症手术
 - B. 经胃镜止血
 - C. 静脉应用血管加压素
 - D. 冰盐水胃腔灌注
 - E. 口服凝血酶
95. 男, 56 岁。饮酒及高脂饮食后突发上腹疼痛 4 小时, 向背部放射, 伴呕吐、大汗、尿色黄。对诊断最有辅助的辅助检查是
- A. 上消化道 X 线钡剂造影
 - B. 腹部 CT
 - C. 肝胆核素扫描
 - D. 立位腹部 X 线平片

E. 胃镜

96. 男, 55 岁。大面积烧伤 5 天, 突发寒战、高热伴意识不清 1 天。查体: T35.6°C, P120 次/分, BP90/60mmHg。血 WBC $2.7 \times 10^9/L$ 。该患者最可能感染的致病菌是

- A. 革兰阴性杆菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 肠球菌
- D. 乙型溶血性链球菌
- E. 白念珠菌

97. 女, 64 岁。拟行直肠癌根治术。2 型糖尿病病史 20 余年。现每日皮下注射胰岛素, 平素晨起应用胰岛素 12U。空腹血糖常为 7-10mmol/L, 尿糖 (+~++)。下列围手术期处理不恰当的是

- A. 手术当日测定空腹血糖
- B. 必须将空腹血糖控制到正常水平
- C. 术前应用葡萄糖及胰岛素
- D. 原糖可维持原水平
- E. 手术日晨停用胰岛素

98. 男, 25 岁。肛门剧烈疼痛伴异物感 1 天, 局部有肿物突出。平素便秘, 无便血史。查体: T36.5°C, 肛门口见直径 2.0cm 肿物, 稍硬, 呈暗紫色, 触痛。最可能的诊断是

- A. 肛裂
- B. 混合痔
- C. 血栓性外痔
- D. 直肠息肉
- E. 内痔突出

99. 女, 50 岁。纳差 5 年, 面色苍白、乏力半年。胃镜检查见胃体黏膜苍白、变薄、血管透见明显。最可能的实验室检查结果是

- A. 基础胃酸分泌增加
- B. 正细胞正色素性贫血
- C. 血液酸水平升高
- D. 血促胃液素水平降低
- E. 血维生素 B₁₂ 水平降低

100. 女, 25 岁, 妊娠 26 周。颈部增粗伴憋气 1 个月。查体: P100 次/分, BP100/70mmHg。甲状腺 III 度肿大, 气管左偏。实验室检查: T₃、T₄ 高于正常。首选的治疗方法是

- A. 口服甲状腺素片
- B. 同位素 ¹³¹I 治疗
- C. 外放射治疗
- D. 口服丙硫氧嘧啶
- E. 手术治疗

101. 女, 30 岁。腹痛伴低热、腹泻便秘交替 1 个月。查体: 右下腹压痛, 可触及边界不清的包块, 活动度差。对明确诊断最有意义的检查是

- A. 腹部 CT
- B. B 超引导下腹部包块穿刺
- C. 结肠 X 线钡剂造影
- D. 腹腔血管造影
- E. 结肠镜

102. 男, 64 岁。拟行胃癌根治术, 平素吸烟 20 支/日。查体: T37.5℃, P90 次/分, BP155/95mmHg。血 K⁺3.0mmol/L, ALB35g/L。正确的术前准备是
- A. 静脉补充人血白蛋白
 - B. 口服肠道抗生素
 - C. 术前 3 天戒烟
 - D. 补钾
 - E. 降低血压至正常
103. 女, 41 岁。腹胀、腹痛、低热 2 个月。腹部 B 超示腹腔积液。血白蛋白 30g/L, 当日腹腔穿刺抽出草黄色微浑浊的液体。腹水检查示: 比重 1.023, 白蛋白 22g/L, 单个核细胞比例 0.88。最可能的诊断是
- A. 结缔组织病
 - B. 恶性肿瘤
 - C. 继发性腹膜炎
 - D. 结核性腹膜炎
 - E. 原发性腹膜炎
104. 男, 45 岁。5 年来每于餐后半小时出现上腹饱胀、疼痛, 持续约 2 小时后可自行缓解, 常有反酸、暖气, 偶有大便颜色发黑。近期行上消化道 X 线钡剂造影提示胃窦小弯侧 1cm 大小壁外龛影, 边缘光滑。该患者若手术治疗常采用的术式是
- A. 胃大部切除术 (毕 II 式吻合)
 - B. 胃大部切除术 (毕 I 式吻合)
 - C. 高选择性迷走神经切断术
 - D. 全胃切除
 - E. 选择性迷走神经切除术
105. 男, 64 岁。上腹疼痛 5 小时。胆囊多发结石病史 5 年。查体: T38.3℃, P100 次/分, BP85/60mmHg, 皮肤、巩膜黄染, 右上腹肌紧张, 压痛 (+)。为明确诊断, 首选的检查是
- A. 经内镜逆行胰胆管造影
 - B. 腹部 B 超
 - C. 腹部 CT
 - D. 胆道镜检查
 - E. 经皮肝穿刺胆管造影
106. 女, 25 岁。四肢皮肤瘀斑 2 周, 血常规: Hb80g/L, RBC $2.6 \times 10^{12}/L$, WBC $1.5 \times 10^9/L$, Ret0.004。最可能的诊断是
- A. Evans 综合征
 - B. 骨髓增生异常综合征
 - C. 特发性血小板减少性紫癜
 - D. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
 - E. 再生障碍性贫血
107. 男, 19 岁, 拔牙后出血不止 2 天。查体: 心肺及肺部未见异常。实验室检查: Hb115g/L, WBC 5.4×10^9 , plt $130 \times 10^9/L$, PT11s (正常对照 13s), APTT65s (正常对照 38s), TT16s (正常对照 17s) 最可能的诊断是该患者出血最可能的原因是
- A. 纤维蛋白原缺乏
 - B. 维生素 K 缺乏
 - C. 凝血因子 X 缺乏
 - D. 凝血酶原缺乏

E. 凝血因子缺乏

三、A3/A4型选择题（108~138题）

（108~109 题共用题干）

男，45岁。上腹部疼痛9小时。向腰背部放射，伴恶心、呕吐。发病前大量饮酒，查体：T38.3℃，P100次/分，上腹部肌紧张，压痛、反跳痛阳性。

108. 最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 十二指肠溃疡穿孔
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性胃肠炎
- E. 急性肠梗阻

109. 为明确诊断，首选的检查是

- A. 血清脂肪酶
- B. 血清淀粉酶
- C. 尿淀粉酶
- D. 肝功能
- E. 立位腹部X线平片

（110~112 题共用题干）

男，25岁。晨起觉脐周疼痛，伴恶心。午后觉右下腹明显疼痛，不能忍受。查体：T38.0℃，BP110/80mmHg，右下腹肌紧张、压痛、反跳痛阳性。

110. 该患者最可能的诊断是

- A. 十二指肠溃疡穿孔
- B. 肠系膜上动脉栓塞
- C. 急性肠梗阻
- D. 急性阑尾炎
- E. 急性胆囊炎

111. 为明确诊断首选的检查是

- A. 诊断性腹腔穿刺
- B. 胃镜
- C. 腹部B超
- D. 腹部CT
- E. 上消化道X线钡剂造影

112. 该患者行手术治疗，手术后6小时两次出现腹痛，烦躁焦虑。查体：P110次/分，BP80/60mmHg，面色苍白，皮肤湿冷，腹稍胀，全腹压痛，轻度肌紧张，肠鸣音减弱。最有可能的术后并发症是

- A. 消化道穿孔
- B. 肠系膜血栓栓塞
- C. 肠坏死
- D. 腹腔内出血
- E. 急性肠梗阻平点

（113~114 题共用题干）

男，45岁。间断腹痛、腹泻3年，排便4~5次/天，便不成形，无脓血，黏液，服小柴碱（黄连素）、氟哌酸可稍缓解，近半月症状加重，大便7~8次/天，查大便常规正常，大便无脂肪滴。大便无脂肪滴。

113. 诊断应首选考虑

- A. 肠道菌群失调
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 肠易激综合征
- D. 细菌性痢疾
- E. 结肠癌

114. 用哪种检查确诊最可靠

- A. 腹部 B 超
- B. 血肿瘤标志物
- C. 腹部 CT
- D. 结肠镜
- E. 下消化道 X 线钡剂造影

(115~118 题共用题干)

男, 55 岁。乏力、食欲减退 1 个月, 症状逐渐加重尿黄及眼黄 1 周。2 个月前家中装修房子及搬家劳累。慢性乙型肝炎 20 年。无明显症状, 未监测肝功能, 未进行抗 HBV 治疗。查体: 慢性病容, 神志清, 皮肤巩膜黄染, 腹部胀气, 脾于肋下可触及, 腹水征可疑。实验室检 ALT 250U/L, AST 300U/L, TBIL 300 μmol/L, ALB 30g/L, HBsAg (+), 抗 HBC (+), HBV DNA 6×10^7 /ml

115. 最可能的诊断是

- A. 淤胆型肝炎
- B. 急性重症肝炎
- C. 慢性重型肝炎
- D. 亚急性重型肝炎
- E. 慢性肝炎

116. 为进一步评价病情严重程度, 需进行的检查是

- A. 腹部 MRI
- B. 凝血酶原活动度
- C. 腹部 B 超
- D. 腹水常规
- E. 血常规

117. 为抢救患者, 最急需的治疗措施是

- A. 静脉滴注白蛋白
- B. 静脉滴注支链氨基酸
- C. 静脉滴注甘草酸制剂
- D. 人工肝支持治疗
- E. 抗生素预防感染

118. 为遏制病情进展, 最需要的治疗药物是

- A. 免疫增强剂
- B. 恩替卡韦
- C. 免疫抑制剂
- D. 白细胞介素
- E. 干扰素

(119~121 题共用题干)

男，45岁。8个月前骑电动车时摔倒，上腹部被车把撞伤并疼痛，经治疗后缓解。6个月前觉上腹部逐渐隆起，伴上腹饱胀，近日来常恶心呕吐。查体：上腹部可触及直径约10cm包块，无肌紧张压痛、反跳痛。

119. 应首选的检查是

- A. 腹部 CT
- B. 腹部 B 超
- C. 立位腹部 X 线平片
- D. 腹部 MRI
- E. 胃镜

120. 影像学检查提示该患者上腹部 10cm×10cm 囊性肿物，其最可能的诊断是

- A. 腹部后血肿
- B. 膈疝
- C. 肝左叶囊肿
- D. 胰腺假性囊肿
- E. 十二指肠憩室

121. 该患者最合适的手术方式是

- A. 腹膜后血肿清除术
- B. 膈疝修补术
- C. 肝左叶囊肿开窗术
- D. 胰腺囊肿内引流术
- E. 十二指肠憩室修补术

(122~123 题共用题干)

女 55 岁。右乳房肿块 6 个月，不伴疼痛，无乳头溢液。查体：右乳外上象限可触及 6cm×5cm 肿块，质硬，边界不清。右腋窝可触及数个肿大淋巴结，部分融合。

122. 肿块穿刺活检确诊为乳腺癌后，首选的治疗方式是

- A. 保乳手术
- B. 改良根治术
- C. 放射治疗
- D. 术前化疗
- E. 靶向治疗

123. 确定该患者是否需要进行内分泌治疗的指征是

- A. HER2 表达情况
- B. 肿瘤大小
- C. ER 表达情况
- D. 是否伴有淋巴结转移
- E. 是否伴有全身转移

(124~125 题共用题干)

男，25岁。火焰烧伤头面、前胸和四肢后30分钟来诊。查体：BP90/50mmHg，神志清，表情痛苦，烦躁不安。心率快，脉搏细弱。部分伤面呈黑痂，部分伤面有水疱，基底呈红色，痛觉过敏

124. 最重要的紧急处理是

- A. 止痛、镇静
- B. 快速静脉补液
- C. 创面处理
- D. 静滴抗生素

E. 注射破伤风抗毒素

125. 患者静脉补液时，对调整补液的量和速度，最客观且简单的临床指标是

- A. 心率
- B. 血压
- C. 尿量
- D. 指甲毛细血管充盈状况
- E. 精神和意识状态

(126~128 题共用题干)

男，55 岁。颈部淋巴结进行性肿大 2 个月，发热 2 周。发病以来体重减轻 14kg。查体：T38.7℃，双侧颈部和右腋窝均有数个直径 2~5cm 大小淋巴结，均活动，无压痛，心肺未见异常，腹平软，肝脾肋下未触及，血常规和骨髓检查均未见异常。左颈部淋巴结活检确诊为弥漫性大 B 细胞淋巴瘤。

126. 为判断该患者淋巴瘤诊断是 A 组或 B 组，还应询问的病史是

- A. 发热类型
- B. 皮肤有无瘙痒
- C. 是否有盗汗
- D. 食欲情况
- E. 睡眠情况

127. 为判断淋巴瘤临床分期，首选的辅助检查是

- A. 胸、腹部 CT
- B. 肝功能
- C. 肾功能
- D. 心电图
- E. 血常规

128. 该患者治疗方案应首选

- A. ABVD
- B. R-CHOP
- C. MOPP
- D. DA
- E. VDLP

(129~130 题共用题干)

男，55 岁。慢性乙型肝炎病史 15 年，乏力、间断下肢水肿 5 年。腹泻 4 天，发热、腹胀、尿少 3 天。查体：全腹压痛，移动浊音阳性。

129. 最可能的诊断是

- A. 急性细菌性痢疾
- B. 急性肾功能衰竭
- C. 结核性腹膜炎
- D. 自发性腹膜炎
- E. 肝癌

130. 对明确诊断最有帮助的检查是

- A. 腹部 CT
- B. 腹部 B 超
- C. 粪细菌培养
- D. 腹腔穿刺抽液检查

E. 结核菌素试验

(131~132 题共用题干)

男, 25 岁。右前红肿 2 天, 畏寒、发热 1 天。局部表皮发红, 微隆起, 指压稍褪色, 边界清, 右腹股沟淋巴结肿痛。

131. 最可能的诊断是

- A. 疖
- B. 气性坏疽
- C. 疔
- D. 丹毒
- E. 急性蜂窝织炎

132. 目前最主要的处理措施是

- A. 理疗
- B. 局部抗生素湿敷
- C. 限制活动
- D. 青霉素静脉滴注
- E. 切开引流

(133~134 题共用题干)

男, 25 岁。腰背部疼痛 8 年, 晨起明显, 活动后减轻。近 1 个月腰痛加重, 活动受限。查体: 腰椎前屈、后伸受限, Schober 试验 (+), 双侧“4”字试验 (+)。

133. 最可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 痛风关节炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 反应性关节炎
- E. 强直性脊柱炎

134. 对确诊最有价值的检查是

- A. 血沉
- B. 骶髂关节 X 线片
- C. 血常规
- D. HLA-27
- E. 类风湿因子

(135~136 题共用题干)

男, 64 岁。胸骨后烧灼样疼痛 2 周, 伴暖气, 偶有吞咽不畅。口服奥美拉唑治疗 2 周后缓解。

135. 应首先考虑的诊断是

- A. 消化性溃疡
- B. 食管癌
- C. 心绞痛
- D. 贲门失迟缓症
- E. 胃食管反流病

136. 目前首选的检查是

- A. 心电图
- B. 冠状动脉造影
- C. 胃镜
- D. 24 小时食管监测

E. 超声心动图

四、B型选择题

(137~138 题共用备选答案)

- A. 阑尾坏疽穿孔
- B. 阑尾类癌
- C. 形成阑尾周围脓肿
- D. 门静脉炎
- E. 盲肠后位阑尾炎

137. 急性阑尾炎患者, 未及时就诊, 出现右下腹包块, 有压痛, 最可能的情况是

138. 急性阑尾炎患者, 出现寒战、高热及巩膜黄染, 最可能的情况是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 吞咽困难
- B. 上腹痛伴贫血
- C. 反复反酸、烧心伴胸痛
- D. 突发上腹刀割样疼痛向腰背部放射
- E. 间断餐后上腹部胀痛伴暖气, 不影响睡眠

139. 首先考虑功能性消化不良的临床表现是

140. 首先考虑胃癌的临床表现是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 边缘区淋巴瘤
- B. 间变性大细胞淋巴瘤
- C. Burkitt 淋巴瘤
- D. 弥漫性大 B 细胞淋巴瘤
- E. 套细胞淋巴瘤

141. 属于 T 细胞淋巴瘤的是

142. 属于惰性淋巴瘤的是

(143~144 题共用备选答案)

- A. Barrett 上皮
- B. 胃上皮化生
- C. 乳头状瘤。
- D. 胃黏膜上皮细胞异型增生
- E. 黏膜中性细胞浸润

143. 与胃癌发病关系密切的病理改变是

144. 与食管腺癌发病关系密切的病理改变是

(145~146 题共用备选答案)

- A. PaCO₂ 升高
- B. [HCO₃⁻] 增多
- C. PaCO₂ 降低
- D. 阴离子间隙减少
- E. [HCO₃⁻] 减少

145. 代谢性酸中毒主要是由于体内

146. 代谢性碱中毒主要是由于体内

(147~148 题共用备选答案)

- A. 单纯疱疹病毒

- B. 苍白密螺旋体
 - C. 人免疫缺陷病毒
 - D. 人乳头瘤病毒
 - E. 革兰阴性双球菌
147. 尖锐湿疣的病原体是
148. 梅毒的病原体是
- (149~150 题共用备选答案)

- A. 充盈缺损
 - B. 鹅卵石征
 - C. 杯口征
 - D. 铅管征
 - E. 鸟嘴征
149. 克罗恩病的典型 X 线征象是
150. 乙状结肠扭转的典型 X 线征象是

第四单元

一、A1型题

1. 下列药物容易通过胎盘而影响胎儿的是
- A. 所有激素类药物
 - B. 分子量大的药物
 - C. 极性药物
 - D. 血浆蛋白结合率低的药物
 - E. 脂溶性低的药物
2. 枕骨大孔疝描述正确的是
- A. 小脑扁桃体及延髓被推挤向椎管
 - B. 枕骨大孔后缘内陷
 - C. 一侧大脑半球的扣带回经镰下疝至对侧
 - D. 枕大池消失
 - E. 枢椎齿状突向上移位
3. 妊娠 10 周后，雌激素的主要来源是
- A. 胎儿—胎盘单位
 - B. 胎儿肾上腺皮质
 - C. 子宫平滑肌
 - D. 胎盘合体滋养细胞
 - E. 卵巢黄体
4. 左向右分流型先天性心脏病出现显著肺动脉高时，主要改变为
- A. 右心室增大
 - B. 左心房增大
 - C. 左心室增大
 - D. 左心房、左心室增大

E. 右心房增大

5. 先兆偏头痛的先兆特点是

- A. 感觉先兆多为双侧麻木
- B. 必须在头痛前发生而非与头痛同时发生
- C. 视觉先兆多为偏盲
- D. 多表现为偏侧运动障碍
- E. 持续时间为5~60分钟

6. 下列导致女性不孕的因素中, 最常见的是

- A. 免疫因素
- B. 外阴、阴道因素
- C. 输卵管因素
- D. 子宫因素
- E. 宫颈因素

7. 最易受外界不良因素影响而发生夭折、先天畸形或遗传性疾病的胎龄为

- A. 16周内
- B. 20周内
- C. 28周内
- D. 12周内
- E. 24周内

8. 川崎病的诊断标准不包括

- A. 手足皮肤广泛硬性水肿, 继之手掌、脚底有弥漫性红斑或膜样脱皮
- B. 遍布全身的荨麻疹样、麻疹样, 猩红热样皮疹
- C. 双眼球结膜充血、唇红干裂和杨梅舌
- D. 发热呈稽留热或弛张热
- E. 关节疼痛、肿大

9. 对颅内压增高的患者, 不适宜的处理是

- A. 必要时行颅内压监测
- B. 频繁呕吐者予输液维持水、电解质平衡
- C. 意识不清者应维持其呼吸道通畅
- D. 留院观察
- E. 便秘者行灌肠

10. 关于女性生殖道的生理防御机制, 正确的是

- A. 正常阴道菌群中不包括支原体和念珠菌
- B. 卵巢分泌的孕激素使阴道上皮增厚并富含糖原
- C. 宫颈内口紧闭以及宫颈管有黏液栓利于防止上行感染
- D. 阴道正常情况下呈弱碱性环境
- E. 宫颈阴道部表面为单层鳞状上皮, 抗感染能力强

11. 关于子宫下段说法, 正确的是

- A. 为临产后的子宫颈
- B. 孕16周扩展成宫腔的一部分
- C. 临产后的子宫颈伸展可达7~10cm
- D. 由非孕时的子宫峡部伸展形成
- E. 孕中期的子宫颈扩展为宫腔的一部分

12. 判断风湿热活动性的指标不包括

- A. 血沉增快
 - C. C 反应蛋白阳性
 - C. ASO 增高
 - D. 发热、乏力
 - E. α_2 -球蛋白增高
13. 婴儿出现无胆汁的喷射性呕吐、胃肠蠕动波和右上腹肿块，首先考虑的诊断是
- A. 胃食管反流病
 - B. 胃扭转
 - C. 先天性巨结肠
 - D. 幽门痉挛
 - E. 先天性肥厚性幽门狭窄
14. 关于女性内生殖器解剖正确的是
- A. 子宫峡部非孕期长约 2cm
 - B. 子宫内膜各层均发生周期性变化
 - C. 子宫韧带共有 3 对
 - D. 阴道穹隆中前穹隆最深
 - E. 站立时直肠子宫陷凹为女性腹膜腔最低位置
15. 异位妊娠最常见的发生部位是
- A. 输卵管峡部
 - B. 输卵管壶腹部
 - C. 输卵管间质部
 - D. 输卵管系膜
 - E. 输卵管伞端
16. 小儿结核病最常见的类型是
- A. 结核性胸膜炎
 - B. 粟粒性肺结核
 - C. 结核性腹膜炎
 - D. 原发型肺结核
 - E. 结核性脑膜炎
17. 关于产前检查，正确的是
- A. 妊娠 37 周后每周 2 次
 - B. 一般孕妇妊娠 20~36 周时每 4 周检查一次
 - C. 一般孕妇共进行产前检查 10~20 次
 - D. 首次产前检查是从妊娠 12 周开始
 - E. 高危孕妇从妊娠开始 2 周一次
18. 有关无症状性脑梗死的描述中不正确的是
- A. 无明显体征
 - B. 病因多是动脉粥样硬化
 - C. 多位于非功能区
 - D. MRI 易见脑室旁的白质高信号
 - E. 可引起血管性认知障碍
19. 维生素 D 缺乏性佝偻病与佝偻病性手足抽搐症的发病机制不同点是
- A. 甲状旁腺的功能
 - B. 钙的代谢障碍

- C. 磷的代谢障碍
 - D. 维生素 D 缺乏
 - E. 神经肌肉兴奋性增高
20. 小脑幕切迹疝的最典型表现是
- A. 昏迷、一侧瞳孔散大、对侧肢体偏瘫
 - B. 一侧肢体瘫痪
 - C. 一侧瞳孔散大、同侧肢体偏瘫
 - D. 剧烈头痛
 - E. 呼吸抑制、双侧肢体肌张力下降
21. 川崎病急性期最佳治疗药物是
- A. 丙种球蛋白
 - B. 糖皮质激素
 - C. 丙种球蛋白+阿司匹林
 - D. 阿司匹林
 - E. 糖皮质激素+阿司匹林
22. IUD 取出的时间一般选择在
- A. 月经期第 2~4 日
 - B. 月经来潮 6 小时内
 - C. 月经期第 5~6 日
 - D. 月经前 4~6 日
 - E. 月经干净第 3~7 日
23. 全子宫切除术中无须切断的韧带是
- A. 宫骶韧带
 - B. 子宫主韧带
 - C. 卵巢固有韧带
 - D. 子宫圆韧带
 - E. 骨盆漏斗韧带
24. 关于卵巢性激素正确的是
- A. 孕激素有促进水钠潴留作用，雌激素则促进水钠排泄
 - B. 孕激素使宫颈黏膜分泌增加，性状变稀薄
 - C. 孕激素可使基础体温在排卵后升高 $0.3\sim 0.5^{\circ}\text{C}$
 - E. 雌激素使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜
 - F. 雄激素主要由颗粒细胞分泌，促进乳房发育
25. 小儿出生后各系统，器官的生长发育不平衡，呈现先快后慢的是
- A. 免疫系统
 - B. 生殖系统
 - C. 神经系统
 - D. 消化系统
 - E. 呼吸系统
26. 符合单纯型热性惊厥诊断标准的是
- A. 一次热程中有一次发作
 - B. 惊持续时间 > 15 分钟
 - C. 复发总次数 > 5 次
 - D. 多位局限性发作

E. 发作 1 周后 EEG 检查见棘波、尖波发放

27. 遗忘综合征的三大特征是

A. 谵妄、近记忆障碍、虚构

B. 谵妄、虚构、定向障碍

C. 近记忆障碍、虚幻、定向障碍

D. 近记忆障碍、幻觉、定向障碍

E. 幻觉、虚构、定向障碍

28. 儿童缺铁性贫血的临床表现不包括

A. 面色苍白

B. 肝脾肿大

C. 肢体震颤

D. 食欲不振

E. 心率、呼吸加快

29. 对正常足月新生儿，暂不能引出的神经反射是

A. 吮吸反射

B. 拥抱反射

C. 握持反射

D. 腹壁反射

E. 觅食反射

30. 受损后造成软腭、咽喉部肌肉麻痹的神经核是

A. 三叉神经运动核

B. 面神经核

C. 疑核

D. 下涎核

E. 迷走神经背核

31. 不属于垂体腺瘤的体征的是

A. 视神经萎缩

B. 双颞侧偏盲

C. 停经、泌乳

D. 肢端肥大

E. 癫痫发作

32. 符合多囊卵巢综合征的表现是

A. PRL 正常, FSH $>$ 40U/L

B. FSH、LH 值均 $<$ 5U/L

C. E1/E2 $<$ 1

D. 空腹胰岛素水平降低

E. LH/FSH \geq 2

33. 6 个月以下小儿免疫预防接种不包括

A. 乙肝疫苗

B. 卡介苗

D. 百白破疫苗

C. 麻疹疫苗

E. 脊髓灰质炎疫苗

34. 苯二氮草类药物使用必须通过增加用量才能获得原有剂量所能达到的效果，这种现象称为
- A. 耐受性
 - B. 依赖性
 - C. 戒断性
 - D. 灵敏性
 - E. 特异性
35. 诊断新生儿 ABO 溶血，最重要的检查是
- A. 血常规
 - B. 血型
 - C. 肝功能与胆红素
 - D. 改良直接抗人球蛋白试验
 - E. 血涂片查红细胞形态
36. 导致子宫脱垂最常见的病因是
- A. 从事重体力劳动
 - B. 长期便秘
 - C. 盆底肌肉发育不良
 - D. 底肌肉进行性病变
 - E. 分娩损伤
37. 正确脑出血手术治疗的适应证是
- A. 小脑血肿 >10ml、壳核出血 >40ml、中脑出血
 - B. 壳核出血 >40ml、额叶出血、脑桥出血
 - C. 小脑血肿 >10ml、延髓出血、严重脑室出血
 - D. 脑桥出血、额叶出血、严重脑室出血
 - E. 小脑血肿 >10ml、壳核出血 >40ml、严重脑室出血
38. 最能反映小儿近期营养状态变化的指标是
- A. 身高
 - B. 体重
 - C. 胸围
 - D. 腹围
 - E. 头围
39. 先天性甲状腺功能减退症在新生儿期最早引起注意的临床表现是
- A. 特殊面容
 - B. 智能发育落后
 - C. 生理期黄疸时间延长
 - D. 皮肤粗糙
 - E. 生长发育迟缓
40. 不符合精神检查原则的是
- A. 先问一般性问题，后问实质性问题
 - B. 针对患者的自述症状，应与其认真讨论并当面纠正
 - C. 先提开放式的问题，后提封闭式问题
 - D. 建立好良好的医患关系
 - E. 在交谈过程中需注意非语言性交流
41. 最可能导致胎儿生长受限的主要危险因素是
- A. 母体双阴道单子宫

- B. 两次刮宫史
 - C. 子宫发育畸形
 - D. 孕妇年龄小于 35 岁
 - E. 合并卵巢小囊肿
42. 临床上把患者对自己精神状态的认识和判断能力称为
- A. 洞察力
 - B. 理解力
 - C. 自制力
 - D. 自知力
 - E. 想象力
43. 下述病原体中最易引起脓血便的是
- A. 轮状病毒
 - B. 隐孢子虫
 - C. 鼠伤寒沙门菌
 - D. 产毒性大肠埃希菌
 - E. 致病性大肠埃希菌
44. 建议在妊娠 12 周前行人工流产的心脏病类型是
- A. 动脉导管未闭
 - B. 轻度室间隔缺损
 - C. 二尖瓣狭窄伴肺动脉高压
 - D. 二尖瓣狭窄行人工球囊扩张术后
 - E. 二尖瓣关闭不全
45. 下列表现中，诊断早期妊娠最可靠的依据是
- A. 妇科检查双合诊子宫变软
 - B. 厌恶油腻、恶心、晨起呕吐
 - C. 乳房出现蒙氏结节
 - D. 子宫增大变软与停经月份相符
 - E. 尿频，无尿急
46. 急性脑综合征最多见的幻觉是
- A. 视幻觉
 - B. 听幻觉
 - C. 味幻觉
 - D. 触幻觉
 - E. 嗅幻觉
47. 关于产力的描述正确的是
- A. 肛提肌收缩力协助胎先露在盆腔内进行内旋转
 - B. 子宫收缩力的特点有节律性、不对称性、极性
 - C. 产力只包括子宫收缩力、腹壁肌及膈肌收缩力
 - D. 子宫收缩力只在第一产程起作用
 - E. 第二产程主要是膈肌收缩力的作用
48. 目前对儿童支气管哮喘慢性持续期，首选的药物治疗是
- A. 静脉应用氨茶碱
 - B. 口服白三烯调节剂
 - C. M 受体拮抗剂吸入出

D. β_2 受体激动剂吸入

E. 糖皮质激素吸入

49. 小儿重症手足口病的病原体多为

A. 埃可病毒

B. 人疱疹病毒 6 型

C. 轮状病毒

D. 肠道病毒 71 型

E. 柯萨奇病毒 A 组 16 型

50. 体重为 55kg 的成年慢性贫血患者，输注 1 单位悬浮红细胞可提高血红蛋白的量约是

A. 1g/L

B. 5g/L

C. 10g/L

D. 15g/L

E. 2g/L

二、A2型选择题

51. 女，26 岁。停经 50 天，左下腹胀痛不适 2 天，肛门坠胀 1 天。平素月经规律 BP90/60mmHg
与诊断无关的体征是

A. 子宫稍大变软

B. 后穹隆饱满

C. 宫颈软并着色

D. 宫颈光滑

E. 宫颈举痛

52. 男，48 岁。摔倒后颈部着地，昏迷 30 分钟。急诊头颅 CT 显示双额颞叶高低密度混杂影。
最可能断无关的体征是

A. 硬脑膜下血肿

B. 脑震荡

C. 脑干损伤

D. 蛛网膜下腔出血

E. 脑挫裂伤

53. 女，30 岁，初产妇。孕期检查无异常。妊娠 35 周自然分娩后第 2 天，母婴分离，乳房胀
痛，无红肿，体温 37.1℃，要求继续母乳喂养。首选的处理方法是

A. 少喝水

B. 按时挤奶

C. 生麦芽煎服

D. 抗生素治疗

E. 芒硝外敷

54. 女婴，8 天。拒食、反应差 1~2 天，孕 38 周出生，59 出生体重 2400g。查体：体温升高，
皮肤、巩膜中度黄染，双下肢外侧皮肤硬肿，肝肋下 3cm，脾肋下 1cm。实验室检查：血
WBC $25 \times 10^9/L$ ，N0.75，ALT 30U/L，TbIL210 $\mu\text{mol/L}$ 。最可能的诊断是

A. 足月低出生体重儿、新生儿败血症、新生儿寒冷损伤综合征

B. 极低出生体重儿、新生儿肝炎、新生儿寒冷损伤综合征

C. 早产儿、新生儿败血症、新生儿肝炎

F. 早产儿、新生儿败血症、新生儿寒冷损伤综合征

E. 足月低出生体重儿、新生儿肝炎、新生儿寒冷损伤综合征

55. 女孩, 3 岁。出生时接种过卡介苗, 2 岁半时 PPD 试验硬结直径 6mm, 最近 PPD 试验硬结直径为 18mm。其最可能是
- A. 阴性反应
 - B. 曾经有结核感染
 - C. 新近有结核感染
 - D. 卡介苗接种后反应
 - E. 假阳性反应
56. 女, 30 岁。月经不规律 3 年, 闭经 7 个月, 溢乳 2 月。对诊断最有价值的测定项目是
- A. 促甲状腺激素
 - B. 泌乳素
 - C. 孕激素
 - D. 雄激素
 - E. 雌激素
57. 女, 26 岁, 大学文化。3 天前听到自己丈夫在空难中死亡的噩耗后, 突然表现动作减少, 目光呆滞, 表情茫然, 言语迟缓, 对问话的回答只言片语。该患者的精神症状属于
- A. 亚木僵状态
 - B. 谵妄状态
 - C. 痴呆状态
 - D. 抑郁状态
 - E. 偏执状态
58. 男, 5 岁。出生后数月逐渐出现青紫, 活动后加重。查体: 胸骨左缘第 3 肋间可闻及 3/6 级喷射性收缩期杂音。胸部 X 线片示心脏稍有增大, 心尖圆钝上翘, 肺动脉段凹陷, 上纵隔增宽, 肺门血管影缩小, 肺野透亮度增加。最可能的诊断是
- A. 室间隔缺损
 - B. 房间隔缺损
 - C. 法洛四联症
 - D. 动脉导管未闭
 - E. 完全性大动脉错位
59. 男, 10 岁。体重超过同性别、同身高体重值的 30%。不正确的处理是
- A. 增加运动
 - B. 控制饮食
 - C. 药物治疗
 - D. 心理辅导
 - E. 检测体重
60. 男, 25 岁。头部摔伤, 着力点位于右侧顶枕, 就医时出现“熊猫眼”征, 鼻孔流出血性液体。最可能的诊断是
- A. 双侧视神经损伤
 - B. 脑震荡
 - C. 颅前窝底骨折
 - D. 双眼结膜出血
 - E. 双眼眼睑挫伤
61. 女, 30 岁。剖宫产术后 15 天, 突然阴道大量流血 3 小时。查体: BP80/60mmHg, 心率 125 次/分。化验血 Hb60g/L。该患者应立即采取的常规处理措施
- A. 静滴缩宫素

- B. 静滴广谱抗生素预防感染
- C. 行清宫术止血
- D. B 超检查
- E. 补液、输血
62. 女，45 岁。月经不规律 1 年余，阴道不规则流血 20 天。高血压病史 10 年，服药后血压控制良好。1 年前体检查 HPV (-)，已绝育。妇科检查：子宫正常大小，稍软，无压痛，宫旁未触及异常。为明确诊断，首选的检查是
- A. 阴道镜检查
- B. B 超
- C. 盆腔 MRI
- D. 分段诊刮
- E. TCT
63. 女孩，1 岁。面色渐苍黄 2 个月，烦躁不安，智力及动作发育倒退。出生后母乳喂养。未添加辅食血常规：RBC $2.5 \times 10^{12}/L$ ，Hb 88g/L，MCV 109fl，WBC $5.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞分叶过多，PLT $5.0 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是
- A. 溶血性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 地中海贫血
- E. 营养性巨幼细胞贫血
64. 女，36 岁。已婚 8 年，月经规律，5 年前有一次人工流产。男方精液检查正常。HSG 检查提示双侧输卵管近端阻塞。为促进生育，首选的处理方案是
- A. 人工授精 (AI)
- B. 腹腔镜手术
- C. 卵细胞质内单精子注射 (ICSI)
- D. 体外受精-胚胎移植 (IVF-ET)
- E. 应用促排卵药物
65. 女，45 岁。同房后阴道流血 3 个月，G5P1。妇科检查宫颈重度糜烂状，下唇息肉样赘生物，直径 2cm。三合诊宫颈旁组织无异常。取宫颈赘生物送病理，提示宫颈鳞癌。首选的治疗方法是
- A. 子宫颈切除+盆腔淋巴结切除术
- B. 筋膜外子宫切除术
- C. 根治性放疗
- D. 广泛性子宫颈切除+盆腔淋巴结切除术
- E. 宫颈锥形切除术
66. 女，6 岁。水肿伴尿少 2 天。病前 10 天有“上感”病史。查体：BP 130/90mmHg，眼睑及颜面水肿，双下肢轻度水肿，血 Hb 100g/L。尿常规：沉渣镜检 RBC 20~30 个/HP，WBC 3~5 个/HP，Pro (++)。该患儿最可能的诊断是
- A. 泌尿系统感染
- B. 单纯性肾病综合征
- C. 急进性肾小球肾炎
- D. 肾炎型肾病综合征
- E. 急性链球菌感染后肾炎

67. 女, 26 岁, 初产妇。妊娠 38 周, 规律腹痛 8 小时, 胎膜破裂。骨盆外测量正常, 枕左前位, 胎心率 146 次/分, 宫口开大 6cm, S+1。该产妇的产程进展最可能是
- A. 产程进展正常
 - B. 羊膜腔感染
 - C. 活跃期延长
 - D. 潜伏期延长
 - E. 胎头下降停滞
68. 男, 63 岁。3 小时前长跑后头痛伴呕吐。查体: 嗜睡, 查体不合作。双瞳孔对光反射存在。颈项强直, 四肢活动自如, 肌张力略高, 双侧 Babinski 征阴性。头颅 CT 如图。该患者的诊断是
- A. 脑室肿瘤
 - B. 脉络膜钙化
 - C. 蛛网膜下腔出血
 - D. 脑室出血
 - E. 脑室囊肿
69. 男, 63 岁。确诊结肠癌 1 周, 拟行手术治疗。术前查体: Hb50g/L, 给予输注同型红细胞 4 单位。开始输注 20 分钟后, 患者出现寒战、高热、腰痛、头痛及心前区不适, 面色潮红, 呼吸困难和焦虑不安。该患者最可能发生的输血不良反应是
- A. 输血相关循环超负荷
 - B. 过敏反应
 - C. 输血相关移植物抗宿主病
 - D. 输血相关呼吸困难
 - E. 急性溶血性输血反应
70. 男, 25 岁。头痛 4 个月, 加重 3 周, 有时伴喷射性呕吐。查体: P50 次/分, BP160/90mmHg。双侧视神经乳头水肿。进一步检查和治疗措施为
- A. 腰椎穿刺与甘露醇静滴
 - B. 头颅 CT/MRI 检查与甘露醇静滴
 - C. 胃镜检查与止吐药
 - D. 心电图与降血压药
 - E. 头颅 X 线片与止痛药
71. 女, 26 岁。停经 48 天, 阴道少量流血 5 天, 偶有腹痛, 无发热、腹泻。平素月经规律。查体: T36.6°C, P80 次/分, BP120/65mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及啰音。心律齐, 各瓣膜听诊区未闻及杂音, 腹软, 无压痛。妇科检查: 宫颈软, 宫体稍大且软, 附件无异常。血常规: Hb126g/L, WBC $7.3 \times 10^9/L$, PLT $155 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是
- A. 先兆流产
 - B. 子宫内膜炎
 - C. 子宫肌瘤
 - D. 异位妊娠破裂
 - E. 功能失调性子宫出血
72. 女, 30 岁, 初产妇, 未临产。妊娠 35 周, 恶心、呕吐、乏力伴皮肤黄染、瘙痒 1 周。结合化验检查诊断为妊娠合并乙型病毒性肝炎 (重型)。除保肝治疗外, 应采取的措施是
- A. 尽快使用子宫动脉栓塞术
 - B. 尽快行剖宫产术
 - C. 尽快催产素促进宫颈成熟

- D. 继续妊娠至 37 周
- E. 尽快利凡诺尔腔内引产
73. 女，30 岁。初产妇，身高 160cm。妊娠 39+1 周，规律腹痛 2 小时。查体：足先露，胎膜未破，胎心 138 次/分，骨盆测量正常，宫口开大 1cm，估计胎儿体重 3950g。恰当的处理措施是
- A. 人工破膜
- B. 观察产程进展
- C. 取胸膝卧位
- D. 尽快剖宫产
- E. 行外转胎位术
74. 女，48 岁。外阴瘙痒伴灼热感 3 天。妇科检查见外阴红肿、小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色凝乳状物覆盖。该患者首先考虑为
- A. 前庭大腺炎
- B. 淋菌性阴道炎
- C. 外阴阴道假丝酵母菌病
- D. 滴虫性阴道炎
- E. 细菌性阴道炎
75. 男，35 岁。近 2 个月频繁出现入睡困难、多梦易醒、醒后难以再入睡，白天精力疲乏，影响日常生活工作。每周至少发生 3 次。最常用的治疗药物是
- A. 米氮平
- B. 曲唑酮
- C. 喹硫平
- D. 阿米卡星
- E. 艾司唑仑
76. 女婴，7 个月。诊断“化脓性脑膜炎”，使用青霉素加头孢曲松钠治疗 5 天热退，一般情况好转。近两天又发热，伴间断抽搐 2 次，查体：T39.2℃，前囟饱满。脑脊液检查：白细胞数 $12 \times 10^6/L$ ，蛋白质 0.4g/L，糖 3mmol/L，氯化物 108mmol/L。患儿病情加重应考虑为
- A. 并发脑积水
- B. 并发脑水肿
- C. 并发脑脓肿
- D. 脑膜炎复发
- E. 并发硬脑膜下积液
77. 男，48 岁。长期大量饮酒，自行戒酒 2 天后，出现心悸、大汗、双手震颤、兴奋激越、烦躁不安，晚上还说看见有鬼。对该患者目前的治疗方案不恰当的是
- A. 饮酒缓解戒断症状
- B. 用地西洋缓解戒断症状
- C. 预防感染
- D. 抗精神病药物控制兴奋状态
- E. 补充水、电解质、B 族维生素
78. 男，1 岁。生长落后、智能发育迟缓。刚会独坐，不会站立。查体：身长 60cm，表情呆滞，眼裂宽，鼻梁成人本科低平，眼外眦上斜，四肢短，手指短粗，小指内弯四肢肌张力低下。最可能的诊断是
- A. 先天性甲状腺功能减退症
- B. 蛋白质-能量营养不良

- C. 21-三体综合征
D. 维生素 D 缺乏性佝偻病
E. 苯丙酮尿症
79. 女, 1 岁。未接种过卡介苗, 其父患活动性肺结核, 时有咯血。目前小儿与父母生活在一起, 但无任何症状。小儿胸部 X 线片未见异常, PPD 试验 (+)。除隔离父亲外, 宜对小儿采取的措施是
- A. 口服异烟肼, 疗程 6~9 个月
B. 继续观察, 暂不作任何处理
C. 口服利福平, 疗程 1 年
D. 口服利福平+异烟, 疗程 1 年
E. 立即接种卡介苗
80. 男, 36 岁。3 年内抽搐发作 20 余次, 发作为无诱因的口角和右上肢抽搐, 意识尚清, 但不能对答, 5~10 秒后意识丧失伴全身抽搐。持续 30 秒后, 逐渐停止。事后不能回忆发作过程。发作间期的神经系统检查和常规脑电图检查未见异常。针对该患者的治疗首选药物是
- A. 氯硝西泮
B. 苯妥英钠
C. 苯巴比
D. 乙琥胺
E. 卡马西平
81. 男婴, 10 个月。经常出现夜惊, 近 1 周加重, 多汗, 烦躁, 该患儿生后一直混合喂养, 未添加辅食。此患儿体格检查最可能发现的阳性体征为
- A. 方颅、乳牙未萌出
B. 皮下脂肪明显减少
C. 面色苍白
D. 肌张力增高
E. 皮肤弹性差
82. 女, 36 岁。结婚 8 年未孕。月经规律, 周期 22 天经期 5~6 天, 无痛经。基础体温为双相型, 高温相为 8 天。月经来潮后 6 小时子宫内膜活检, 病理检查结果最可能是
- A. 萎缩型子宫内膜
B. 分泌期子宫内膜腺体分泌不良
C. 分泌期与增殖期内膜并存
D. 子宫内膜单纯性增生
E. 增殖期子宫内膜
83. 女, 5 岁。发热, 体温 38℃, 发热 1 天后出疹, 从面部开始, 24 小时皮疹遍布全身, 72 小时皮疹消退, 枕后、耳后淋巴结肿大。最可能的诊断是
- A. 猩红热
B. 风疹
C. 幼儿急疹
D. 手足口病
E. 麻疹
84. 男, 16 岁。近 2 年来无明显原因出现与人交往减少, 经常独自呆于一处, 有时候会不明原因发笑。对家人漠不关心。生活越来越懒散。以前感兴趣的事情, 现在也不做了。最可能的诊断是

- A. 中度精神发育迟滞
 - B. 重性抑郁症迟滞型
 - C. 精神分裂症单纯型
 - D. 精神分裂症衰退型
 - E. 精神分裂症紧张型
85. 男, 3 岁。剧烈活动后气促, 青紫不明显。自幼反复呼吸道感染。查体: BP90/40mmHg, 胸骨左缘第 2 肋间可闻及粗糙响亮的连续机械样杂音, 第 4 肋间可闻及 4/6 级粗糙的全收缩期杂音伴震颤, P2 亢进, 闻及股动脉枪击音。胸骨 X 线片示左心房及左、右心室增大, 肺动脉段膨隆。最可能的诊断是
- A. 室间隔缺损+动脉导管未闭
 - B. 动脉导管未闭
 - C. 室间隔缺损
 - D. 法洛三联症
 - E. 房间隔缺损
86. 女, 48 岁。G2P1, 渐进性痛经 6 年, 经量增多 3 年。查体: 子宫如妊娠 12 周大小, 质硬, 活动受限。药物治疗后症状无缓解。最佳手术治疗方案是
- A. 改良广泛子宫切除术
 - B. 子宫切除术+双附件切除术
 - C. 广泛子宫切除术
 - D. 双附件切除术
 - E. 子宫切除术
87. 男, 73 岁。3 年前出现右侧肢体活动不灵、右手静止性震颤, 被诊断为帕金森病。复方左旋多巴治疗后病情稳定。近半年出现白天药效维持时间缩短, 震颤明显患者有肾功能不全前列腺肥大病史。对该患者, 最适当的处理是
- A. 加用培高利特
 - B. 加用金刚烷胺
 - C. 增加复方左旋多巴剂量或次数
 - D. 加用苯甲托品
 - E. 加用苯海索
88. 男, 35 岁。患慢性再障性贫血 4 个月入院。血常规: Hb45g/L, WBC $3.5 \times 10^9/L$, PLT $35 \times 10^9/L$, 拟输血治疗, 鉴于该患者需反复输血, 为防止输血不良反应, 应选用的最佳血液成分
- A. 去除白细胞的红细胞
 - B. 悬浮红细胞
 - C. 洗涤红细胞
 - D. 浓缩红细胞
 - E. 辐照红细胞
89. 男, 63 岁。皮肤黏膜散在出血点 10 天。既往肝硬化病史多年。给予输注新鲜冰冻血浆治疗。输注开始后 20 分钟, 患者出现皮肤瘙痒、荨麻疹表现此时正确的处理措施是
- A. 停止输注
 - B. 换一袋血浆输注
 - C. 减慢输注速度, 并给予抗组胺治疗
 - D. 减慢输注速度, 并给予肾上腺素治疗
 - E. 继续输注, 不做任何处理

90. 女, 48 岁。1 年来常无故出现紧张不安。多虑、失眠、头晕、头痛、注意力不集中、阵发性心悸、胸闷、四肢无力。在多家医院就诊, ECC、心电图负荷试验、冠状动脉造影、头颅 MRI 检查均未发现异常。该患者最可能的诊断是
- A. 广泛性焦虑障碍
 - B. 躯体形式障碍
 - C. 疑病障碍
 - D. 恐惧性焦虑障碍
 - E. X 综合征
91. 女, 26 岁。感冒后出现全身无力、双眼睑下垂 3 天。晨起症状较轻, 活动后加重。对该患者不必要的检查是
- A. 新斯的明试验
 - B. 重复神经刺激
 - C. 胸腺 CT 检查
 - D. 甲状腺功能检查
 - E. 肌肉活检
92. 女, 26 岁。近 1 个月来出现失眠, 难以睡。食欲较差, 体重减轻 2kg。自觉无用、孤独, 没有人关心自己, 对未来也不抱任何希望, 偶尔出现生不如死的想法。目前此患者存在的突出症状是
- A. 睡眠障碍
 - B. “三自”症状
 - C. “三无”症状
 - D. 消极观念
 - E. 思维迟缓
93. 一顺产新生儿, 胎龄 35 周, 出生体重 1900g, 位于同胎龄儿平均体重的第 5 百分位数。对该新生儿全面而准确的诊断是
- A. 早产儿, 极低出生体重儿
 - B. 早产儿, 小于胎龄儿
 - C. 足月儿, 小于胎龄儿
 - D. 足月儿, 低出生体重儿
 - E. 早产儿, 适于胎龄儿
94. 女, 30 岁, 初产妇, 妊娠 41 周, 规律宫缩 10 小时, 已破膜。产科检查: LOT, 羊水黄绿色, 胎心率 100 次/分。宫口 9cm, 胎头 S=0。该患者正确的处理措施是
- A. 尽快产钳助娩
 - B. 尽快剖宫产
 - C. 催产素促进产程
 - D. 旋转胎头后自然娩出
 - E. 尽快胎头吸引
95. 女, 30 岁。妊娠 34 周, 血压升高伴头痛 1 周, 抽搐、昏迷 3 小时。查体: BP160/110mmHg, 尿蛋白(++)。该患者最可能的诊断是
- A. 脑出血
 - B. 癫痫
 - C. 癔症
 - D. 子痫
 - E. 脑血栓形成

96. 男, 48 岁。近半年来记忆力渐差, 刚讲过的话就忘记了。把别人做的事情说成是自己做的, 且不认识家人, 有时在深夜看到屋里有人影晃动。大量饮酒 10 年, 最可能的诊断是
- A. 酒精性妄想综合征
 - B. 酒精性幻觉症
 - C. 柯萨科夫综合征
 - D. Wernike 脑病
 - E. 酒精性痴呆
97. 女, 26 岁。妊娠 33 周, 妊娠期糖尿病, 通过调整饮食血糖水平控制良好、胎儿大小发育正常。下一步的处理是
- A. 给予地塞米松
 - B. 每日监测血糖
 - C. 加用胰岛素治疗
 - D. 口服二甲双胍
 - E. 继续控制饮食
98. 一健康儿童体检结果为: 身高 115cm。体重 20kg, 尚未开始换牙, 腕部骨化中心数为 7 个, 按照小儿生长发育的一般规律, 其最可能的年龄是
- A. 6 岁
 - B. 8 岁
 - C. 4 岁
 - D. 5 岁
 - E. 7 岁
99. 男, 1 岁半。消瘦, 近 5 个月体重不增。查体: 体重 7kg, 腹壁皮下脂肪消失, 头发干枯, 心肺未见异常, 腹软, 应警惕的最严重的并发症是
- A. 支气管肺炎
 - B. 腹泻病
 - C. 营养性贫血
 - D. 维生素缺乏症
 - E. 自发性低血糖
100. 男, 59 岁。突发剧烈头痛伴恶心、呕吐 2 天。高血压病史 10 年, 糖尿病病史 8 年, 吸烟史 30 年。查体: 神志清, 对答切题。右眼睑下垂, 右眼球上下及内收不能, 右侧瞳孔直径 5mm, 左侧瞳孔直径 3mm, 右侧直接对光反射消失, 四肢肌力 5 级, 腱反射消失。无感觉异常, 病理征 (-), 颈抵抗 (+)。该患者最可能的诊断是
- A. 蛛网膜下腔出血
 - B. 脑桥梗死
 - C. 糖尿病性动眼神经麻痹
 - D. 脑干脑炎
 - E. 海绵窦血栓形成

三、A3/A4型题

(101~103 题共用题干)

男孩, 1 岁半。发热伴咳嗽 5 天, 加重伴呼吸困难 1 天, 曾予青霉素治疗 3 天, 查体: T39°C, 嗜睡, 精神反应差, 躯干可见散在红色斑丘疹, 呼吸急促, 双肺可闻及中小水泡音。血 WBC $22 \times 10^9/L$, N 0.90, L 0.10。胸部 X 线片双肺斑片影、肺大泡。首先考虑的诊断是

101. 首先考虑的诊断是

- A. 腺病毒肺炎

- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 呼吸道合胞病毒肺炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

102. 患儿住院后, 经治疗, 病情曾一度好转。但今天起病情又突然加重, 出现高热及呼吸困难, 查体: T39.5℃, R60 次/分。烦躁不安, 可见鼻翼及三凹征, 面色苍白, 唇周发绀。右上肺叩诊鼓音, 右下肺叩诊呈浊音, 右肺呼吸音低。心率 140 次/分。心音有力, 律齐。肝脾无肿大。应首先考虑

- A. 中毒性脑病
- B. 心力衰竭
- C. 脓气胸
- D. 真菌感染
- E. 中毒性心肌炎

103. 此时有效的进一步治疗措施是

- A. 使用强心剂
- B. 改用其他抗生素
- C. 胸腔闭式引流
- D. 使用脱水剂
- E. 改用抗真菌药

(104~105 题共用题干)

女, 26 岁。人流后 5 个月, 阴道不规则出血 20 天, 伴头晕、乏力 3 天。近 2 天, 出现胸痛、咯血。妇查: 子宫孕 7 周大小, 质软, 有轻度压痛, 双侧可触及囊性肿物, 直径均为 5cm 大小。胸部 X 线片提示双下肺多发圆形结节影。

104. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. B 超
- B. 血常规
- C. 诊断性刮宫
- D. 痰细胞学检查
- E. 血-hCG

105. 确诊后首选的治疗方法是

- A. 内分泌治疗
- B. 化疗
- C. 子宫切除术+双侧附件切除术
- D. 子宫切除术
- E. 放疗

(106~108 题共用题干)

男, 73 岁。头痛、精神异常、左侧肢体无力 5 天加重伴呕吐 1 天。3 个月前有头部外伤史。查体: BP106/95mmHg, 神志清楚, 双侧视神经乳头水肿, 左侧肢体肌力 4 级。

106. 该患者最有可能的诊断是

- A. 急性脑内血肿
- B. 急性硬脑膜外血肿
- C. 慢性硬脑膜下血肿
- D. 亚急性硬脑膜下血肿
- E. 急性硬脑膜下血肿

107. 最重要鉴别的疾病是

- A. 精神疾病
- B. 脑炎
- C. 高血压脑出血
- D. 脑梗死
- E. 脑肿瘤

108. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 脑电图
- B. 头颅 CT
- C. 头颅 X 线
- D. 腰椎穿刺脑脊液检查
- E. 颅脑超声

(109~111 题共用题干)

男婴, 4 个月。反复发作性吸入性呼吸困难伴吸气时喉鸣, 口唇青紫 3 次。无发热。发作期间一般情况良好。枕部指压有乒乓球样感, 肺、心未见异常。

109. 首先考虑的诊断为

- A. 气管异物
- B. 急性喉炎
- C. 支气管肺炎
- D. 维生素 D 缺乏手足抽搐症
- E. 急性喉气管炎

110. 首选的检查是

- A. 咽拭子培养
- B. 胸部 X 线片
- C. 喉镜
- D. 血电解质
- E. 血气分析

111. 该患儿再次突然出现发作性呼吸困难缺氧时, 首要的急救措施是

- A. 气管插管
- B. 静注钙剂
- C. 应用地西洋, 保持呼吸道通畅
- D. 应用甘露醇
- E. 补充维生素 D

(112~114 题共用题干)

女, 53 岁。近 1 年来怕脏, 不敢倒垃圾和上厕所。在街上遇到垃圾车也害怕, 会反复洗手。自己知道不应该, 但不能控制, 为此感到苦恼而就诊。

112. 患者的诊断是

- A. 分离障碍
- B. 疑病障碍
- C. 恐惧性焦虑障碍
- D. 广泛性焦虑障碍
- E. 强迫障碍

113. 首选的治疗药物是

- A. 丁螺环酮

- B. 氯米帕明
- C. 阿普唑仑
- D. 奥氮平
- E. 利培酮

114. 最宜联合使用的治疗方法是

- A. 经颅磁刺激治疗
- B. 口服丙戊酸钠
- C. 电抽搐治疗
- D. 认知行为治疗
- E. 家庭治疗

(115~117 题共用题干)

女, 48 岁, G2P2。月经周期紊乱伴潮热 1 年, 阴道流血 35 天, 伴头晕、乏力 10 天。妇科检查见宫颈轻度糜烂, 无出血, 子宫大小形态正常, 双侧附件区未触及异常。超声检查示: 子宫内膜厚 0.8cm, 无血流信号。

115. 对明确诊断最有价值的检查是

- A. 性激素水平测定
- B. 宫颈细胞学检查
- C. HPV 检测
- D. 诊断性刮宫
- E. 尿妊娠试验

116. 该患者最有可能的诊断是

- A. 功能失调性子宫出血
- B. 宫颈上皮内瘤变
- C. 子宫颈鳞癌
- D. 子宫内膜炎
- E. 异位妊娠

117. 若诊断成立, 首选的治疗是

- A. 抗炎治疗
- B. 宫颈锥切
- C. 广泛性子宫切除术
- D. 激素类药物治疗
- E. 腹腔镜探查术

(118~119 题共用题干)

女, 58 岁。腹胀、食欲不振 1 月余。G2P2。自消化内科转来。查体: 腹部膨隆, 移动性浊音 (+)。妇科检查: 阴道后穹隆可触及散在结节, 无触痛, 子宫后位, 大小正常, 子宫左后方可触及质硬包块, 边界及大不清。血 CA125 1865U/ml

118. 首先的应考虑的诊断是

- A. 卵巢上皮性癌
- B. 无性细胞瘤
- C. 盆腔炎性包块
- D. 转移性卵巢肿瘤
- E. 子宫内膜异位症

119. 术后拟给予药物治疗, 最适合的是

- A. 化疗药物

- B. 孕激素类药物
- C. 抗生素
- D. 胸腺肽
- E. GnRH-a

(120~122 题共用题干)

女，7岁。发热伴腹痛半天，抽搐1次，呕吐2次。查体：T40℃，BP60/30mmHg，面色苍白，四肢湿冷，呼吸急促，心率快，腹平软，脐周压痛，肠鸣音活跃。脑膜刺激征阴性。

120. 最可能的诊断是
- A. 脓毒症
 - B. 热性惊厥
 - C. 中毒型细菌性痢疾
 - D. 急性胃炎
 - E. 化脓性脑膜炎
121. 该疾病的发病机制中，起主要作用的
- A. 小儿神经系统发育不健全
 - B. 细菌外毒素
 - C. 细菌内毒素
 - D. 小儿免疫功能不完善
 - E. 细菌致热原
122. 应立即进行的检查是
- A. 脑电图
 - B. 血常规
 - C. 粪常规
 - D. 腹部B超
 - E. 头颅CT

(123~125 题共用题干)

男，59岁。进行性记忆力下降6个月。怀疑有人偷自己的东西，认为爱人对自己不忠诚，常与邻居发生争执，有时尾随年轻女性，行为幼稚、任性。家人无法管理而住院治疗。既往无脑血管病史。生命体征及神经系统检查正常。

123. 该患者最可能的诊断
- A. 阿尔茨海默症
 - B. 偏执性精神病
 - C. 中毒性脑病
 - D. 血管性痴呆
 - E. 精神分裂症
124. 病史中没有提示存在的症状是
- A. 强制性思维
 - B. 妒忌妄想
 - C. 人格改变
 - D. 易激惹
 - E. 近事遗忘
125. 【假设信息】该患者在住院期间，突然出现大量丰富的幻觉，这时对症处理应选用的药物是
- A. 丙戊酸钠
 - B. 利培酮

- C. 丁环酮
- D. 阿普唑仑
- E. 曲唑酮

(126~129 题共用题干)

男，2岁。因呕吐、频繁水样便3天伴发热于10月底入院。12小时无尿。查体：T38℃，颜面苍白，皮肤弹性差，眼窝凹陷，心肺听诊无异常，腹稍胀，肝脾无肿大，膝腱反射未引出，四肢末端厥冷。实验室检查：血钠138mmol/L。

126. 最可能的诊断是

- A. 侵袭性大肠癌细菌肠炎
- B. 轮状病毒肠炎
- C. 致病性大肠癌细菌肠炎
- D. 真菌性肠炎
- E. 产毒性大肠埃希菌肠炎

127. 最可能合并的电解质紊乱是能

- A. 低镁血症
- B. 低钾血症
- C. 低磷血症
- D. 低氯血症
- E. 低钙血症

128. 首先应该补充的液体是

- A. 1/2张含钠液
- B. 1/3张含钠液
- C. 2/3张含钠液
- D. 1/4张含钠液
- E. 2:1的等张含钠液

129. 该患儿第一天补液总量应是

- A. 180~210ml/kg
- B. 120~150ml/kg
- C. 90~120ml/kg
- D. 150~180ml/kg
- E. 60~90ml/kg

(130~131 题共用题干)

女，18岁。有性生活史，停经58天，下腹痛伴阴道流血10天，5天前似有组织块自阴道排出，近3天下腹疼痛加重，阴道流血量较月经多，有臭味。平素月经规律。查体：T38℃，尿hCG(±)。妇科检查：阴道多量血液，有臭味，宫体稍大，触痛明显，附件略增厚，有压痛。血常规：WBC $15 \times 10^9/L$ ，N 0.9，Hb85g/L，PLT $145 \times 10^9/L$ 。

130. 该患者最可能的主要诊断是

- A. 急性盆腔炎
- B. 流产合并感染
- C. 不全流产
- D. 宫外孕合并感染
- E. 难免流产

131. 应首先进行的处理是

- A. 抗感染治疗，严密观察

- B. 抗感染同时剖腹探查术
- C. 感染控制 2~3 日后再行清宫术
- D. 立即清宫术
- E. 子宫切除术

(132~135 题共用题干)

女, 30 岁。妊娠 40 周。临产 12 小时后在产钳助娩下分娩一 4100g 女婴。胎儿娩出后 15 分钟胎盘人工剥离取出, 检查胎盘无异常, 继之发生阴道大量流血。

132. 该产妇最可能的诊断是

- A. 凝血功能障碍导致的产后出血
- B. 胎盘残留
- C. 宫缩乏力性产后出血
- D. 产钳引起的软产道裂伤
- E. 子宫内翻

133. 下面的处理不恰当的是

- A. 刮宫术
- B. 配血
- C. 子宫注射或静脉滴注缩宫药物
- D. 迅速补液
- E. 按摩子宫

134. 能说明处理有效的指标不包括

- A. 心率增快
- B. 血压上升
- C. 子宫变硬
- D. 尿量增加
- E. 出血减少

135. 该患者分娩过程中, 在胎肩娩出后为防止产后出血应预防性使用

- A. 麦角生物碱
- B. 缩宫素
- C. 抗菌素
- D. 输血浆
- E. 输血

四、B型选择题

(136~138 题共用备选答案)

- A. 复发
- B. 激素敏感型
- C. 激素耐药型
- D. 激素依赖型
- E. 激素部分敏感型

136. 肾病综合征患儿, 口服泼尼松 $2\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$, 治疗 2 周后尿蛋白完全转阴。疗效判断为

137. 肾病综合征患儿, 口服泼尼松 $2\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$, 治疗 8 周后尿蛋白仍 (+ + + +) 疗效判断为

138. 肾病综合征患儿, 口服泼尼松 $2\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$, 治疗 2 周后尿蛋白完全转阴, 8 周后, 尿蛋白再次 (+ + + +)。疗效判断为

(139~140 题共用备选答案)

- A. 浆膜下肌瘤
 - B. 肌壁间肌瘤
 - C. 阔韧带肌瘤
 - D. 黏膜下肌瘤
 - E. 宫颈肌瘤
139. 临床最常见的子宫肌瘤是
140. 易阻碍受精卵着床导致不孕的是
(141~142 题共用备选答案)
- A. 前置血管
 - B. 葡萄胎
 - C. 子宫破裂
 - D. 胎盘早剥
 - E. 前置胎盘
141. 子痫前期常导致的并发症是
142. 妊娠 33 周, 反复无痛性阴道出血 3 次最可能的诊断是
(143~144 题共用备选答案)
- A. 紧急避孕药
 - B. IUD
 - C. 复方短效口服避孕药
 - D. 长效复方避孕注射剂
 - E. 安全期避孕
143. 女, 24 岁, 未育。近半年无生育计划, 首选的避孕方法是
144. 顺产后 4 个月哺乳期女性, 首选的避孕方法是
(145~147 题共用备选答案)
- A. 低分子右旋糖酐
 - B. 阿司匹林
 - C. 低分子肝素
 - D. 重组人纤维酶原激活剂 (r-PA)
 - E. 巴曲酶
145. 反复短暂性脑缺血发作治疗应选用
146. 急性缺血性脑卒中 (心源性) 起病 24 小时后的治疗应选用
147. 急性缺血性脑卒中起病 3 小时内的治疗应选用
(148~150 题共用备选答案)
- A. 结核性脑膜炎
 - B. 中毒性脑病
 - C. 病毒性脑炎
 - D. 隐球菌性脑膜炎
 - E. 化脓性脑膜炎
148. 上述疾病中, 易侵犯颅神经, 尤其是面神经的是
149. 上述疾病中, 脑脊液墨汁染色阳性的是
150. 上述疾病中, 易出现硬膜下积液的是

关注公众号【医考联盟在线】

