

2023 执业药师考后对答案

-考生回忆版 西药综

药师应当主动收集药物不良事件信息，并进行记录、分析和处理。该工作属于

- A. 药物重整
- B. 药物治疗管理
- C. 药物警戒
- D. 药物临床综合评价
- E. 循证医学评价

药师可通过开放性和针对性问题与患者有效沟通，属于开放性问题的的是（A）

- A. 您平时家里备有哪些非处方药？
- B. 您是什么时候开始服用这个药物的？
- C. 您忘记过服用药物吗？
- D. 您的降压药物是每天一次规律服用吗？
- E. 您最近一次的糖化血红蛋白数值是多少？

通常情况下，允许超说明书用药的情况是（C）

- A. 该适应证已有获批药物，但患者因担心药品不良反应拒绝治疗
- B. 开展临床研究或出于其他关乎医学利益的目的
- C. 无其他药物可选，且用药目的符合患者利益
- D. 拟用药物的价格低于获批该适应证的药物
- E. 因拟用药物的疗效更优，用于禁忌证人群

帕金森病治疗药物卡左双多巴缓释片，每片含卡比多巴 50mg，左旋多巴 200mg。关于卡比多巴作用的说法，正确的是（C）

- A. 直接转变为多巴胺，与左旋多巴药效叠加
- B. 抑制单胺氧化酶，减慢左旋多巴的代谢而延长作用时间
- C. 增加左旋多巴在脑组织中脱羧转变为多巴胺而发挥疗效
- D. 促进多巴胺释放发挥疗效
- E. 直接激动中枢多巴胺受体增加疗效

药师向患者进行用药交代可有效避免用药错误，更好发挥药物疗效。关于药师向患者提供用药交代的说法，错误的是（C）

- A. 服用硝苯地平控释片后，会随粪便排出形似完整的药片
- B. 铝碳酸镁片建议嚼碎后服用
- C. 胰岛素注射液开启后应置于 2℃~8℃环境中保存
- D. 利塞膦酸钠服药时应保持上身直立的坐位或站位，服药后 30 分钟内不宜进食和卧床

E. 噻托溴铵干粉吸入剂附带的胶囊需放到吸入装置内刺破吸入，不能直接吞服

患者，男，50岁，因房颤规律服用利伐沙班片 15mg qd，肾功能正常。近期拟行皮肤活检术，药师应给予该患者的建议是

- A. 无需停用利伐沙班，最后一次服药后 12~24 小时进行活检
- B. 活检前停用利伐沙班至少 5 天
- C. 活检前停用利伐沙班至少 14 天，期间使用阿司匹林 0.1g qd 替代
- D. 活检前 24 小时停用利伐沙班
- E. 活检当天停用利伐沙班，至少 5 天后恢复用药

患者，女，78岁，因晕厥就诊。心电图提示：Ⅱ度房室传导阻滞，多次测量血压偏高。该患者宜使用的降压药是（B）

- A. 维拉帕米片
- B. 氨氯地平片
- C. 美托洛尔片
- D. 比索洛尔片
- E. 地尔硫草胶囊

关于对 HBeAg 阳性患者的用药注意事项及健康宣教的说法，错误的是

- A. 服用核苷类抗病毒药物应每 6 个月复查一次血常规，直至治疗结束
- B. 抗病毒药物的不良反应及耐受性影响患者的用药依从性，避免自行停药
- C. 使用干扰素 α 治疗，应每 3 个月复查 HBSAg 等血清免疫学检查项目
- D. HBV 可通过消化道传播，建议共同居住者接种乙肝疫苗
- E. 避免饮酒及使用可能会导致肝损伤的药物

患者，男，67岁，诊断为非霍奇金淋巴瘤，弥漫大 B 细胞型，病理学免疫组化结果：CD20 (+)。该患者宜使用的药物是

- A. 厄洛替尼
- B. 曲妥珠单抗
- C. 西妥昔单抗
- D. 吉非替尼
- E. 利妥昔单抗

患者，男，38岁，新诊断为肺结核。计划使用利福平、异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇抗结核治疗。需重点关注的严重不良反应是

- A. 药物性肝损伤
- B. 体液颜色异常
- C. 周围神经病变
- D. 关节痛
- E. 胃肠道损伤

患者，男，75岁，诊断为帕金森病、伴有智能减退。该患者首选的抗帕金森病药物是

- A. 毗贝地尔
- B. 普拉克索

- C.雷沙吉兰
- D.复方左旋多巴
- E.恩他卡朋

患者，女，30岁，因下腹痛、阴道分泌物增多就诊，诊断为盆腔炎。该患者宜口服的经验性治疗方案是

- A.米诺环素+甲硝唑
- B.阿奇霉素+左氧氟沙星
- C.阿奇霉素+米诺环素
- D.左氧氟沙星+米诺环素
- E.左氧氟沙星+甲硝唑

患者，女，30岁，近1年常常出现腹胀、上腹痛症状，伴随排便次数减少，粪便干硬，每次排便后腹胀、腹痛症状缓解。肠镜检查未见异常，诊断为肠易激综合征便秘型。该患者宜使用的治疗药品是

- A.盐酸洛哌丁胺胶囊
- B.利福昔明片
- C.盐酸昂丹司琼片
- D.马来酸曲美布汀片
- E.利那洛肽胶囊

患者，女，42岁，服用氯米芬期间可能出现的抗雌激素症状是

- A.恶心
- B.潮热、视物模糊
- C.血清钾升高
- D.肝功能异常
- E.血压升高

可导致渗透性肾病，肾功能不全患者应慎用的药物是（C）

- A.甘露醇
- B.山莨菪碱
- C.庆大霉素
- D.氢氯噻嗪
- E.阿司匹林

- A.蔗糖铁
- B.琥珀酸亚铁
- C.右旋糖酐铁
- D.硫酸亚铁
- E.葡萄糖酸亚铁

既有口服剂型也有注射剂型的铁剂是（）

分子结构中，铁含量百分比最高的口服铁剂是（）

- A.替勃龙

- B.特立帕肽
- C.鲑降钙素
- D.阿仑膦酸钠
- E.唑来膦酸

需皮下注射，且用药不应超过 24 个月的药物是

需静脉输注给药，且给药时间应大于 15 分钟的药物 是

可经皮下注射、肌内注射或鼻喷给药的药物是